

مقدمة في نظرية التركيبيات

**الدكتور أحمد حميد شرارى
الدكتور محمد عبدالعزيز الزهيري**

قسم الرياضيات - جامعة الملك سعود

المقدمة

تعتبر نظرية التركيبات من فروع الرياضيات التي تشهد اهتماماً كبيراً وتطوراً سريعاً في وجهيها النظري والتطبيقي. ويعود ذلك إلى تطبيقاتها الكثيرة في ميادين متنوعة كعلوم الحاسوب والاتصالات والنقل وعلم الجينات وتصميم التجارب والجدولة.

تعالج نظرية التركيبات ثلاثة أنواع رئيسة من المسائل: مسائل الوجود، مسائل العد والسرد، مسائل الإنشاء. وتحث هذه المعالجة عن إجابات للأسئلة: هل يوجد تشكيل تركيبي من نوع معين؟ كم هو عدد التشكيلات التركيبية و هل يمكن سردها؟ كيف نختار من بين التشكيلات التركيبية الممكنة تشكيلًا أمثلياً بالنسبة إلى معيار ما؟ و يلاحظ أنه عندما تكون مسألة الوجود سهلة فإن الاهتمام ينصب على مسألة العد والسرد؛ وبالرغم من أن معظم النتائج المعروفة يتعلق بالعد إلا أن أهمية السرد بدأت تتجلى حديثاً لعلاقته بعلم الحاسوب. وعندما تكون مسألة الوجود صعبة فغالباً ما تكون مسألة العد والسرد ذات أهمية متدنية. وفي مسألة الإنشاء فإننا نبحث عن خوارزمية جيدة لإيجاد حل أمثلى بالنسبة إلى شروط معينة مسبقاً.

يقدم هذا الكتاب مدخلاً إلى مسألتي الوجود والعد حيث يعرض الأساسيات التي لا تستند إلى مواضيع متقدمة في الرياضيات. ويعالج التفكير التركيبى مسألة العد ضمنياً باستخدام فكرة التقابل لاختزال مسائل معطاة إلى مسائل

محلولة مسبقاً. نبدأ باستعراض مبادئ العد الأساسية، نموذج العينة للعد، مسألة عدد الحلول في الأعداد الصحيحة لعادلة خطية. ثم ننتقل إلى تقديم أدوات أكثر فعالية في معالجة مسائل العد. في الحقيقة، نقدم الدوال المولدة، العلاقات الارتدادية، مبدأ التضمين والإقصاء، بقدر مناسب من التفصيل. ولكننا لا نقدم نظرية بوليا للعد بالرغم من أهميتها وذلك لأن فهمها يحتاج معرفة رياضية متقدمة نسبياً. بعد ذلك، ننتقل إلى مسائل الوجود عبر تقديم مبدأ برج الحمام وأعداد رمزي؛ ولكننا لا نتطرق إلى مواضيع مهمة أخرى مثل تصميم التجارب.

وسيقدر المؤلفان أية ملاحظات تبدى من قراء هذا الكتاب؛ و يمكن إرسال آية تعليقات أو اقتراحات عبر البريد الإلكتروني zohairi@ksu.edu.sa وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم مدخل سهل إلى نظرية التركيبات وأن يكون هذا الكتاب إضافة علمية إلى ما كتب بالعربية، والله من وراء القصد.

المؤلفان

المحتويات

ج	المقدمة
٥	المحتويات
الفصل الأول: طرق أساسية للعد		
(١،١)	مبادي المجموع و حاصل الضرب	٢
(١،٢)	مبدأ التقابل	٤
(١،٣)	نموذج العينة للعد	٤
تمارين(١،١)	١٢
(١،٤)	مبرهنة ذات الحدين	١٦
تمارين(١،٢)	٢٤
(١،٥)	نموذج التوزيع للعد	٢٦
(١،٦)	تجزئات المجموعات	٣٢
(١،٧)	تجزئات الأعداد الصحيحة	٣٨
تمارين(١،٣)	٤٣
الفصل الثاني: مبدأ التضمين والإقصاء		
٤٦	

تمارين

٥٩

٦٤

٦٧

٦٨

٨٩

٩٦

الفصل الثالث: الدوال المولدة

(٣، ١) مقدمة

(٣، ٢) الدوال المولدة العادية

تمارين (٣، ١)

(٣، ٢) الدوال المولدة الأسيية

تمارين (٣، ٢)

الفصل الرابع: العلاقات الارتدادية

٩٩

١٠١

١١٠

١٢٢

١٣٤

(٤، ١) مقدمة

(٤، ٢) العلاقات الارتدادية الخطية المتتجانسة

(٤، ٣) العلاقات الارتدادية غير المتتجانسة

(٤، ٣) بناء العلاقات الارتدادية

تمارين

الفصل الخامس: مبدأ برج الحمام وأعداد رمزي

١٤٦

١٥٠

(٥، ١) مبدأ برج الحمام

تمارين (٥، ١)

١٥٤	أعداد رمزي (٢،٥)
١٦١	تمارين (٢،٥)
١٦٣	دليل المصطلحات
١٦٥	المراجع

الفصل الأول

مبادئ العد الأساسية

BASIC COUNTING PRINCIPLES

يعتبر العد هدفاً أساسياً من دراسة نظرية التركيبات. تدعى نظرية التركيبات أحياناً "فن العد" لأننا نعد عناصر مجموعة منتهية دون أن نكتب عناصرها في قائمة مفصلة. يهدف هذا الفصل إلى التعرف على صور العد السبعة القياسية. هذه المسائل السبعة إضافة إلى مبادئ المجموع و حاصل الضرب و التقابل تمثل الأدوات الرئيسية لحل معظم مسائل هذا الكتاب.

هذه المسائل السبعة يمكن النظر إلى أربع منها (المتتاليات، التباديل، التركيبات، المجموعات المضاعفة) من خلال نماذجين: نموذج العينة للعد و نموذج التوزيع للعد^١، في حين المسائلان المتبقيان (تجزئة المجموعات، تجزئة الأعداد الصحيحة) لا يمكن النظر إليهما إلا من خلال نموذج التوزيع للعد.

¹ هذان النماذجان ليسا الوحيدين للعد. هناك نموذج الدول للعد الذي يعد صياغة دقيقة لنموذج التوزيع للعد .

أنظر البند الرابع من الفصل الأول في المرجع [5].

(١،١) مبدأ المجموع و حاصل الضرب

إذا كانت $A_i \cap A_j = \emptyset$ لكل A_1, A_2, \dots, A_k مجموعات منتهية تتحقق $|A_1| + |A_2| + \dots + |A_k| = |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|$. يسمى هذا المبدأ مبدأ

المجموع .The Rule of Sum

يمكن إثبات مبدأ المجموع بواسطة الاستقراء الرياضي على k ، ونترك ذلك للقارئ.

غالباً ما نستخدم الصيغة المكافئة التالية لمبدأ المجموع عند حل المسائل:

إذا كان إنجاز المهمة A يتطلب إنجاز أي من المهام A_1, A_2, \dots, A_k ، و إذا كان لا يمكن إنجاز A_i و A_j في الوقت نفسه لـ $i \neq j$ وكان عدد طرق إنجاز A هو n ، لكل عدد صحيح $t \leq k$ ، فإن عدد طرق إنجاز A هو

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

إذا كانت A_1, A_2, \dots, A_k مجموعات منتهية فإن

يسمى هذا المبدأ مبدأ حاصل الضرب $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|$

يمكن إثبات مبدأ حاصل الضرب بواسطة الاستقراء الرياضي على k ، ونترك ذلك للقارئ.

غالباً ما نستخدم الصيغة المكافئة التالية لمبدأ حاصل الضرب عند حل

المسائل: إذا كان إنجاز المهمة A يتطلب إنجاز المهمة التالية من المهام A_1, A_2, \dots, A_k ، (أولاً ثم A_2 ثانياً وهكذا) و إذا كان عدد طرق إنجاز المهمة A لا يعتمد على الكيفية التي تم بها إنجاز المهام $A_1, A_2, \dots, A_{j-1}, A_j$ لكل عدد

صحيح $j \leq k \leq 2$ ، وكان عدد طرق إنجاز A_j هو n_j فإن عدد طرق إنجاز A هو $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$.

مثال (١،١)

لتكن Σ أبجدية عدد حروفها m . جد $|\Sigma^n|$ حيث Σ^n هي مجموعة الكلمات التي طول كل منها n والتي حروفها من الأبجدية Σ .

الحل: لتكن $w = x_1x_2 \cdots x_n$ كلمة من Σ^n . عدد طرق اختيار الحرف x_i هو m لكل $1 \leq i \leq n$ ، كما أن اختيار الحرف x_i لا يعتمد على اختيار الحروف التي قبله. إذن استنادا إلى مبدأ حاصل الضرب $|\Sigma^n| = m^n$.

مثال (١،٢)

يعمل في مستشفى 4 أطباء و 7 ممرضين و 3 فنيين. بكم طريقة يمكن تكوين فريق عمل مؤلف من طبيب و ممرض و فني؟

الحل: يمكن اختيار الطبيب بأربع طرق و يمكن اختيار المرض بسبع طرق و يمكن اختيار الفني بثلاث طرق. استنادا إلى مبدأ حاصل الضرب عدد الطرق المكونة هو $4 \cdot 7 \cdot 3 = 84$

مثال (١،٣)

كم عددا مكونا من رقمين يمكن تكوينه بحيث يكون مجموع رقميه عددا فرديا؟

الحل: ليكن y هو رقم الآحاد و x هو رقم العشرات. نبدأ باختيار x . يمكن اختيار x من المجموعة $\{1, 2, \dots, 9\}$ و بالتالي فإن عدد طرق اختيار x هو 9. إذا كان x فردياً فإنه يمكن اختيار y من المجموعة $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ ، أما إذا كان x زوجياً فإنه يمكن اختيار y من المجموعة $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ و بالتالي فإن عدد طرق اختيار y بعد اختيار x هو 5. إذا عدد الأعداد المطلوبة هو $9 \cdot 5 = 45$. لاحظ أنه لو بدأنا باختيار y فإن عدد طرق اختيار x بعد اختيار y ليس ثابتاً.

(١،٢) مبدأ التقابل

إذا كان $f: A \rightarrow B$ تقابل من المجموعة A إلى المجموعة B فإن $|A| = |B|$.

(١،٣) نموذج العينة للعد

لتكن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة. إن أخذ عينة من A يعتمد على الإجابة عن السؤالين التاليين:

الأول: هل ترتيب العناصر مهم في هذه العينة أم لا؟
 الثاني: هل تكرار ظهور عنصر في العينة مقبول أم لا؟
 إذن لدينا أربع حالات، يوضحها المثال التالي، سنتحدث عن كل منها.

مثال (٤، ١)

لتكن لدينا المجموعة $A = \{a_1, a_2, a_3\}$. يوضح الجدول المعطى أدناه العينات المكونة من عنصرين و المأخوذة من A

	التكرار مقبول	التكرار غير مقبول
الترتيب مهم	$a_1a_1, a_1a_2, a_1a_3,$	$a_1a_2, a_1a_3, a_2a_1,$
	$a_2a_1, a_2a_2, a_2a_3,$	a_2a_3, a_3a_1, a_3a_2
	a_3a_1, a_3a_2, a_3a_3	
الترتيب غير مهم	$\{a_1, a_2\} \{a_1, a_1\}$	$\{a_1, a_3\} \{a_1, a_2\}$
	$\{a_2, a_2\} \{a_1, a_3\}$	$\{a_2, a_3\}$
	$\{a_3, a_3\} \{a_2, a_3\}$	

لتكن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة. نسمى العينة متتالية طولها r (أو متتالية مكونة من r عنصرا) r -sequence من A إذا كان يسمح فيها بالتكرار والترتيب فيها مهم و نكتبها على الشكل $x_1x_2\dots x_r$. بمناقشة مماثلة لما فعلنا في مثال (١، ١) يمكن إثبات أن عدد المتتاليات التي طولها r من مجموعة سعتها n هو n^r .

لتكن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة. نسمى العينة تبديلا طوله r ، (أو تبديلا مكونا من r عنصرا) r -permutation من A إذا كان لا يسمح فيها بالتكرار والترتيب فيها مهم و نكتبها على الشكل $x_1x_2\dots x_r$.

مبرهنة (١،١)

عدد التباديل التي طولها r من مجموعة عدد عناصرها n هو

$$n(n-1) \cdots (n-r+1)$$

البرهان: لتكن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة و ليكن $p = x_1 x_2 \dots x_r$ تبديلاً من الطول r من A . لاحظ أن :

١ - عدد طرق اختيار x_1 هو n .

٢ - عدد طرق اختيار x_2 هو $n-1$.

٣ - عدد طرق اختيار x_3 هو $n-2$.

⋮

- عدد طرق اختيار x_r هو $n-r+1$.

و حيث إن الاختيارات مستقلة في كل مرحلة ، فحسب مبدأ حاصل الضرب يكون

■ عدد التباديل التي طولها r من A هو $n(n-1) \cdots (n-r+1)$

نرمز لعدد التباديل التي طولها r من مجموعة سعتها n عادة بالرمز

أو بالرمز $P(n, r)$. لاحظ أن $(n)_r$

$$(n)_r = P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$$

لتكن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة. أي مجموعة جزئية من A من السعة r -subset يمكن النظر إليها على أنها عينة من A سعتها r الترتيب فيها غير مهم ولا يسمح فيها بالتكرار. تسمى المجموعة الجزئية أحياناً توفيقاً أو تركيباً combination.

مبرهنة (١، ٢)

عدد المجموعات الجزئية التي سعتها r من مجموعة عدد عناصرها n هو

$$\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

البرهان: إذا كان $r = 0$ فإن المجموعة الجزئية الخالية هي الوحيدة التي لا تحوي عناصر.

نفرض أن $0 < r$. لاحظ أن أي مجموعة جزئية عدد عناصرها r تقابل $r!$ تبديلات مختلفاً في مجموعة التباديل التي طولها r . كذلك يمكننا الحصول على $r!$ تبديلات مختلفاً من أي مجموعة جزئية عدد عناصرها r . وبناء عليه فإن

$$r! \times (\text{عدد المجموعات الجزئية التي عدد عناصرها } r) = \text{عدد التباديل التي طولها } r$$

من المبرهنة (١، ١) نستنتج أن عدد المجموعات الجزئية التي عدد عناصرها r

■ $\frac{n!}{r!(n-r)!}$ يساوي

يرمز لعدد المجموعات الجزئية التي سعتها r من مجموعة سعتها n

بالرمز $C(n,r)$ أو بالرمز $\binom{n}{r}$.

مثال (١،٥)

إذا كانت ورقة اختبار تحوي 7 أسئلة و كان على الطالب أن يجيب عن 5 أسئلة فقط، فبكم طريقة يمكن للطالب أن يجيب على الاختبار؟

الحل: عدد طرق الإجابة هو $\binom{7}{5} = 21$.

مثال (١،٦)

يعمل 12 مهندسا في شركة، و من أجل تنفيذ أحد المشاريع تريد الشركة اختيار فريق عمل مؤلف من 5 مهندسين.

(أ) بكم طريقة يمكن للشركة أن تختار فريق العمل؟

(ب) بكم طريقة يمكن للشركة أن تختار فريق العمل إذا أصر مهندسان على العمل معا؟

(ج) بكم طريقة يمكن للشركة أن تختار فريق العمل إذا رفض مهندسان أن يعملا معا؟

الحل: (أ) عدد الطرق الممكنة هو $\binom{12}{5} = 792$

(ب) ليكن المهندسان اللذان يصران على العمل معا هما a و b . إذا كان a و b ضمن الفريق المختار فإن عدد الطرق الممكنة لاختيار الفريق هو $\binom{10}{3}$ ، أما إذا كان الفريق المختار لا يتضمن كلا من a و b فإن عدد الطرق الممكنة لاختيار الفريق هو $\binom{10}{5}$. إذن، بالاستناد إلى مبدأ المجموع نجد أن عدد الطرق الممكنة هو $\binom{10}{3} + \binom{10}{5} = 120 + 252 = 372$

(ج) ليكن المهندسان اللذان يرفضان العمل معا هما a و b . إذا كان a ضمن الفريق المختار فإن b ليس ضمن الفريق وبالتالي فإن عدد الطرق في هذه الحالة هو $\binom{10}{4}$. بالمثل إذا كان b ضمن الفريق المختار فإن عدد الطرق هو $\binom{10}{5}$. أما إذا كان الفريق لا يتضمن كلا من a و b فإن عدد الطرق هو $\binom{10}{4} + \binom{10}{5} + \binom{10}{5} = 210 + 210 + 252 = 672$. إلى مبدأ المجموع نجد أن عدد الطرق الممكنة هو:

لتكن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة. نسمى العينة **مجموعه جزئية مضاعفة** سعتها r من A إذا كان الترتيب فيها غير مهم ويسمح فيها بالتكرار ونكتبها على الشكل $\{x_1, x_2, \dots, x_r\}$.

وفقا لما ذكر أعلاه فإن $\{a, a, b, c, c, c, d\}$ مجموعة جزئية مضاعفة سعتها 7 وفيها تكرار كل من a, b, c, d يساوي 2,1,3,1 على الترتيب.

مثال (١،٧)

المجموعات الجزئية المضاعفة والتي سعتها 3 من $\{a, b, c\}$ هي:
 $\{a, a, a\}, \{a, a, b\}, \{a, a, c\}, \{a, b, c\}, \{b, b, b\}, \{b, b, a\}, \{b, b, c\},$
 $\{c, c, c\}, \{c, c, a\}, \{c, c, b\}.$

مبرهنة (١،٣)

عدد المجموعات الجزئية المضاعفة التي سعتها r من مجموعة سعتها n يساوي
 $\cdot \binom{n-1+r}{r}$.

البرهان: لتكن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة. لكل مجموعة جزئية مضاعفة سعتها r من A ، تكون جدولًا مكونا من n عمودا و سطرين. نضع في مستطيلات السطر الأول من اليسار إلى اليمين a_1, a_2, \dots, a_n على الترتيب، و لكل $i = 1, 2, \dots, n$ نضع في المستطيل أسفل a_i نجوما عددها يساوي عدد مرات ظهور العنصر a_i في المجموعة المضاعفة. لاحظ أن عدد النجوم في مستطيلات السطر الثاني يساوي r . فمثلا المجموعة المضاعفة $\{a_1, a_1, a_1, a_3\}$ من المجموعة $\{a_1, a_2, a_3\}$ يقابلها الجدول

a_1	a_2	a_3
***		*

وبالعكس، أي جدول عدد النجوم في مستطيلات السطر الثاني فيه r تقابل مجموعات مضاعفة من A سعتها r . عليه، يوجد تقابل بين المجموعات المضاعفة والجداول. لحساب عدد الجداول نعمل التغيير التالي في الجدول:

نحذف الخطوط الأفقية الثلاثة كما نحذف العناصر من الصف الأول والخطين الرأسيين الأول والأخير من الجدول. فمثلاً الجدول أعلاه يصبح بعد التغيير $\{a_2, a_2, a_3, a_3\}$. إذا عدد $\{a_1, a_1, a_2, a_2, a_3, a_3\}$ و بالعكس r يساوي عدد تباديل r نجمة و $n-1$ خط رأسياً. لحساب هذا العدد لدينا $n-1+r$ مكاناً، إذا اختربنا r مكاناً للنجوم فستكون الأمكنة المتبقية للخطوط الرأسية. و حيث إن عدد طرق اختيار r مكاناً من $n-1+r$ مكاناً هو $\binom{n-1+r}{r}$ فإن عدد المجموعات المضاعفة التي سعتها r هو $\binom{n-1+r}{r}$

تمارين (١،١)

- ١ (أ) كم عدداً صحيحاً يقع بين ١ و ٩٩ لا يوجد فيه رقمان متشابهان؟
- (ب) كم عدداً صحيحاً زوجياً يقع بين ١ و ٩٩ لا يوجد فيه رقمان متشابهان؟
- (ب) كم عدداً صحيحاً فردياً يقع بين ١ و ٩٩ لا يوجد فيه رقمان متشابهان؟
- ٢ إذا كانت $B = \{100, 101, \dots, 999\}$ فما هو عدد الأعداد الفردية التي تنتهي إلى B و أرقامها مختلفة؟
- ٣ إذا كانت $B = \{1000, 1001, \dots, 9999\}$ فما هو عدد الأعداد الفردية التي تنتهي إلى B و أرقامها مختلفة؟
- ٤ رميت قطعة نقد ثلاثة مرات، كم عدد الممتاليات الممكنة لظهور الصورة و الكتابة؟
- ٥ كم طريقة ممكنة للإجابة عن عشرين سؤالاً إذا كان يمكن الإجابة عن أي منها بنعم أو لا؟
- ٦ كم طريقة ممكنة للإجابة عن أسئلة امتحان مكون من خمسين سؤالاً إذا كان لكل إجابة عن سؤال من العشرين الأولى ثلاثة خيارات و لكل إجابة سؤال من الثلاثين الباقيه خمسة خيارات؟
- ٧ كم عدد طرق ترتيب حروف الكلمة COMPUTER

(أ) إذا كانت حروف العلة متجاورة؟

(ب) إذا كان الحرف P يظهر إلى يسار T؟

(ج) إذا كان هناك حرفين فقط بين M وC؟

$$\binom{10}{7}, \binom{8}{1}, \binom{5}{2} \binom{7}{3} - 8$$

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{n-1}, \binom{n}{n} - 9$$

$$(8)_3, (8)_4, (7)_6, (n)_1 - 10$$

- 11 - وضح أن $(n)_n = (n)_{n-1}$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} - 12$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{n-k} \binom{n-1}{k} - 13$$

$$- 14 - مستخدما التمارين 13، أثبت أن \binom{2n}{n} عدد زوجي إذا كان n \geq 1.$$

- 15 - أثبت أنه لأي عدد صحيح موجب n يوجد على الأقل n عددا غير أولي.

[إرشاد: اعتبر الأعداد $[(n+1)! + 2, (n+1)! + 3, \dots, (n+1)! + (n+1)]$]

- 16 - بكم طريقة يمكن أن يجلس n فردا حول طاولة مستديرة؟

- 17 - تستخدم سفينة إرسال إشارات برفع سبعة أعلام متتابعة على سارية. كم

إشارة مختلفة يمكن إرسالها بخمسة أعلام مختلفةألوانها؟

- 18 - بكم طريقة يمكن أن تصنف أربع سيارات حمر متطابقة وأربع سيارات

بيض متطابقة بحيث لا تتجاوز سيارتان لهما اللون نفسه؟

- ١٩ - بكم طريقة يمكن أن تصطف أربع سيارات حمر مختلفة و أربع سيارات بيض مختلفة بحيث لا تتجاوز سياتان حمراوان؟
- ٢٠ - كم عدد الكلمات المكونة من خمسة أحرف من الأبجدية العربية إذا كان لا يسمح بتكرار الحرف؟
- ٢١ - طالب لديه 25 من الكتب المختلفة ولديه رف يتسع فقط لعشرة كتب. بكم طريقة يمكنه أن يصف عشرة من كتبه على الرف؟
- ٢٢ - كم عدد تباديل $\{1, 2, \dots, n\}$ التي تتثبت الرقم 1؟
- ٢٣ - بكم طريقة يمكن تجزئة 12 عنصرا مختلفا إلى ثلاثة مجموعات تتكون كل منها من أربعة عناصر؟
- ٢٤ - بكم طريقة يمكن تجزئة $2n$ عنصرا مختلفا إلى n مجموعة تتكون كل منها من عنصرين؟
- ٢٥ - بكم طريقة يمكن تجزئة mn عنصرا مختلفا إلى m مجموعة عدد عناصر كل منها n ؟
- ٢٦ - أثبت أن $r!$ يقسم حاصل ضرب أي r من الأعداد الصحيحة الموجبة المتعاقبة. [إرشاد: اعتبر طرق اختيار r عنصرا من مجموعة عدد عناصرها $[n+r-1]$ عصا مختلفة كسر كل منها إلى جزئين طويل و قصير. بكم طريقة يمكن تكوين n زوجا من الأجزاء بحيث كل زوج يتكون من جزء قصير وآخر طويل؟
- ٢٧ - شركة حلويات تضع في كيس مجموعة من 10 أصابع من الشوكولاتة تختارها من بين ثلاثة أنواع.
- ٢٨ - شركة حلويات تضع في كيس مجموعة من 10 أصابع من الشوكولاتة تختارها من بين ثلاثة أنواع.

(أ) بكم طريقة يمكن أن تكون هذه المجموعة؟

(ب) كم عدد المجموعات التي تحوي على الأقل واحدا من كل نوع؟

. ٢٩ - لتكن A مجموعة عدد عناصرها n .

(١) جد عدد العلاقات التي يمكن تعريفها على A ؟

(٢) جد عدد العلاقات R على A في الحالات التالية:

(أ) R انعكاسية.

(ب) R تنازليّة.

(ج) R انعكاسية و تنازليّة.

(د) R تخالفية.

. ٣٠ - جد عدد المتجهات $v = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ في الحالات التالية:

(أ) $i = 1, 2, \dots, n$ لكل $\alpha_i \in \{0, 1, \dots, k-1\}$

(ب) $i = 1, 2, \dots, n$ لكل $\alpha_i \in \{0, 1, \dots, k_i-1\}$

(ج) $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = r$ و $i = 1, 2, \dots, n$ لكل $\alpha_i \in \{0, 1\}$

. ٣١ - إذا كان $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$ تحليلًا للعدد n إلى عوامله الأولية فجد

(أ) عدد قواسم n .

(ب) عدد قواسم n التي لا يقسمها أي مربع كامل مختلف عن ١.

. ٣٢ - إذا كان p عدداً أولياً فأثبت أن p يقسم $\binom{p}{k}$ لكل عدد صحيح

. $0 < k < p$

(٤) مبرهنة ذات الحدين

في هذا البند سنقدم مبرهنة ذات الحدين و التي يمكن النظر إليها كتطبيق من تطبيقات التوافق. كما سنقدم مبرهنة متعددة الحدود و التي تعتبر عملياً لمبرهنة ذات الحدين.

مبرهنة(٤،١) (متطابقة الكرجي و باسكال)

لأي عددين صحيحين $n \geq k \geq 1$ فإن المتطابقة التالية متحققة

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

البرهان: لتكن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة عدد عناصرها n . و لتكن B مجموعة جزئية من A عدد عناصرها k . لدينا حالتان: إما $a_n \in B$ أو $a_n \notin B$. حسب مبدأ المجموع فإن عدد المجموعات الجزئية من A من السعة k يساوي عدد المجموعات الجزئية من A من السعة k والتي لا تحوي a_n مضافاً إليه عدد المجموعات الجزئية من A من السعة k والتي تحوي a_n .

عدد المجموعات الجزئية من A من السعة k والتي لا تحوي a_n يساوي عدد

$$\binom{n-1}{k} .$$
 المجموعات الجزئية من $\{a_n\} - A$ من السعة k ، إذا يساوي

عدد المجموعات الجزئية من A من السعة k والتي تحوي a يساوي عدد المجموعات الجزئية من $\{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\}$ من السعة $k-1$ ، إذًا يساوي

$$\blacksquare \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

باستخدام متطابقة باسكال يمكن إنشاء مثلث باسكال الذي يتكون من قيم $\binom{n}{k}$.

$$\begin{array}{c}
 & & & 1 \\
 & & 1 & 1 \\
 & 1 & 2 & 1 \\
 1 & 3 & 3 & 1 \\
 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \\
 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots
 \end{array}$$

مبرهنة ذات الحدين (٥، ١) (مبرهنة ذات الحدين)

لأي عددين حقيقيين x, y ، وأي عدد صحيح غير سالب n ، فإن

$$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \dots + \binom{n}{n}y^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}x^{n-i}y^i$$

البرهان: نستخدم الاستقراء الرياضي على n . البرهنة صحيحة عندما $n = 0$ لأن الطرف

$$\cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} x^0 y^0 = 1 = (x + y)^0, \text{ كما أن الطرف الأيمن يساوي } 1 \text{ الأيسر يساوي}$$

لنفرض صحة البرهنة عندما $n = k \geq 0$, أي أن:

$$(x + y)^k = \binom{k}{0} x^k + \binom{k}{1} x^{k-1} y + \binom{k}{2} x^{k-2} y^2 + \dots + \binom{k}{k} y^k$$

نريد إثبات صحة البرهنة عندما $n = k + 1$. أي نريد إثبات أن

$$(x + y)^{k+1} = \binom{k+1}{0} x^{k+1} + \binom{k+1}{1} x^k y + \binom{k+1}{2} x^{k-1} y^2 + \dots + \binom{k+1}{k+1} y^{k+1}$$

لاحظ أن

$$(x + y)^{k+1} = (x + y)(x + y)^k$$

ومن فرضية الاستقراء

$$\begin{aligned} (x + y)^{k+1} &= (x + y) \left[\binom{k}{0} x^k + \binom{k}{1} x^{k-1} y + \binom{k}{2} x^{k-2} y^2 + \dots + \binom{k}{k} y^k \right] \\ &= \binom{k}{0} x^{k+1} + \binom{k}{1} x^k y + \dots + \binom{k}{k-1} x^2 y^{k-1} + \binom{k}{k} x y^k \\ &\quad + \binom{k}{0} x^k y + \binom{k}{1} x^{k-1} y^2 + \dots + \binom{k}{k-1} x y^k + \binom{k}{k} y^{k+1} \\ &= \binom{k}{0} x^{k+1} + \left\{ \binom{k}{1} + \binom{k}{0} \right\} x^k y + \left\{ \binom{k}{2} + \binom{k}{1} \right\} x^{k-1} y^2 + \dots + \\ &\quad \left\{ \binom{k}{k-1} + \binom{k}{k} \right\} x y^k + \binom{k}{k} y^{k+1} \\ &= \binom{k+1}{0} x^{k+1} + \binom{k+1}{1} x^k y + \binom{k+1}{2} x^{k-1} y^2 + \dots + \binom{k+1}{k+1} y^{k+1} \end{aligned}$$

علمًا أننا حصلنا على المساواة الأخيرة باستخدام متطابقة باسكال
لاحظ أن عدد الحدود المختلفة في مفكوك $(x+y)^n$ يساوي $n+1$.

تسمى المتسلسلة

$$1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!}x^n + \dots$$

متسلسلة ذات الحدين (The Binomial Series). و من حساب التفاضل نعلم أنه إذا كان
فإنه لكل عدد حقيقي $k \in R$ يكون $|x| < 1$

$$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!}x^n + \dots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$$

حيث n عدد صحيح و

$$\binom{k}{n} = \begin{cases} 0 & , n < 0 \\ 1 & , n = 0 \\ \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!} & , n > 0 \end{cases}$$

هي معاملات ذات الحدين العممة (Generalized Binomial Coefficients). و بغرض الاستخدام في الفصل المتعلق بالدوال المولدة نجد الآن مفكوك $(1-x)^{-m}$ حيث m عدد صحيح موجب كما يلي:

$$\begin{aligned}
(1-x)^{-m} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-m}{n} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-m}{n} x^n \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(-m)(-m-1)\cdots(-m-n+1)}{n!} x^n \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m+1)\cdots(m+n-1)}{n!} x^n \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(m+n-1)\cdots(m+1)m}{n!} x^n \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{m+n-1}{n} x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m+n-1}{n} x^n
\end{aligned}$$

مثال (١،٨)

جد مفکوك $(x+y)^3$

الحل:

$$(x+y)^3 = \binom{3}{0}x^3 + \binom{3}{1}x^2y + \binom{3}{2}xy^2 + \binom{3}{3}y^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

مثال (١،٩)

$$2^n = (1+1)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}$$

مثال (١٠، ١٠)

أثبت أن :

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots = 2^{n-1}$$

الحل

$$0 = (1 - 1)^n = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \binom{n}{4} - \binom{n}{5} + \dots$$

و منه

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots$$

و بالتعويض في المثال (٩، ١) نجد أن

$$2^n = 2 \left\{ \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots \right\}$$

إذا

$$2^{n-1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots$$

كل متتالية مكونة من جميع عناصر المجموعة المضاعفة A تسمى تبديلات A .

فمثلا، تبديلات $A = \{a, b, b\}$ هي abb و bab و bba .

مبرهنة (١٠٦)

إذا كان لدينا n من العناصر المأخوذة من k نوعاً بحيث عدد العناصر المأخوذة من النوع

$$\frac{n!}{r_1!r_2!\dots r_k!} \text{ هو } r_i \text{ لكل } 1 \leq i \leq k, \text{ فإن عدد تباديل هذه العناصر يساوي}$$

البرهان

لدينا n مكاناً للعناصر من النوع الأول والتي عددها r_1 يمكن أن نختار r_1 مكاناً من

مكاناً بـ $\binom{n}{r_1}$ طريقة. للعناصر من النوع الثاني والتي عددها r_2 يمكن أن نختار r_2 مكاناً

من $n - r_1$ مكاناً بـ $\binom{n - r_1}{r_2}$ طريقة. وعموماً للعناصر من النوع رقم i والتي عددها

يمكن أن نختار r_i مكاناً من $n - r_1 - r_2 - \dots - r_{i-1}$ مكاناً بـ $\binom{n - r_1 - r_2 - \dots - r_{i-1}}{r_i}$

طريقة، لكل $1 \leq i \leq k$. ومن مبدأ حاصل الضرب ينتج المطلوب ■

مثال (١٠١١)

كم عدد التباديل المختلفة التي يمكن تكوينها من حروف كلمة ABACDDEFA

الحل

$$\frac{9!}{3!1!.1!2!1!1!} = \frac{9!}{3!2!} = 30240$$

مبرهنة (١،٧) (مبرهنة متعددة الحدود)

إذا كانت x_1, x_2, \dots, x_m أعداداً حقيقية و كان n عدداً صحيحاً غير سالب، فإن:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum \binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_m} x_1^{r_1} x_2^{r_2} \dots x_m^{r_m}$$

حيث الجمع مأخذ على كل الأعداد الصحيحة غير السالبة r_1, r_2, \dots, r_m التي تحقق

$$\binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_m} = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_m!} \quad \text{و حيث } r_1 + r_2 + \dots + r_m = n$$

البرهان

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = (x_1 + x_2 + \dots + x_m) \cdots (x_1 + x_2 + \dots + x_m) \quad (\text{n مرة})$$

ومنه أي حد من حدود المفهوك يكون من الشكل $x_1^{r_1} x_2^{r_2} \dots x_m^{r_m}$ حيث r_1, r_2, \dots, r_m أعداد صحيحة غير سالبة تتحقق $r_1 + r_2 + \dots + r_m = n$. معامل هذا الحد هو عدد تباديل r_1 عنصراً من النوع x_1 و r_2 عنصراً من النوع x_2 و ... و r_m عنصراً من النوع x_m . من المبرهنة (٦،١)

■ $\binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_m}$ هو يكون معامل

لاحظ أنه إذا وضعنا $m = 2$ في المبرهنة (٦،٧) فإننا نحصل على مبرهنة ذات الحدين. كذلك عدد الحدود المختلفة في مفهوك $"(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n"$ هو وذلك لأن عدد حلول $r_1 + r_2 + \dots + r_m = n$ في الأعداد الصحيحة غير السالبة يساوي

كما سيثبت لاحقاً في النتيجة (١٠،١).

مثال (١٠١)

$$\text{جد مفكوك } .(x+y+z)^2$$

الحل: عدد الحدود في المفكوك هو 6 . $\binom{3-1+2}{2} = \binom{4}{2}$

$$\begin{aligned}(x+y+z)^2 &= \binom{2}{2,0,0}x^2 + \binom{2}{0,2,0}y^2 + \binom{2}{0,0,2}z^2 + \\ &\quad \binom{2}{1,1,0}xy + \binom{2}{1,0,1}xz + \binom{2}{0,1,1}yz \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz\end{aligned}$$

تمارين (١٠٢)

١- استخدم مبرهنة ذات الحدين لإيجاد مفكوك $(x-2)^5$.

٢- استخدم مثلث باسكال لإيجاد مفكوك $(x+1)^6$.

٣- استخدم مبرهنة متعددة الحدود لإيجاد مفكوك $(x+y+z)^4$.

٤- ما هو معامل $x^3y^2z^5$ في مفكوك $?(x+y+z)^{10}$

٥- كم عدد حدود مفكوك $?(x+y+z)^{70}$

٦- باستخدام مبرهنة ذات الحدين أثبت أن: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n$

٧- أوجد قيمة x إذا كان $\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} 8^k = x^{100}$

- ٨- كم عدد تباديل حروف كلمة MISSISSIPPI بحيث I لا يجاور I؟
- ٩- كم عدد تباديل حروف كلمة ILLINOIS بحيث لا يظهر I إلى يسار L؟
- ١٠- كم عدد الممتاليات الثنائية من الطول n و التي تحوي عددا زوجيا من الأصفار و عددا فردريا من الرقم 1؟
- ١١- كم عدد الممتاليات الثنائية من الطول n و التي تحوي عددا زوجيا من الأصفار و عددا زوجيا من الرقم 1؟

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} 2^{n-k} = n 3^{n-1}$$

-١٢- لأي عدد صحيح موجب n ، أثبت أن

$$\cdot \binom{2n}{2} = 2 \binom{n}{2} + n^2$$

-١٣- أعط برهانا تركيبيا للمتطابقة

$$\cdot \binom{3n}{3} = 3 \binom{n}{3} + 6n \binom{n}{2} + n^3$$

-١٤- أعط برهانا تركيبيا للمتطابقة

$$\cdot \binom{n+1}{r+1} = \binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \dots + \binom{n}{r}$$

-١٥- أعط برهانا تركيبيا للمتطابقة

$$\cdot \binom{r}{k} - \binom{r}{k+1} + \binom{r}{k+2} - \binom{r}{k+3} + \dots + (-1)^{r-k} \binom{r}{r} = \binom{r-1}{k-1}$$

-١٦- أثبت أن

[إرشاد: يستخدم متطابقة باسكال]

- ١٧- اكتب مفهوك $2^p = (1+1)^p$ ثم أثبت أن $p | (2^p - 2)$ ، حيث p عدد أولي.
- ١٨- أثبت أن
- $$\binom{m+n}{k} = \binom{m}{0} \binom{n}{k} + \binom{m}{1} \binom{n}{k-1} + \dots + \binom{m}{k} \binom{n}{0}$$

.(Vandermonde's convolution formula) المتطابقة صيغة فاندرمنود للاتفاق

(١٥) نموذج التوزيع للعد

يهدف هذا البند إلى تقديم نموذج التوزيع للعد

ليكن لدينا n كرة نريد توزيعها على صندوقا، (The distribution model of counting)

ثلاثة أسئلة مهمة في هذا السياق:

الأول: هل الكرات مختلفة أم متطابقة؟

الثاني: هل الممكن أن يحوي الصندوق أكثر من كرة؟

الثالث: هل الصناديق مختلفة أم متطابقة؟

في هذا البند سنفرض أن الصناديق مختلفة. إذا لدينا أربع حالات يوضحها المثال

التالي:

(١٦) مثال

يوضح الجدول التالي كل التوزيعات الممكنة لكرتين على ثلاثة صناديق مختلفة.

	لا شروط على عدد الكرات في كل صندوق يحوي كرة على الأكثر	كل صندوق يحوي كرة على الأقل
	كل صندوق	على الأكثر
الكرات مختلفة	$[b_1, b_2] [] []$	$[b_1] [b_2] [] []$
	$[] [b_1, b_2] [] []$	$[b_1] [] [] [b_2]$
	$[] [] [b_1, b_2] []$	$[b_2] [b_1] [] []$
	$[b_1] [b_2] [] []$	$[] [b_1] [b_2] []$
	$[b_1] [] [] [b_2]$	$[b_2] [] [] [b_1]$
	$[b_2] [b_1] [] []$	$[] [] [b_2] [b_1]$
	$[] [] [b_1] [b_2]$	
	$[b_2] [] [] [b_1]$	
	$[] [] [b_2] [b_1]$	
الكرات متطابقة	$[b, b] [] [] []$	$[b] [b] [] []$
	$[] [b, b] [] []$	$[b] [] [] [b]$
	$[] [] [] [b, b]$	$[] [] [b] [b]$
	$[b] [] [b] []$	
	$[b] [] [] [b]$	
	$[] [] [b] [b]$	

ليكن لدينا توزيع لـ r كرة مختلفة $\{b_1, b_2, \dots, b_r\}$ على n من الصناديق المختلفة $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. تكون متتالية x_1, x_2, \dots, x_r طولها r من المجموعة

$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مستخدمين التوزيع العطى كما يلي: x_i هو الصندوق الذي يحوي

الكرة b_i لكل $1 \leq i \leq r$

و بالعكس ، إذا كانت x_1, x_2, \dots, x_r متتالية طولها r من مجموعة الصناديق $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ فإننا نكون توزيعاً للكرات المختلفة $\{b_1, b_2, \dots, b_r\}$ على الصناديق مستخدمين المتتالية العطاة كما يلي: نضع الكرة b_i في الصندوق x_i لكل $1 \leq i \leq r$. عليه ، توزيعات r كرة مختلفة على n من الصناديق المختلفة تقابل المتتاليات التي طولها r من مجموعة سعتها n .

و بالمثل يمكن توضيح أن توزيعات r كرة مختلفة $\{b_1, b_2, \dots, b_r\}$ على n من الصناديق المختلفة $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ و التي لا يحوي فيها صندوق أكثر من كرة تقابل التباديل التي طولها r من المجموعة $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. عليه ، ومن البرهنة (١،٨) ينتج أن:

مبرهنة (١،٨)

- عدد طرق توزيع r كرة مختلفة على n من الصناديق المختلفة يساوي n^r .
- عدد طرق توزيع r كرة مختلفة على n من الصناديق المختلفة بحيث لا يحوي أي صندوق أكثر من كرة يساوي $(n)_r$.

لتكن لدينا r كرة متطابقة موزعة على n من الصناديق المختلفة $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. لكل توزيع نأخذ عينة $\{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ من المجموعة $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ الترتيب فيها غير مهم و سعتها r حيث x_1, x_2, \dots, x_r هي الصناديق التي تحوي الكرات. وبالعكس كل عينة $\{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ سعتها r من المجموعة $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ، لا يكون فيها الترتيب مهمًا تقابل توزيعاً لكرات متطابقة عددها r على n من الصناديق المختلفة $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ كما يلي: نزع الكرات بحيث يكون عدد الكرات في الصندوق i يساوي عدد مرات ظهور العنصر a_i في العينة $\{x_1, x_2, \dots, x_r\}$. عليه، يوجد تقابل بين توزيعات r كرة متطابقة على n من الصناديق المختلفة $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ و العينات من الطول r التي لا يكون فيها الترتيب مهمًا و المأخوذة من مجموعة سعتها n .

لاحظ أنه إذا كان كل صندوق يحوي كرة على الأكثر ، فإن العينات في هذه الحالة تكون مجموعات. أما إذا لم يكن هناك شرط على عدد الكرات في الصناديق، فإن العينات في هذه الحالة تكون مجموعات مضاعفة. من ذلك ومن المبرهنتين (١، ٢) و (٣) نستنتج أن:

مبرهنة (١،٩)

(أ) عدد طرق توزيع r كرة متطابقة على n من الصناديق المختلفة يساوي

$$\binom{n-1+r}{r}$$

(ب) عدد طرق توزيع r كرة متطابقة على n من الصناديق المختلفة بحيث لا يحوي

$$\cdot \binom{n}{r} \text{ أي صندوق اكثـر من كـرة يساـوي}$$

نتيجة (١،١٠)

لكل عدد صحيح $0 \leq r$ فإن عدد الحلول الصحيحة غير السالبة للمعادلة

$$\binom{n-1+r}{r} \text{ يساـوي } X_1 + X_2 + \dots + X_n = r$$

البرهان: للننظر إلى التغيرات X_1, X_2, \dots, X_n كصناديق مختلفة، أي حل صحيح غير سالب للمعادلة يمكن رؤيته كتوزيع له r كرة متطابقة على الصناديق المختلفة X_1, X_2, \dots, X_n . والعكس بالعكس. من المبرهنة (١،٩)، عدد الحلول الصحيحة غير السالبة للمعادلة $\binom{n-1+r}{r}$ يساـوي $X_1 + X_2 + \dots + X_n = r$

مثال (١،١٣)

كم عدد الحلول الصحيحة غير السالبة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 = 2$

الحل: من النتيجة (١٠، ١)، عدد الحلول يساوي

$$\binom{3-1+2}{2} = \binom{4}{2} = 6$$

مثال (١٤، ١)

كم عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 = 30$ إذا كان $X_1 \geq 3$ و

$$X_3 > 6 \text{ و } X_2 \geq 5$$

الحل: حيث إن الحلول صحيحة فإن $X_3 > 6$ تكافئ $X_3 \geq 7$. لنفرض

$$Y_3 = X_3 - 7 \text{ و } Y_2 = X_2 - 5 \text{ و } Y_1 = X_1 - 3$$

$$Y_1 + Y_2 + Y_3 = X_1 - 3 + X_2 - 5 + X_3 - 7 = 30 - 15 = 15$$

ومنه عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 = 30$ إذا كان $X_1 \geq 3$ و

$X_2 \geq 5$ و $X_3 > 6$ يساوي عدد الحلول الصحيحة غير السالبة للمعادلة

$$. Y_1 + Y_2 + Y_3 = 15$$

من النتيجة (١٠، ١)، عدد الحلول يساوي

$$\binom{3-1+15}{15} = \binom{17}{15} = \binom{17}{2} = \frac{(17)(16)}{2} = 136$$

(١٦) تجزئات المجموعات

في هذا البند نجد عدد التجزئات التي عدد أجزائها k لمجموعة منتهية عدد عناصرها n أو ما يسمى بأعداد ستيرلنج من النوع الثاني؛ ونوضح أن عدد التجزئات التي عدد أجزائها k لمجموعة عدد عناصرها n يساوي عدد طرق توزيع n من الكرات المختلفة على k من الصناديق المتطابقة بحيث يحوي كل منها كرة واحدة على الأقل.

لتكن A مجموعة غير خالية. نقول إن $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ تجزئة للمجموعة A إلى k جزءاً أو تجزئة عدد أجزائها k إذا تحقق ما يلي:

$$1 \leq i \leq k \quad \text{لكل } \phi \neq A_i \subseteq A - 1$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k = A - 2$$

$$1 \leq i \neq j \leq k \quad \text{إذا كان } A_i \cap A_j = \phi - 3$$

لتكن $\{X = \{b_1, b_2, b_3\}, \{b_1, b_2\}, \{b_3\}\}$ على أنها توزيع لكرات b_1, b_2, b_3 على صندوقين متطابقين بحيث تكون b_1, b_2 في صندوق b_3 في الصندوق الآخر.

وبوجه عام إذا كانت X مجموعة منتهية عدد عناصرها n فكل تجزئة عدد أجزائها k تقابل توزيعاً لكرات مختلفة عددها n على صناديق متطابقة عددها k بحيث يحوي كل منها كرة واحدة على الأقل. كذلك أي توزيع لكرات مختلفة عددها

n على صناديق متطابقة عددها k بحيث يحوي كل منها كرة واحدة على الأقل يقابل تجزئة عدد أجزائها k للمجموعة X .

يرمز لعدد التجزئات التي عدد أجزائهما k لمجموعة عدد عناصرها n بالرمز $S(n, k)$ و تسمى $S(n, k)$ أعداد ستيرلنج من النوع الثاني

Stirling numbers of the second kind

لتكن $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ هي التجزئة الوحيدة التي عدد أجزائتها 1 للمجموعة X . لاحظ أن $\{X\}$ هي التجزئة الوحيدة التي عدد أجزائتها 1 للمجموعة X . كذلك $S(n, 1) = 1$. منه $\{\{x_1\}, \{x_2\}, \dots, \{x_n\}\}$ هي التجزئة الوحيدة التي عدد أجزائتها n للمجموعة X . عليه $S(n, n) = 1$.

مثال (١، ١٥)

أوجد $S(4, 2)$

الحل: لتكن $\{a, b, c, d\}$. التجزئات التي عدد أجزائها 2 للمجموعة X هي:
 $\{\{d\}, \{a, b, c\}\}$ ، $\{\{c\}, \{a, b, d\}\}$ ، $\{\{b\}, \{a, c, d\}\}$ ، $\{\{a\}, \{b, c, d\}\}$
 $S(4, 2) = 7$. $\{\{a, d\}, \{b, c\}\}$ ، $\{\{a, c\}, \{b, d\}\}$ ، $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}$

مثال (١، ١٦)

$$S(n, n-1) = \binom{n}{2} \text{ لأي عدد صحيح موجب } n$$

البرهان: لتكن P تجزئة عدد أجزائها $n-1$ لمجموعة X عدد عناصرها n . لاحظ انه يوجد جزء واحد فقط من هذه الأجزاء مكون من عنصرين و كل من الأجزاء الأخرى مكون من عنصر واحد فقط . أي أن كل تجزئة تتحدد تماما بتعيين الجزء المكون من عناصرین. و منه :

عدد التجزئات التي عدد أجزائها $n-1$ للمجموعة X يساوي عدد المجموعات الجزئية من X و المكونة من عنصرين. أي يساوي $\binom{n}{2}$.

مثال (١٦)

أوجد $S(4,3)$.

الحل: من المثال (١٦) أعلاه:

$$S(4,3) = \binom{4}{2} = 6$$

حيث إن الأجزاء في التجزئة يجب أن تكون منفصلة زوجا و غير خالية فإن $S(n,k) = 0$ لأي عددين صحيحين موجبين $n > k$. نعرف $S(0,0) = 1$ و $S(n,0) = 0$ لكل عدد صحيح موجب n و نستفيد من ذلك في حساب أعداد ستيرلنج من النوع الثاني باستخدام البرهنة التالية.

مبرهنة (١، ١٢)

لكل عددين صحيحين موجبين n, k فإن

$$S(n+1, k) = S(n, k-1) + kS(n, k)$$

البرهان: لتكن $\{1, 2, \dots, n\}$ و $N = \{1, 2, \dots, n+1\}$. أي تجزئة للمجموعة

N' إلى k جزءاً يمكن الحصول عليها بطريقة وحيدة من التالي :

١- تجزئة للمجموعة N إلى $k-1$ جزءاً، وذلك بإضافة المجموعة $\{n+1\}$ إلى تلك التجزئة. عدد التجزئات في هذه الحالة هو $S(n, k-1)$.

٢- تجزئة للمجموعة N إلى k جزءاً، وذلك بتعيين جزء من أجزاء التجزئة (عددها k) و من ثم إضافة العنصر $n+1$ إليه. حسب مبدأ حاصل الضرب، عدد التجزئات في هذه الحالة هو $kS(n, k)$. من مبدأ المجموع، فابن

$$\blacksquare \quad S(n+1, k) = S(n, k-1) + kS(n, k)$$

مثال (١، ١٨)

مستخدماً البرهنة (١، ١٢) أوجد $S(5, 3)$.

الحل :

$$S(5, 3) = S(4, 2) + 3S(4, 3) = 7 + 3 \cdot 6 = 25$$

يوضح الجدول التالي طريقة لإيجاد أعداد ستيرلينج من النوع الثاني باستخدام

البرهنة (١، ١٢).

	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$	$k = 7$
$n = 1$	1	0	0	0	0	0	0
$n = 2$	1	1	0	0	0	0	0
$n = 3$	1	3	1	0	0	0	0
$n = 4$	1	7	6	1	0	0	0
$n = 5$	1	15	25	10	1	0	0
$n = 6$	1	31	90	65	15	1	0
$n = 7$	1	63	301	350	140	21	1

مبرهنة (١، ١٣)

عدد الدوال الشاملة من مجموعة عدد عناصرها m إلى مجموعة عدد عناصرها n ، حيث $n!S(m, n)$ يساوي $m \geq n$.

البرهان: لتكن $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ و $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ و لتكن $f: X \rightarrow Y$ دالة شاملة. لكل $1 \leq i \leq n$ نعرف المجموعة $\{x \in X : f(x) = y_i\} = f^{-1}(y_i)$. من الواضح أن $f^{-1}(y_i) \subseteq X$ وأن $f^{-1}(y_i) \cap f^{-1}(y_k) = \emptyset$ إذا كان $i \neq k$. كذلك $f^{-1}(y_i) \neq \emptyset$ لأن الدالة شاملة. إذاً $\{f^{-1}(y_i) : 1 \leq i \leq n\}$ تجزئة عدد أجزائها n للمجموعة X . بالقابل يمكننا الحصول على $n!$ دالة شاملة لأي تجزئة عدد أجزائها

n للمجموعة X . و حيث إن عدد التجزئات التي عدد أجزائها n للمجموعة X هو ■ $n!S(m,n)$ ، فينتج من مبدأ حاصل الضرب أن عدد الدوال الشاملة هو

ويمكن الحصول على أعداد ستيرلنج من البرهنة التالية التي سنتبتها باستخدام البرهنة(١،١٣) ، وذلك بعد حساب الدوال الشاملة بطريقة أخرى في البرهنة(٢،٢) في الفصل الثاني.

برهنة(١،١٤)

لأي عددين صحيحين موجبين $n \geq k$ فإن " $S(n,k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$

لنرمز لعدد التجزئات لمجموعة سعتها n بالرمز B_n . من الواضح أن $B_4 = \sum_{k=0}^n S(n,k)$. تسمى هذه الأعداد بأعداد بل (Bell numbers). فمثلاً يمكن الحصول على B_n من جدول أعداد ستيرلنج بجمع عناصر الصف رقم n .

(١٧) تجزئات الأعداد الصحيحة

ليكن n عدداً صحيحاً موجباً. نقول إن المتتالية غير المتزايدة من الأعداد الصحيحة الموجبة n_1, n_2, \dots, n_k تجزئة لـ n إذا كان $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ و لكل $1 \leq i \leq k$ نسمى n_i جزءاً . فمثلاً $3,3,2,1$ تجزئة للعدد 9 .
نرمز لعدد تجزئات العدد n بالرمز $p(n)$. كما نرمز لعدد تجزئات العدد n إلى k جزءاً بالرمز $p_k(n)$.

(١٨) مثال

تجزئات العدد 5 هي :

1,1,1,1,1

2,1,1,1

2,2,1

3,1,1

3,2

4,1

5

عليه $p(5) = 7$ كما أن

$$p_1(5) = 1, \quad p_2(5) = 2, \quad p_3(5) = 2, \quad p_4(5) = 1, \quad p_5(5) = 1.$$

$$p(n) = \sum_{k=1}^n p_k(n)$$

من الواضح أن: لاحظ أنه من الممكن رؤية التجزئة n_1, n_2, \dots, n_k للعدد الصحيح الموجب n كتوزيع له n كرة متطابقة على k من الصناديق المتطابقة بحيث تحوي الصناديق n_1, n_2, \dots, n_k من الكرات. وكذلك يمكن رؤية توزيع n كرة متطابقة على k من الصناديق المتطابقة بحيث لا يوجد صندوق خال كتجزئة للعدد n . عليه، يوجد تقابل بين تجزئات n وتوزيعات n كرة متطابقة على صناديق متطابقة بحيث لا يوجد صندوق خال.

من الممكن بسهولة التتحقق من أن:

$$p(1) = 1, p(2) = 2, p(3) = 3, p(4) = 5, p(5) = 7, p(6) = 11,$$

$$p(7) = 15$$

كذلك يمكن ملاحظة أن:

$$p_n(n) = p_1(n) = p_{n-1}(n) = 1$$

مبرهنة (١، ١٥)

لأي عددين صحيحين موجبين n, k ، فإن:

$$p_k(n+k) = p_1(n) + p_2(n) + \cdots + p_k(n) = \sum_{i=1}^k p_i(n)$$

البرهان: الحد الأيمن هو عدد تجزئات العدد n التي عدد أجزائها أصغر من أو يساوي k . لتكن a_1, a_2, \dots, a_i تجزئة للعدد n إلى i جزءاً حيث $i \leq k$. من هذه التجزئة تكون تجزئة للعدد $n+k$ إلى k جزءاً كما يلي: نضيف 1 إلى كل a_i ، ثم نضيف متتالية كل حد فيها 1 و طولها $k-i$ فنحصل على

$$a_1 + 1, a_2 + 1, \dots, a_i + 1, 1, 1, \dots, 1$$

حيث

$$(a_1 + 1) + (a_2 + 1) + \dots + (a_i + 1) + (k - i) = a_1 + a_2 + \dots + a_i + k = n + k$$

بالقابل، من أي تجزئة للعدد $n+k$ إلى k جزءاً تكون تجزئة للعدد n عدد أجزائها أصغر من أو يساوي k وذلك بحذف كل الأجزاء التي تساوي 1 ثم طرح 1

$$\blacksquare p_k(n+k) = \sum_{i=1}^k p_i(n)$$

نتيجة (١، ١٦)

$$p_k(m) = \sum_{i=1}^k p_i(m-k)$$

البرهان: ضع $n = m - k$ في المبرهنة (١، ١٥)


يعطي الجدول التالي قيم $p_k(n)$ عندما $1 \leq k, n \leq 10$ وقد أنشئ استناداً إلى النتيجة (١، ١٦) و إلى أن $p_k(n) = 0$ عندما $k > n$.

	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7	k=8	k=9	k=10
n=1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n=2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
n=3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
n=4	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
n=5	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0
n=6	1	3	3	2	1	1	0	0	0	0
n=7	1	3	4	3	2	1	1	0	0	0
n=8	1	4	5	5	3	2	1	1	0	0
n=9	1	4	7	6	5	3	2	1	1	0
n=10	1	5	8	9	7	5	3	2	1	1


للتجزئة n_k للعدد الصحيح الموجب n تكون شكل فيرير

برسم n_i نقطة في الصف رقم i لكل $1 \leq i \leq k$. فمثلاً

شكل فيرير للتجزئة 3,2,1,1 للعدد 7 موضح أدناه:



فذلك شكل فيرير للتجزئة 4,2,1 للعدد 7 يكون:



لكل شكل فيrir لتجزئة للعدد n يمكننا الحصول على منقول (transpose) و ذلك بتحويل الصدوق إلى أعمدة. لاحظ أن ما سنحصل عليه هو شكل فيrir لتجزئة للعدد n نفسه.

مثال (١٤٠)

تجزئات العدد 4 إلى أجزاء كل منها أصغر من أو يساوي 3 هي :

3,1

2,2

2,1,1

1,1,1,1

كما أن التجزئات المقابلة لمنقول شكل فيrir لتجزئات المبينة أعلاه هي على الترتيب:

2,1,1

2,2

3,1

4

نلاحظ أن عدد تجزئات العدد 4 إلى أجزاء كل منها على الأكثر 3 يساوي عدد التجزئات للعدد 4 إلى ثلاثة أجزاء أو أقل. في الحقيقة، يمكن تعميم ذلك كما في البرهنة التالية:

مبرهنة (١، ١٧)

عدد التجزئات للعدد الصحيح الموجب n إلى أجزاء كل منها على الأكثر k يساوي عدد التجزئات للعدد n إلى k جزءاً على الأكثر.

البرهان: لاحظ أن منقول شكل فيrir لتجزئة للعدد n إلى أجزاء كل منها أصغر من أو يساوي k يعطي شكل فيrir لتجزئة للعدد n إلى k جزءاً على الأكثر. وهذا صحيح لأن أكبر عدد من النقاط في صف في الشكل الأول هو k على الأكثر وعليه فإن عدد الصفوف في المنقول هو k على الأكثر. وبالعكس منقول شكل فيrir لتجزئة للعدد n إلى k جزءاً على الأكثر هو شكل فيrir لتجزئة للعدد n إلى أجزاء كل منها أصغر من أو يساوي k .

تمارين (١، ٣)

- ١- اكتب عبارة مكافئة (على شكل عدد الحلول الصحيحة لمعادلة) لما يلي:
 - (أ) عدد طرق توزيع r كرة متطابقة على n من الصناديق المختلفة.
 - (ب) عدد طرق توزيع r كرة متطابقة على n من الصناديق المختلفة بحيث يحوي كل صندوق كرتين على الأكثر.
 - (ج) عدد المجموعات الجزئية المكونة من ثلاثة عناصر من المجموعة $\{A, B, C, D, E\}$.

(ر) عدد طرق توزيع r كررة متطابقة على n من الصناديق المختلفة بحيث يحوي كل صندوق كرتين على الأقل.

- ٢- كم عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 15$ إذا كان $? X_k \leq 5$ لكل $X_k \geq 0$

- ٣- كم عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 15$ إذا كانت $? X_k \geq -3$

- ٤- كم عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 15$ إذا كانت $? X_k \geq 2k$

- ٥- كم عدد الحلول الصحيحة للمتباينة $? X_k \geq 0$ إذا كانت $X_1 + X_2 + X_3 \leq 10$

- ٦- كم عدد الحلول الصحيحة للمتباينة $X_1 + X_2 + X_3 \leq 10$ إذا كانت $? X_k \geq -2$

- ٧- كم عدد الحلول الصحيحة للمتباينة $X_1 + X_2 + X_3 \leq 10$ إذا كانت $? X_k \geq 2k$

- ٨- كم عدد الحلول الصحيحة للمعادلتين $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 20$ و $? X_k \geq 0$ إذا كانت $X_1 + X_2 + X_3 = 5$

- ٩- لأي عدد صحيح موجب $n \geq 2$ ، أثبت أن $S(n,2) = 2^{n-1} - 1$

- ١٠- لأي عدد صحيح موجب $n \geq 3$ ، أثبت أن $S(n,3) = \frac{1}{2}(3^{n-1} + 1) - 2^{n-1}$

- ١١- لأي عدد صحيح موجب $n \geq 4$ ، أثبت

$$S(n, n-2) = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}$$

-١٢ - لأي عدد صحيح $n \geq 6$ ، أثبت

$$S(n, n-3) = \binom{n}{4} + \binom{n}{3} \binom{n-3}{2} + \frac{1}{6} \binom{n}{2} \binom{n-2}{2} \binom{n-4}{2}$$

-١٣ - لتكن $X = \{a, b, c, d, e\}$ و $Y = \{f, g, h, i\}$. ما عدد الدوال الشاملة من

إلى Y ؟

-١٤ - أكتب كل التجزئات للأعداد 3,4,6,7 .

-١٥ - لأي عدد صحيح موجب n ، أثبت أن $P_2(n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$

-١٦ - لأي عدد صحيح موجب n ، أثبت أن $p_n(2n) = p(n)$

-١٧ - لأي عدد صحيح موجب n ، أثبت أن $p_n(2n+1) = p(n+1) - 1$

-١٨ - لأي عدد صحيح موجب $n \geq 4$ ، أثبت $p_{n-2}(n) = 2$

الفصل الثاني

مبدأ التضمين والإقصاء

THE INCLUSION-EXCLUSION PRINCIPLE

يعتبر مبدأ المجموع للعد أبسط مبادئ العد الأساسية، ويفيدنا بأنه إذا كانت

A_1, A_2, \dots, A_n مجموعات منتهية منفصلة زوجاً زوجاً فإن

$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$. و مبدأ التضمين والإقصاء -

في أبسط صوره - يعطينا صيغة لحساب $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$ عندما نسمح

للمجموعات A_1, A_2, \dots, A_n أن تكون متشابكة.

فيما يلي سنفرض أن U مجموعة شاملة منتهية معطاة وأن A_1, A_2, \dots, A_n

مجموعات جزئية من U ؛ ولكل $\alpha_i = \sum_{k=1}^i A_{j_k}$ حيث يؤخذ

المجموع على جميع المجموعات الجزئية المكونة $\{j_1, j_2, \dots, j_i\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$.

مبرهنة (١، ٢) (مبدأ التضمين والإقصاء)

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \alpha_1 - \alpha_2 + \dots + (-1)^{n-1} \alpha_n$$

البرهان

ليكن $x \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$. عند حساب $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$ فإن x يعد مرة واحدة؛ و يختلف الأمر عند حساب كل من $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. سنتثبت أن إسهام x في حساب العدد $\alpha_1 - \alpha_2 + \dots + (-1)^{n-1} \alpha_n$ يساوي 1. نفرض أن x ينتمي فقط إلى المجموعات $A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_m}$ في حساب العدد

إسهام x في حساب العدد $\alpha_1 = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$. كذلك، إن إسهام x في حساب العدد $\binom{m}{2}$ ؛ لأن

إسهام x في حساب $|A_i \cap A_j|$ يساوي 0 في حالة $\{j_1, \dots, j_m\} \not\subseteq \{i, j\}$ و يساوي 1 في حالة $\{j_1, \dots, j_m\} \subseteq \{i, j\}$. و بالمثل فإن إسهام x في حساب العدد α_i

يساوي $\binom{m}{i}$ لكل $1 \leq i \leq n$. إذن، إن إسهام x في حساب العدد

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m} \text{ يساوي } \alpha_1 - \alpha_2 + \dots + (-1)^{n-1} \alpha_n$$

لكل $1 \leq i \leq n$. و لكن من نتيجة لمبرهنة ذات الحدين نعلم أن

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m} = \binom{m}{0} = 1$$

في كثير من المسائل، نحسب عدد العناصر التي لا تنتمي إلى أي من المجموعات A_1, A_2, \dots, A_m مستخدمين النتيجة التالية لبدأ التضمين والإقصاء.

نتيجة(٢،١)

إذا كانت U مجموعة شاملة منتهية وكانت A_1, A_2, \dots, A_n مجموعات جزئية من U ، فإن

$$|U - (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)| = |U| - \alpha_1 + \alpha_2 - \dots + (-1)^n \alpha_n$$

و الآن نستند إلى مبدأ التضمين والإقصاء و نتيجته و نقدم مجموعة من البرهانات والأمثلة المتنوعة.

مبرهنة(٢،٢)

إن عدد التطبيقات الشاملة من المجموعة $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ إلى المجموعة $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ حيث $m \geq n$ ، يساوي

$$n^m - \binom{n}{1}(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \dots + (-1)^n \binom{n}{n-1} 1^m = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m$$

البرهان

لتكن U هي مجموعة التطبيقات من A إلى B . ضع $\{(f) : f \in U, b_k \notin R(f)\}$. إذاً المطلوب حساب العدد لكل $1 \leq k \leq n$ ، حيث $R(f)$ ترمز إلى مدى f . إذاً المطلوب حساب العدد $|U - (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)|$. واضح أن $|U| = n^m$. الآن نحسب α_1 من العلاقة $|A_1| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$. من تعريف A_k ينتج أن $|A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|$. إذاً $|A_k| = (n-1)^m$. وبالتالي فإن $|A_k| = (n-1)^m$. لـ كل $1 \leq k \leq n$.

حساب $\alpha_1 = n(n-1)^m$

$\alpha_2 = |A_1 \cap A_2| + \dots + |A_1 \cap A_n| + |A_2 \cap A_3| + \dots + |A_{n-1} \cap A_n|$ نلاحظ أن $B \setminus \{b_i, b_j\}$ ، حيث $1 \leq i < j \leq n$ ، يساوي عدد التطبيقات من A إلى $\{A_i \cap A_j\}$

و بالتالي فإن $\alpha_2 = \binom{n}{2}(n-2)^m$. إذا $|A_i \cap A_j| = (n-2)^m$ و بالمثل نجد أن

إذا $1 \leq k \leq n$. لكل $\alpha_k = \binom{n}{k}(n-k)^m$

$$\begin{aligned} & |U - (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)| \\ &= |U| - \alpha_1 + \alpha_2 - \dots + (-1)^n \alpha_n \\ &= n^m - \binom{n}{1}(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \dots + (-1)^n \binom{n}{n-1} 1^m \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m \end{aligned}$$

إذا كان $\{f: \{1,2,\dots,n\} \rightarrow \{1,2,\dots,n\}$ تبديلا ، فإننا نقول إنه تبديل تمام إذا تحقق الشرط التالي : $f(i) \neq i$. نرمز لزمرة تناظر المجموعة $\{1,2,\dots,n\}$ بالرمز S_n و عدد تبديلاتها التامة بالرمز d_n .

مثال (٢٠١)

إن عدد التبديلات التامة للمجموعة $\{1,2,\dots,n\}$ يساوي

$$d_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

البرهان

ضع $U = S_n$ ، ولكل $1 \leq k \leq n$ ضع $A_k = \{f \in S_n : f(k) = k\}$. إذا المطلوب حساب العدد $|U - (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)| = n!$. نعلم أن $|U| = |S_n| = n!$. الآن نحسب من العلاقة $\alpha_1 = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$ يتساوى عدد تبديلات المجموعة $\{1, 2, \dots, n\} \setminus \{k\}$ ، و بالتالي فإن $|A_k| = (n-1)!$ لكل

$$\text{إذا } 1 \leq k \leq n \quad \alpha_1 = n((n-1)!) = \frac{n!}{1!}$$

$$\text{نلاحظ أن } \alpha_2 = |A_1 \cap A_2| + \dots + |A_1 \cap A_n| + |A_2 \cap A_3| + \dots + |A_{n-1} \cap A_n|$$

$$\text{حيث } 1 \leq i < j \leq n \text{ ، يتساوى عدد تبديلات المجموعة } |A_i \cap A_j|$$

$$\text{و بالتالي فإن } |A_i \cap A_j| = (n-2)! \text{ . إذا } 1 \leq i < j \leq n$$

$$\alpha_k = \binom{n}{k} (n-k)! = \frac{n!}{k!} \text{ . وبالمثل نجد أن } \alpha_2 = \binom{n}{2} ((n-2)!) = \frac{n!}{2!}$$

$$\text{إذا } 1 \leq k \leq n$$

$$\begin{aligned} |U - (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)| &= \\ &= |U| - \alpha_1 + \alpha_2 - \dots + (-1)^n \alpha_n \\ &= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{n!}{n!} \\ &= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) \end{aligned}$$

$$\text{نلاحظ أن } \frac{d_n}{n!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \approx e^{-1} \approx 0.368 \text{ من أجل قيم } n$$

الكبيرة. أي، إن عدد التبديلات التامة للمجموعة $\{1, 2, \dots, n\}$ يتساوى $\frac{1}{3}$ عدد تبديلاتها تقريبا.

مثال (٢،٢)

نقول إن التبديل $f \in S_n$ حال من التعاقب إذا حق الشرط التالي:
 لكل $1 \leq j < n$ نريد حساب عدد التبديلات الخالية من $f(j+1) \neq f(j)+1$.
 التعاقب، والذي نرمز له بالرمز q_n . لأجل ذلك ضع $U = S_n$ ، ولكل $1 \leq k < n$
 ضع $A_k = \{f \in S_n \mid f(k) = k, f(j+1) = j+1 \text{ لـ } 1 \leq j < k\}$.
 فإذا المطلوب حساب العدد $|U - (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1})| = q_n$. وابتعاء

للسهولة، نستخدم الآن لغة الأنماق للحديث عن التبديلات. نلاحظ أن تبديلاً ما ينتمي إلى المجموعة A_1 إذا وفقط إذا كان يحتوي على النسق 12. وبالنالي فإنه يوجد
 تقابل من A_1 إلى مجموعة تبديلات مجموعة الرموز $\{1,2,3,4,\dots,n\}$. إذا

بالمثل نجد أن $|A_k| = (n-1)!$ لكل $1 \leq k < n$. وهكذا فإن

$$\alpha_1 = (n-1)((n-1)!)$$

$\alpha_2 = |A_1 \cap A_2| + \dots + |A_1 \cap A_n| + |A_2 \cap A_3| + \dots + |A_{n-2} \cap A_{n-1}|$
 إذا كان $f \in A_1 \cap A_2$ فإن f يحتوي على النسقين 23 و 12؛ أما إذا كان
 $f \in A_1 \cap A_3$ فإن f يحتوي على النسقين 34 و 12. في الحالة الأولى يحتوي
 النسقان 23 و 12 على العنصر المشترك 2، وبالنالي فإن كل $f \in A_1 \cap A_2$ يحتوي
 على النسق 123. إذا $|A_1 \cap A_2|$ يساوي عدد تبديلات المجموعة
 $\{1,2,3,4,5,\dots,n\}$. أي، $|A_1 \cap A_2| = (n-2)!$. وفي الحالة الثانية لا يحتوي
 النسقان 34 و 12 على أي عنصر مشترك. إذا $|A_1 \cap A_3|$ يساوي عدد تبديلات
 المجموعة $\{1,2,3,4,5,6,\dots,n\}$. أي، $|A_1 \cap A_3| = (n-2)!$. وبالمثل نجد أن

لكل $1 \leq i < j < n - 1$. و بالتالي فإن $|A_i \cap A_j| = (n - 2)!$

$$\text{لكل } \alpha_k = \binom{n-1}{k} ((n-k)!) \text{ . وبشكل عام نجد أن } \alpha_2 = \binom{n-1}{2} ((n-2)!) \\ \text{إذن } 1 \leq k \leq n-1$$

$$q_n = n! - \binom{n-1}{1} (n-1)! + \binom{n-1}{2} (n-2)! - \dots + (-1)^{n-1} \binom{n-1}{n-1} 1!$$

ولكن

$$\binom{n-1}{k} (n-k)! = \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \cdot (n-k)! = (n-1)! \frac{n-k}{k!}$$

إذن

$$q_n = n! - (n-1)! \frac{n-1}{1!} + (n-1)! \frac{n-2}{2!} - \dots + (-1)^{n-1} (n-1)! \frac{1}{(n-1)!} \\ = (n-1)! \left[n - \frac{n-1}{1!} + \frac{n-2}{2!} - \frac{n-3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \right] \\ = (n-1)! \left[n - \frac{n}{1!} + \frac{n}{2!} - \frac{n}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{n}{(n-1)!} + (-1)^n \frac{n}{n!} \right] + \\ (n-1)! \left[\frac{1}{1!} - \frac{2}{2!} + \frac{3}{3!} - \frac{4}{4!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{n-1}{(n-1)!} - (-1)^n \frac{n}{n!} \right] \\ = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right] + (n-1)! \left[1 - \frac{1}{1!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \right] \\ = d_n + d_{n-1}$$

و نلاحظ أن

$$\frac{q_n}{n!} = \frac{d_n}{n!} + \frac{d_{n-1}}{n!} = \frac{d_n}{n!} + \frac{1}{n} \cdot \frac{d_{n-1}}{(n-1)!} \approx \frac{1}{e} + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{e} = \frac{n+1}{en}$$

مثال (٢،٣)

جد عدد الأعداد الصحيحة x بحيث $1 \leq x \leq 500$ ، $5 \nmid x$ ، $6 \nmid x$ لا يقسم x ، $8 \nmid x$

الحل :

ضع $\{x \in U : 6|x\}$ وضع $U = \{1, 2, \dots, 500\}$ و $A_1 = \{x \in U : 5|x\}$ و $A_2 = \{x \in U : 6|x\}$ و $A_3 = \{x \in U : 8|x\}$ فيكون المطلوب حساب العدد $|U - (A_1 \cup A_2 \cup A_3)|$. نلاحظ أن $|A_3| = \left\lfloor \frac{500}{8} \right\rfloor = 62$ ، $|A_2| = \left\lfloor \frac{500}{6} \right\rfloor = 83$ ، $|A_1| = \left\lfloor \frac{500}{5} \right\rfloor = 100$. وكما هو

معلوم فإن $a|n$ و $b|n$ إذا وفقط إذا كان $\text{lcm}(a, b)|n$ ، لذلك نجد أن

$$|A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{40} \right\rfloor = 12 \quad , \quad |A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{500}{30} \right\rfloor = 16 \\ |A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{120} \right\rfloor = 4 \quad , \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{120} \right\rfloor = 20$$

$$|U - (A_1 \cup A_2 \cup A_3)| = |U| - |A_1| + |A_2| - |A_3| \\ = 500 - (100 + 83 + 62) + (16 + 12 + 20) - 4 = 299$$

مثال (٢،٤)

أحسب $\varphi(40)$. أي، احسب قيمة دالة أويلر φ عند العدد 40.

الحل:

نلاحظ أن $A_1 = \{x \in U : 2|x\}$ ، $U = \{1, 2, \dots, 40\}$ و نضع $40 = (2^3)(5)$. إذا $A_2 = \{x \in U : 5|x\}$

$$\begin{aligned}\phi(40) &= |U| - (|A_1| + |A_2|) + |A_1 \cap A_2| \\ &= 40 - \left(\left\lfloor \frac{40}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{40}{5} \right\rfloor \right) + \left\lfloor \frac{40}{10} \right\rfloor \\ &= 40 - (20 + 8) + 4 = 16\end{aligned}$$

و هكذا يمكن حساب $\varphi(n)$ عندما نعلم تحليل n إلى عوامله الأولية.

مثال (٢،٥)

جد عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 = 13$ بحيث $0 \leq X_1 \leq 6$

$$0 \leq X_3 \leq 3 , 0 \leq X_2 \leq 9$$

الحل: نفرض أن U مجموعة الحلول بحيث $X_i \geq 0$ لـ $1 \leq i \leq 3$ ، وأن A_1 مجموعة الحلول بحيث $X_3 \geq 0$ ، $X_2 \geq 0$ ، $X_1 \geq 7$ ، وأن A_2 مجموعة الحلول بحيث $X_3 \geq 0$ ، $X_2 \geq 10$ ، $X_1 \geq 0$. إذا المطلوب حساب العدد $|U - (A_1 \cup A_2 \cup A_3)|$.

$$\text{واضح أن } |U| = \binom{13+3-1}{13} = 105 \text{ . وبالمثل نجد أن}$$

$$|A_2| = \binom{13-10+3-1}{13-10} = 10 \text{ ، } |A_1| = \binom{13-7+3-1}{13-7} = 28$$

$$, |A_1 \cap A_2| = 0 , |A_3| = \binom{13 - 4 + 3 - 1}{13 - 4} = 55$$

$$. |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0 , |A_2 \cap A_3| = 0 , |A_1 \cap A_3| = \binom{13 - 7 - 4 + 3 - 1}{13 - 7 - 4} = 6$$

و بالتالي فإن

$$. |U - (A_1 \cup A_2 \cup A_3)| = 105 - (28 + 10 + 55) + (0 + 6 + 0) - 0 = 18$$

يُنْتَجُ مِنْ تَعْرِيفِ اِتْحَادِ الْمَجَمُوعَاتِ A_1, A_2, \dots, A_n أَنْ مِبْدأَ التَّضْمِينِ وَالْإِقْصَاءِ يُعِينُ عَدْدَ الْعَنَاصِرِ الَّتِي تَنْتَمِيُ إِلَى الْأَقْلَى إِلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَجَمُوعَاتِ A_1, A_2, \dots, A_n . وَ لِلْحُصُولِ عَلَى تَعمِيمَيْنِ بِسِيطَيْنِ لِهَذَا الْبَدْأِ، نَرْمِزُ لِعَدْدِ الْعَنَاصِرِ الَّتِي تَنْتَمِيُ بِالضَّيْبَطِ إِلَى m مَجَمُوعَةٍ مِنَ الْمَجَمُوعَاتِ A_1, A_2, \dots, A_n بِالرُّمْزِ e_m ، كَمَا نَسْتَخْدِمُ الرُّمْزِ I_m لِلدلَالَةِ عَلَى عَدْدِ الْعَنَاصِرِ الَّتِي تَنْتَمِيُ إِلَى الْأَقْلَى إِلَى m مَجَمُوعَةٍ مِنَ الْمَجَمُوعَاتِ A_1, A_2, \dots, A_n . الْمَبْرُهَنَةُ التَّالِيَةُ تَعْطِينَا التَّعْمِيمَيْنِ الْمُطَلُوبَيْنِ.

(٣، ٢) مَبْرُهَنَةٌ

$$e_m = \alpha_m - \binom{m+1}{m} \alpha_{m+1} + \binom{m+2}{m} \alpha_{m+2} + \dots + (-1)^{n-m} \binom{n}{m} \alpha_n \quad (أ)$$

$$I_m = \alpha_m - \binom{m}{m-1} \alpha_{m+1} + \binom{m+1}{m-1} \alpha_{m+2} + \dots + (-1)^{n-m} \binom{n-1}{m-1} \alpha_n \quad (ب)$$

البرهان

(أ) ليكن $x \in U$ ، حيث U المجموعة الشاملة. نفرض أن x ينتمي بالضبط إلى r مجموعة من المجموعات A_1, A_2, \dots, A_n . إذا كان $m < r$ فإن إسهام x في حساب كل من الأعداد $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_r$ يساوي 0 و بالتالي فإن إسهام x في حساب كل من طرف المعادلة يساوي 0. وإذا كان $r = m$ فإن إسهام x في حساب كل من العددين $\alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ يساوي 1 و إن إسهام x في حساب كل من $\alpha_{m+2}, \dots, \alpha_r$ يساوي 0 ؛ و بالتالي فإن إسهام x في حساب كل من طرف المعادلة يساوي 1. أخيراً، نفرض أن $n < r \leq m$. نلاحظ أن إسهام x في حساب α_m يساوي 0 ، كما أن إسهام x في حساب الأعداد $\alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_r$ يساوي $\binom{r}{m}, \binom{r}{m+1}, \dots, \binom{r}{r}, 0, \dots, 0$ على الترتيب. إذاً يجب إثبات أن إسهام x في حساب الطرف الأيمن للمعادلة يساوي 0. أي يجب إثبات أن

$$\binom{r}{m} - \binom{m+1}{m} \binom{r}{m+1} + \binom{m+2}{m} \binom{r}{m+2} - \dots + (-1)^{r-m} \binom{r}{m} \binom{r}{r} = 0$$

باستخدام العلاقة $\binom{r}{k} \binom{k}{t} = \binom{r}{t} \binom{r-t}{k-t}$ نجد أن

$$\begin{aligned} \binom{r}{m} - \binom{m+1}{m} \binom{r}{m+1} + \binom{m+2}{m} \binom{r}{m+2} - \dots + (-1)^{r-m} \binom{r}{m} \binom{r}{r} &= \\ = \binom{r}{m} - \binom{r}{m} \binom{r-m}{1} + \dots + (-1)^{r-m} \binom{r}{m} \binom{r-m}{r-m} & \end{aligned}$$

$$= \binom{r}{m} \left[1 - \binom{r-m}{1} + \cdots + (-1)^{r-m} \binom{r-m}{r-m} \right] = \binom{r}{m} (1 + (-1))^{r-m} = 0$$

(ب) نلاحظ أولاً أن $I_n = e_n$ ، $I_m = e_m + I_{m+1}$ و بالتالي فإن $I_m = e_m + e_{m+1} + e_{m+2} + \cdots + e_n$. من ناحية أخرى، من التمرين ١٦ في تمارين (٢، ١)

نجد العلاقة

$$\binom{r}{k} - \binom{r}{k+1} + \binom{r}{k+2} - \binom{r}{k+3} + \cdots + (-1)^{r-k} \binom{r}{r} = \binom{r-1}{k-1}$$

التي تبسط لنا صيغة $I_m = e_m + e_{m+1} + e_{m+2} + \cdots + e_n$ الناتجة من (أ) إلى الشكل

$$I_m = \alpha_m - \binom{m}{m-1} \alpha_{m+1} + \cdots + (-1)^{n-m} \binom{n-1}{m-1} \alpha_n$$

مثال (٢، ٦)

نقول إن التبديل $f \in S_n$ يثبت العنصر $x \in \{1, 2, \dots, n\}$ عندما يكون $x = f(x)$.

نستخدم الرمز $d_{n,m}$ للدلالة على عدد التبديلات $f \in S_n$ التي تثبت بالضبط m

عنصرا من العناصر $1, 2, \dots, n$. واضح أن $d_{n,m} = \binom{n}{m} d_{n-m}$ لأنه إذا كان f يثبت

بالضبط m عنصرا فلا بد أن يصاحبه تبديل تام لـ $n-m$ عنصرا. نريد حساب

$d_{n,m}$ باستخدام (أ) من البرهنة (٣، ٢) و النقاش المتضمن في المثال (١، ٢). نجد أن

$$d_{n,m} = e_m = \alpha_m - \binom{m+1}{m} \alpha_{m+1} + \cdots + (-1)^{n-m} \binom{n}{m} \alpha_n$$

$$\begin{aligned}
&= \binom{n}{m} (n-m)! - \binom{m+1}{m} \binom{n}{m+1} (n-m-1)! + \cdots + (-1)^{n-m} \binom{n}{m} \\
&= \binom{n}{m} \left[(n-m)! - \binom{n-m}{1} (n-m-1)! + \cdots + (-1)^{n-m} \right] = \binom{n}{m} d_{n-m}
\end{aligned}$$

مثال (٢،٧)

أثبت بطريقة تركيبية أن $n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \binom{n}{k} 2^{n-k}$

الحل:

نفرض أن $U = \{x_1 x_2 \dots x_n : x_i \in \{0,1\} \text{ for all } i = 1, 2, \dots, n\}$ و لكل $i = 1, 2, \dots, n$ نفرض أن $A_i = \{x_1 x_2 \dots x_n \in U : x_i = 0\}$. نحسب عدد الممتاليات التي تحتوي بالضبط على 0 واحد. أولاً، لكل $i = 1, 2, \dots, n$ توجد ممتالية واحدة بحيث يكون 0 حدها رقم i بينما تكون حدودها الأخرى 1. إذا عدد الممتاليات المطلوبة يساوي n . ثانياً، حسب (أ) من البرهنة (٢،٣) فإن عدد هذه الممتاليات يساوي

$$\begin{aligned}
e_1 &= \alpha_1 - \binom{2}{1} \alpha_2 + \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{1} \alpha_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \alpha_k = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \binom{n}{k} 2^{n-k} \\
&\quad n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \binom{n}{k} 2^{n-k} \quad \text{إذا}
\end{aligned}$$

و نلاحظ أنه يمكن الحصول على العلاقة السابقة بطريقة غير تركيبية كما

يليه:

من مبرهنة ذات الحدين نجد أن

$$(x+2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k 2^{n-k}$$

باشتاقاق الطرفين بالنسبة إلى x نجد أن

$$n(x+2)^{n-1} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} kx^{k-1} 2^{n-k}$$

و عندما يكون $x = -1$ نحصل على

$$n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k(-1)^{k-1} 2^{n-k}$$

تمارين

١- أظهر استعراض لتسجيل 100 من الطلاب أن 32 طالباً مسجلون في المقرر أ، 44 طالباً مسجلون في المقرر ب، 47 طالباً مسجلون في المقرر ج، 11 طالباً مسجلون في المقررين ب وج، 12 طالباً مسجلون في المقررين أ وج، 12 طالباً مسجلون في المقررين أ و ب، وأن 3 طلاب مسجلون في المقررات الثلاثة. جد عدد الطلاب غير المسجلين في المقررات الثلاثة.

٢- أجريت اختبارات على 200 عينة من المياه الجوفية بهدف البحث عن وجود الأملاح أ، ب، ج فيها. فوجد أن 14 عينة تحتوي على الملح أ، 10 عينات تحتوي على الملح ب، 8 عينات تحتوي على الملح ج، 6 عينات تحتوي على

الملحين أ و ب ، 6 عينات تحتوي على الملحنين ب وج ، 4 عينات تحتوي على الملحنين أ وج ، و عينتان تحتويان على الملحنين أ و ب ولا تحتويان على الملحن ج .
جد عدد العينات التي تحتوي على الأقل على واحد من الأملاح الثلاثة .

-٣-

- (أ) جد عدد تباديل $1,2,\dots,11$ التي تجعل كل عدد زوجي في موضعه الطبيعي و تجعل كل عدد فردي في غير موضعه الطبيعي .
- (ب) ما هو عدد تباديل $1,2,\dots,11$ التي تجعل بالضبط 4 أعداد في أماكنها الطبيعية ؟
- (ج) جد عدد تباديل $1,2,\dots,11$ التي تجعل كل عدد فردي في غير موضعه الطبيعي .
- ٤- جد عدد تبديلات n ، $1,2,\dots,1$ التي تجعل كل عدد زوجي في موضعه الطبيعي و تجعل كل عدد فردي في غير موضعه الطبيعي .
- ٥- جد عدد تبديلات n ، $1,2,\dots,1$ التي تجعل بالضبط k عددا في أماكنها الطبيعية .
- ٦- جد عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 20$ بحيث يكون $X_i \leq 10$ لـ $i = 1,2,\dots,5$.
- (أ) $.i = 1,2,\dots,5 \leq X_i \leq 10$ لـ $i = 1,2,\dots,5$.
- (ب) $.i = 1,2,\dots,5 \leq X_i \leq 8$ لـ $i = 1,2,\dots,5$.

٧- جد عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 30$ بحيث يكون

. $i = 1,2,3,4$ لكل $0 \leq X_i \leq 8$ (أ)

. $i = 1,2,3,4$ - لكل $10 \leq X_i \leq 20$ (ب)

. $0 \leq X_1 \leq 6$ ، $0 \leq X_2 \leq 9$ ، $0 \leq X_3 \leq 15$ ، $0 \leq X_4 \leq 18$ (ج)

٨- جد عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 = 30$ بحيث يكون

. $10 \leq X_3 \leq 24$ ، $6 < X_2 \leq 14$ ، $5 \leq X_1 < 11$

٩- إذا كانت $A = \{1,2,\dots,999999\}$ ، فما هو عدد الأعداد التي تنتهي إلى A و التي

مجموع أرقام كل منها يساوي ١٥؟

١٠- جد عدد المجموعات المضاعفة من السعة ١٥ المأخوذة من المجموعة

$A = \{a_1, a_2, a_3\}$ بحيث يكون تكرار a_1 أصغر من ٥ ، تكرار a_2 أصغر من ٧ ،

تكرار a_3 أصغر من ٦.

١١- جد عدد الأعداد الصحيحة n ، $1 \leq n \leq 2000$ ، بحيث

. $2|n, 3|n, 5|n, 7|n$. (أ) $2|n, 3|n, 5|n, 7|n$. (ب) $2|n, 3|n, 5|n$. (ج)

١٢- جد عدد تبديلات الحروف a, b, c, \dots, x, y, z التي لا تحتوي على أي من

.path, train, time

١٣ - جد عدد تبديلات حروف الكلمة equation التي لا تثبت أي حرف من حروف .a, e, i, o, u العلة

١٤ - (أ) أحسب d_3, d_4, d_5

(ب) إذا كان 11660 يساوي عدد التبديلات التامة للأعداد $n, 1, 2, \dots, n$ التي تظهر فيها الأعداد 1, 2, 3, 4, 5 في الموضع الخمسة الأولى من التبديل التام، فجد n .

١٥ - إذا كان $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}$ حيث كل من p_1 و p_2 عدد أولي، فأثبت أن

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right)$$

١٦ - إذا رمي 8 أحجار نرد مختلفة فجد احتمال أن تظهر جميع الأعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6

١٧ - جد عدد ترتيبات الحروف $a, a, a, b, b, b, c, c, c$ بحيث

(أ) لا تكون أي 3 حروف متعاقبة من النوع نفسه.

(ب) لا يكون أي حرفين متعاقبين من النوع نفسه.

١٨ - جد عدد ترتيبات الحروف $a, a, a, b, b, b, b, c, c$ بحيث لا تكون الحروف من النوع نفسه متعاقبة.

١٩ - جد عدد ترتيبات الحروف $a, a, b, b, c, c, d, d, d$ بحيث لا يكون أي حرفين متعاقبين من النوع نفسه.

٢٠ - جد عدد ترتيبات حروف الكلمة INTELLIGENT بحيث

(أ) يوجد زوج واحد على الأقل من الحروف المتعاقبة من النوع نفسه.

(ب) يوجد زوجان على الأقل من الحروف المتعاقبة من النوع نفسه.

(ج) يوجد زوجان بالضبط من الحروف المتعاقبة من النوع نفسه.

٢١ - جد عدد طرق توزيع r كرة مختلفة على n صندوقاً مختلفاً، $r \geq n$ ، بحيث لا يكون أي من الصناديق خالية.

٢٢ - استخدم الاستقراء الرياضي لإثبات مبدأ التضمين والإقصاء.

٢٣ - استخدم نوعاً من الاستقراء الرياضي الخلفي لإثبات العلاقة المعطاة في (ب) من البرهنة (٢، ٣)، كما يلي:

$$(أ) \text{ لاحظ أن } l_n = e_n = \alpha_n$$

$$(ب) \text{ لاحظ أن } l_{n-1} = e_{n-1} + l_n$$

$$(ج) \text{ أثبت أن } l_{n-1} = \alpha_{n-1} - \binom{n-1}{n-2} \alpha_n$$

$$(د) \text{ لكل } 1 \leq r \leq n-1, \text{ لاحظ أن } l_r = e_{r-1} + l_r$$

(هـ) استخدم الاستقراء الرياضي الخلفي لإثبات المطلوب.

الفصل الثالث

الدواال المولدة

GENERATING FUNCTIONS

يبرز هذا الفصل ترابط فروع علم الرياضيات، حيث نستخدم خواص كثيرات الحدود الجبرية و خواص المتسلسلات التحليلية لحل بعض مسائل العد.

(٣،١) مقدمة

يُختزل الكثير من مسائل العد إلى مسألة إيجاد الحد العام a_n لمتتالية (a_n) من الشكل $\dots, a_n, a_1, a_2, \dots$ و تعتبر طريقة الدوال المولدة إحدى الطرائق الفعالة لإيجاد a_n حيث نجد دالة مولدة لالممتالية (a_n) ثم نستخرج a_n منها.

تعرف الدالة المولدة العاديّة $g(x)$ (ordinary generating function) لالممتالية

(a_n) بأنها متسلسلة القوى الشكليّة (formal power series)

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

وتعُرف الدالة المولدة الأسيّة $h(x)$ (exponential generating function) للمتتالية

(a_n) بأنها المتسلسلة

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!} = a_0 + a_1 x + a_2 \frac{x^2}{2!} + \cdots + a_n \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

الدالة المولدة العاديّة ($g(x)$) للمتتالية (2^n) هي

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n = 1 + 2x + 2^2 x^2 + \cdots + 2^n x^n + \cdots$$

ويمكن الوصول إلى كتابة ($g(x)$) على الشكل $\frac{1}{1-2x}$ $g(x)$ الذي يسمى صيغة

مختصرة (closed form formula) لـ ($g(x)$) من خلال منظوريين مختلفين. الأول لا

يتعلق بالدوال وتقريب المتسلسلات حيث ننظر إلى $\frac{1}{1-2x}$ على أنها النظير الضربي

$(1-2x)^{-1}$ لمتسلسلة القوى الشكليّة $x - 1$ في حلقة متسلسلات القوى الشكليّة

$C[[x]]$ على حقل الأعداد المركبة C . أما الثاني فنرى من خلاله $\frac{1}{1-2x}$ على أنها

دالة مماثلة بممتسلسلة القوى $\cdots + 2^n x^n + 2^2 x^2 + \cdots + 2x + 1 + x^{\frac{1}{2}}$ عندما $x < 0$.

وتخينا للسهولة فإننا سنعتمد المقاربة الثانية لتقديم الدوال المولدة. ويستطيع القارئ أن يعود إلى أحد كتب التفاضل والتكامل لمراجعة موضوع متسلسلات القوى و

تمثيل الدوال بها.

مثال (٣، ١)

جد الدالة المولدة العاديّة للمتتالية . ١, ١, ..., ١, ...

الحل:

$$g(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}$$

مثال(٣،٢)

جد الدالة المولدة الأسيّة للمقّتالية .
1,1,...,1,....

الحل:

$$h(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = e^x$$

و من هنا جاء استخدام الكلمة "أسيّة" في التعريف.

ملاحظات

فيما يلي سنستخدم الاصطلاحات التالية :

- ١- نستخدم عبارة "الدالة المولدة" بدلاً من "الدالة المولدة العاديّة".
- ٢- نستخدم عبارة "المولدة لـ a_n " بدلاً من "المولدة للمقّتالية (a_n) ".
- ٣- إذا كان نص المسألة لا يحتوي صراحة أو ضمناً على مقّتالية واستخدمنا عبارة "جد الدالة المولدة لـ ...". فإننا نقصد بذلك تعليم المسألة بحيث تحتوي على مقّتالية يكون حل المسألة الأصلية أحد حدودها.

(٣،٢) الدوال المولدة العاديّة

مثال (٣،٣)

كم عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 = r$ إذا كانت $0 \leq X_1 \leq 1$ و $1 \leq X_2 \leq 2$.

الحل: من الجدول أدناه يتضح أنه يوجد حل واحد إذا كانت $r = 1$ أو $r = 3$ و حلان إذا كانت $r = 2$.

X_1	X_2	$X_1 + X_2$
0	1	1
0	2	2
1	1	2
1	2	3

مثال (٣،٤)

أوجد مفكوك $(x^0 + x^1)(x^1 + x^2)$

الحل:

$$\begin{aligned}(x^0 + x^1)(x^1 + x^2) &= x^0(x^1 + x^2) + x^1(x^1 + x^2) \\&= x^0x^1 + x^0x^2 + x^1x^1 + x^1x^2 = x^{0+1} + x^{0+2} + x^{1+1} + x^{1+2} \\&= x^1 + x^2 + x^2 + x^3 = x^1 + 2x^2 + x^3\end{aligned}$$

لاحظ أن معامل x^3 في مفكوك $(x^0 + x^1)(x^1 + x^2)$ يساوي عدد حلول المعادلة في المثال (٣، ٣) عندما $r = 1, r = 2, r = 3$ على الترتيب. ويمكن تعميم هذه الملاحظة كما في البرهنة التالية.

برهنة (٣، ١)

ليكن a_r هو عدد الحلول الصحيحة لمسألة

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n = r$$

$i = 1, 2, \dots, n$ لكل $X_i = \alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots$

إن الدالة المولدة العادية للمتتالية (a_r) هي

$$g(x) = (x^{\alpha_{1,1}} + x^{\alpha_{1,2}} + \cdots)(x^{\alpha_{2,1}} + x^{\alpha_{2,2}} + \cdots) \cdots (x^{\alpha_{n,1}} + x^{\alpha_{n,2}} + \cdots)$$

البرهان

إن حدا نمطياً في مفكوك $(x)g$ قبل التبسيط و تجميع الحدود المتشابهة يكون على الشكل المرتب $x^{\alpha_n} \cdots x^{\alpha_2} x^{\alpha_1}$ حيث الحد x^{α_i} مأخوذ من العامل

على $x^{\alpha_{i,1}} + x^{\alpha_{i,2}} + \dots$) لكل $i = 1, 2, \dots, n$. وبعد التبسيط يكون الحد النمطي على الشكل $x^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}$. وللحصول على x^r لا بد أن يكون $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = r$. أي، لا بد أن يكون $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = r$. $X_1 = \alpha_1, X_2 = \alpha_2, \dots, X_n = \alpha_n$. فإذا $g(x) = x^r$ في مفوك (α_r) يساوي a , هي الدالة المولدة العادية للمتتالية (α_r) . ■

نتيجة (٣، ١)

لكل عدد صحيح $n \geq 1$ فإن

$$(1-x)^{-n} = (1+x+x^2+\dots)^n \\ = \binom{n-1+0}{0} + \binom{n-1+1}{1}x + \dots + \binom{n-1+k}{k}x^k + \dots$$

البرهان: $(1+x+x^2+\dots)^n$ هي الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة غير السالبة للالمعادلة $X_1 + X_2 + \dots + X_n = k$ في x^k . ومن النتيجة (١، ١٠) فإن معامل x^k في $\binom{n-1+k}{k}$ هو

مثال (٣، ٥)

أوجد الدالة المولدة لعدد المجموعات الجزئية من السعة r المأخوذة من مجموعة عدد عناصرها n .

الحل: المتتالية (a_i) هي $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}, 0, 0, \dots$ وعليه فإن الدالة المولدة هي

$$g(x) = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \dots + \binom{n}{n}x^n = (1+x)^n$$

مثال (٣،٦)

أوجد الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة غير السالبة للمعادلة

$$X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4 = 30$$

الحل: لكل $1 \leq i \leq 4$ ضع $Y_i = iX_i$. أي أن الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة غير السالبة للمعادلة $X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4 = 30$ هي نفسها الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة للمعادلة $Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 = 30$

حيث

$$Y_1 = 0, 1, 2, \dots, k, \dots \quad Y_2 = 0, 2, 4, \dots, 2k, \dots \quad Y_3 = 0, 3, 6, \dots, 3k, \dots$$

$$Y_4 = 0, 4, 8, \dots, 4k, \dots \text{ من البرهنة (١،٣)، الدالة المولدة هي}$$

$$g(x) = (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + \dots)(1 + x^4 + x^8 + \dots)$$

مثال (٣،٧)

أوجد الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 = 10$ إذا كان

$$\text{لكل } i = 1, 2, 3 \quad X_i = 0, 2, 4, \dots$$

الحل: من المبرهنة (١، ٣)، الدالة المولدة هي

$$g(x) = (1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)^3$$

مثال (٣، ٨)

أوجد الدالة المولدة لعدد طرق اختيار أربعة أعداد غير متعاقبة من بين الأعداد

$$1, 2, \dots, n$$

الحل: افرض أن $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < n_4 \leq n$ أعدادا غير متعاقبة. لتكن

$$X_1 = n_1, X_2 = n_2 - n_1, X_3 = n_3 - n_2, X_4 = n_4 - n_3, X_5 = n - n_4$$

لاحظ أن $X_5 \geq 0$ و $X_1 \geq 1$. كذلك $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = n$. بما أن

الأعداد غير متعاقبة فإن $2 \leq i \leq 4$ لكل $X_i \geq 1$. عليه، أي حل صحيح للمعادلة

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = n \quad \text{و } X_5 \geq 0 \quad \text{و } X_i \geq 1 \quad \text{لكل } i \leq 4$$

$i \leq 2$ يعطي أربعة أعداد غير متعاقبة و العكس صحيح. من المبرهنة (١، ٣)، الدالة

$$g(x) = (x + x^2 + \dots)(x^2 + x^3 + \dots)^3(1 + x + x^2 + \dots) \quad \text{المولدة هي}$$

إن استخراج α من الدالة المولدة $(x) g$ يتطلب أحيانا إيجاد مفكوك عبارات من الشكل "... + $x + x^2 + \dots + x^{m-1}$ " و من الشكل "(1 + $x + x^2 + \dots + x^{m-1}$)". وهذا ما تفصله المبرهنة التالية.

مبرهنة (٢، ٣)

لكل عدد صحيح $n \geq 0$ فإن :

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r \quad (\text{أ})$$

$$(1-x^m)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} x^{rm} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + \dots \quad (\text{ج})$$

$$(1+x+x^2+\dots)^n = (1-x)^{-n} = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{r+n-1}{r} x^r \quad (\text{د})$$

$$(1+x+x^2+\dots+x^{m-1})^n = (1-x^m)^n (1-x)^{-n} \quad (\text{هـ})$$

$$(\sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r)(\sum_{r=0}^{\infty} b_r x^r) = \sum_{r=0}^{\infty} (a_0 b_r + a_1 b_{r-1} + \dots + a_r b_0) x^r \quad (\text{وـ})$$

البرهان

باستخدام مبرهنة ذات الحدين نحصل بسهولة على كل من (أ) و (ب). و تم إثبات (د) في النتيجة (١، ٣) وبعد المبرهنة (١، ٥) مباشرة و أما (وـ) فهي تعريف حاصل ضرب متسلسلتي قوى. وأخيرا فإن $(1-x)(1+x+x^2+\dots+x^{m-1}) = 1 - x^m$ تؤدي إلى

■ (هـ)

مثال (٩، ٣)

أوجد معامل x^{20} في مفكوك $(x^3 + x^4 + \dots)^3$.

الحل:

$$= (x^3 + x^4 + \dots)^3 = (x^3(1 + x + x^2 + \dots))^3 = x^9(1 + x + x^2 + \dots)^3 = x^9(1 - x)^{-3}$$

$$= x^9 \left\{ \binom{3-1+0}{0} + \binom{3-1+1}{1} x + \dots + \binom{3-1+k}{k} x^k + \dots \right\}$$

ومنه معامل x^{20} يساوي

$$\binom{3-1+11}{11} = \binom{13}{11} = \binom{13}{2} = 78$$

مثال (٣، ١٠)

أوجد معامل x^9 في مفكوك $(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5)^4$

الحل:

$$(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5)^4 = \left(\frac{1-x^6}{1-x} \right)^4$$

$$= (1-x^6)^4 (1-x)^{-4}$$

$$= \left\{ \binom{4}{0} - \binom{4}{1} x^6 + \binom{4}{2} x^{12} - \binom{4}{3} x^{18} + \binom{4}{4} x^{24} \right\} \left\{ \binom{4-1+0}{0} + \binom{4-1+1}{1} x + \dots \right\}$$

و منه معامل x^9 يساوي

$$\binom{4}{0} \binom{4-1+9}{9} - \binom{4}{1} \binom{4-1+3}{3} = \binom{12}{9} - 4 \binom{6}{3} = 220 - 80 = 140$$

مثال (١١، ٣)

جد عدد طرق الحصول على المجموع 9 عند رمي ثلاثة أحجار نرد مختلفة.

الحل: لـ كل $i = 1, 2, 3$ ليكن X_i هو العدد الذي يظهر على الحجر رقم i . عليه، العدد المطلوب هو عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 = 9$ بحيث $X_1 + X_2 + X_3 = r$ بحيث $1 \leq X_i \leq 6$. ليكن a_r هو عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 = r$ بحيث $1 \leq X_i \leq 6$. من البرهنة (١، ٣)، الدالة المولدة للممتالية (a_r) هي $g(x) = (x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^3$ وبالتالي فإن العدد المطلوب هو a_9 ويمكن حسابه كما يلي:

$$\begin{aligned} g(x) &= (x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^3 \\ &= x^3(1 + x + \dots + x^5)^3 \\ &= x^3 \left(\frac{1-x^6}{1-x} \right)^3 = x^3 \frac{(1-x^6)^3}{(1-x)^3} \\ &= x^3 (1-x^6)^3 (1-x)^{-3} \\ &= x^3 (1-3x^6 + 3x^{12} - x^{18}) \sum_{r=0}^{\infty} \binom{3-1+r}{r} x^r \\ &= (x^3 - 3x^9 + 3x^{15} - x^{21}) \sum_{r=0}^{\infty} \binom{r+2}{r} x^r \end{aligned}$$

و منه

$$a_9 = \binom{6+2}{6} - 3 \binom{0+2}{0} = \binom{8}{6} - 3 \binom{2}{0} = 28 - 3 = 25$$

مثال (٣، ١٢)

جد عدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 20$ بحيث لكل

$$i = 1, 2, 3$$

الحل: لنضع $5X_3 = Y_1$ و $X_1 = Y_2$ و $Y_3 = 2X_2$. فيكون العدد المطلوب هو عدد الحلول للمسألة

$$Y_1 + Y_2 + Y_3 = 20$$

$$Y_1 = 0, 1, 2, \dots$$

$$Y_2 = 0, 2, 4, \dots$$

$$Y_3 = 0, 5, 10, \dots$$

إذا المطلوب هو c_{20} حيث c_r هو عدد الحلول الصحيحة للمسألة

$$Y_1 + Y_2 + Y_3 = r$$

$$Y_1 = 0, 1, 2, \dots$$

$$Y_2 = 0, 2, 4, \dots$$

$$Y_3 = 0, 5, 10, \dots$$

ولهذا الغرض نفرض أن $g(x) = \sum_{r=0}^{\infty} c_r x^r$ هي الدالة المولدة العادية للمتتالية (c_r) .
بالاستناد إلى المبرهنة (١، ٣) نجد أن

$$g(x) = (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots)$$

$$= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^5} = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}$$

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)} = \sum_{r=0}^{\infty} c_r x^r \quad \text{إذا}$$

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)} = \sum_{r=0}^{\infty} b_r x^r \quad \text{و} \quad \frac{1}{(1-x)} = \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r$$

، $\frac{1}{(1-x)} = (1-x^2) \sum_{r=0}^{\infty} b_r x^r$ ، $r = 0, 1, 2, \dots$ لكل $a_r = 1$ عندئذ

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)} = (1-x^5) \sum_{r=0}^{\infty} c_r x^r$$

$$\sum_{r=0}^{\infty} b_r x^r = (1-x^5) \sum_{r=0}^{\infty} c_r x^r \quad \text{،} \quad \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r = (1-x^2) \sum_{r=0}^{\infty} b_r x^r \quad \text{إذا}$$

و بالتالي فإن

$$r \geq 0 \quad c_r = b_r + c_{r-5} \quad \text{لكل} \quad b_r = a_r + b_{r-2} = 1 + b_{r-2}$$

حيث $r < 0$ عندما يكون $b_r = c_r = 0$

و بالحساب المباشر نجد أن

$$b_0 = 1, b_5 = 3, b_{10} = 6, b_{15} = 8, b_{20} = 11$$

و منه فإن

$$c_0 = 1, c_5 = 4, c_{10} = 10, c_{15} = 18, c_{20} = 29$$

و بالتالي فإن عدد حلول المسألة المعطاة هو $c_{20} = 29$.

لكل عدد صحيح $n \geq 0$ ، ليكن p_n هو عدد تجزئات n و $p_0 = 1$ اصطلاحاً.
تزودنا البرهنة التالية بالدالة المولدة للمتتالية (p_n) ؛ و الجدير بالذكر أنه لا توجد
طريقة سهلة معروفة لاستخراج p_n من هذه الدالة.

برهنة (٣، ٣)

إذا كانت $g(x)$ هي الدالة المولدة للمتتالية (p_n) فإنه يمكن كتابة $g(x)$ على شكل

$$g(x) = \prod_{k=1}^{\infty} (1-x^k)^{-1}$$

البرهان

لأي تجزئة للعدد n و لكل $1 \leq i \leq n$ ، ليكن X_i هو عدد مرات ظهور العدد i في
تلك التجزئة. إذا $X_1 + 2X_2 + \dots + nX_n = n$ حيث $0 \leq X_i \leq n$ عدد صحيح لكل
 $1 \leq i \leq n$. وبوضع $Y_i = iX_i$ لكل $1 \leq i \leq n$. نجد أن p_n يساوي عدد الحلول
الصحيحة لالمعادلة $Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n = n$ لكل $Y_i = 0, 1, 2, \dots$ حيث

و بتطبيق البرهنة (١، ٣) نجد أن p_n يساوي معامل x^n في مفکوك

$$g(x) = \prod_{k=1}^{\infty} (1-x^k)^{-1}$$

فإننا نهمل العوامل

$$(1-x^k)^{-1} = \frac{1}{1-x^k} = (1+x^k+x^{2k}+\dots)$$

حيث $n > k$ ، و بالتالي فإننا نحسب معامل x^n في مفكوك $\prod_{k=1}^n (1-x^k)^{-1}$. و هكذا فإن

■ p_n يساوي معامل x^n في مفكوك $g(x)$. إذا (p_n) هي الدالة المولدة للمتتالية

لكل عدد صحيح $n \geq 1$ ، ل يكن e_n هو عدد تجزئات n التي أجزاؤها مختلفة و عددها زوجي و ل يكن o_n هو عدد تجزئات n التي أجزاؤها مختلفة و عددها فردي.

مثال (١٣، ٣)

إذا كان $q_n = e_n - o_n$ لكل عدد صحيح $n \geq 1$ ، و $q_0 = 1$ فإنه يمكن كتابة الدالة المولدة للمتتالية (q_n) على الشكل

$$g(x) = \prod_{k=1}^{\infty} (1-x^k)$$

البرهان: نجد بسهولة أن (a_n) هي الدالة المولدة للمتتالية (q_n)

حيث a_n هو عدد تجزئات n التي أجزاؤها مختلفة و $a_0 = 1$ (أنظر التمرين ٣٠ في

نهاية هذا البند). و لحساب معامل x^n في مفكوك $\prod_{k=1}^{\infty} (1-x^k)^{-1}$ فإننا نهمل العوامل

$\prod_{k=1}^n (1-x^k)$ حيث $n < k$. وبالتالي فإننا نحسب معامل x^n في مفكوك $(1-x^k)^{-1}$

نلاحظ أن كل تجزئة للعدد n بحيث تكون أجزاؤها مختلفة و عددها r تساهم بالعدد

$(-1)^r$ في معامل x^n . فمثلا التجزئة $1+3+4+5=13$ تقابل الحد

$(-1)^{13} \prod_{k=1}^{13} (1-x^k)^{-1}$ في مفكوك $(-x)(-x^3)(-x^4)(-x^5)$ وبالتالي فهي تساهم بالعدد 4

في معامل x^{13} ؛ أما التجزئة $7 + 4 + 2 = 13$ فإنها تقابل الحد $(-x^2)(-x^4)(-x^7)$ في مفوك $\prod_{k=1}^{13} (1-x^k)$ وبالتالي فهي تساهم بالعدد $(-1)^3$ في معامل x^{13} . ولما كان $(-1)^m = 1$ لكل عدد زوجي m و $(-1)^t = -1$ لكل عدد فردي t فإنه ينتج أن معامل x^n في مفوك $\prod_{k=1}^{\infty} (1-x^k)$ يساوي $e_n - o_n$.

مبرهنة (٤، ٣)


لكل عدد صحيح موجب n فإن

$$e_n - o_n = \begin{cases} (-1)^k, & n = \frac{k(3k+1)}{2} \\ 0, & n \neq \frac{k(3k+1)}{2} \end{cases}$$

حيث k عدد صحيح موجب.

البرهان

لتكن S هي مجموعة تجزئات n التي أجزاؤها مختلفة. إذا كانت $\lambda \in S$ وكان F هو شكل فيrir المصاحب لـ λ فإننا نستخدم الرمز $b(\lambda)$ للدلالة على أصغر أجزاء λ ونسمى السطر المقابل لـ $b(\lambda)$ في F قاعدة λ ؛ كما نستخدم الرمز $h(\lambda)$ للدلالة على طول أطول متتالية متناقصة حدودها أعداد صحيحة متزايدة وحدتها الأولى هو أكبر أجزاء λ وحدودها الأخرى أجزاء لـ λ ونسمى الخط المكون من النقاط الأخيرة في الأسطر المقابلة لحدود هذه المتتالية في F وتر λ . فمثلاً إذا كانت λ هي التجزئة $10 + 9 + 8 + 6 + 5$ فإن $b(\lambda) = 5$ و $h(\lambda) = 3$ ويوضح الشكل التالي كلاً من وتر λ وقاعدة λ :



الآن، نعرف العمليتين B و H على أشكال فيريير كما يلي:

أولاً: إذا كان $b(\lambda) \leq h(\lambda)$ و كان تقاطع وتر λ و قاعدة λ خالياً أو إذا كان $b(\lambda) < h(\lambda)$ و كان تقاطع وتر λ و قاعدة λ غير خال فـإن العملية B تعني حذف قاعدة λ و توزيع نقاطها نقطة نقطة على الأسطر العليا لتكون وترا للشكل الناتج.

ثانياً: إذا كان $b(\lambda) > h(\lambda)$ و كان تقاطع وتر λ و قاعدة λ خالياً أو إذا كان $b(\lambda) \geq h(\lambda) + 2$ و كان تقاطع وتر λ و قاعدة λ غير خال فـإن العملية H تعني حذف وتر λ و إضافة نقاطه أسفل قاعدة λ لتكون قاعدة للشكل الناتج.

بما أن إجراء B يتطلب أن يكون $b(\lambda) \leq h(\lambda)$ و إجراء H يتطلب أن يكون $b(\lambda) > h(\lambda)$ فإنه يمكن على الأكثر إجراء إحدى العمليتين B و H على أي شكل F من أشكال فيرير. ويمكن التحقق بسهولة من أنه إذا كان إجراء B على الشكل F ممكناً و يعطي الشكل F' فإن إجراء H على F' ممكناً و يعطي F . وبالتالي إذا كان إجراء H على الشكل F ممكناً و يعطي الشكل F'' فإن إجراء B على F'' ممكناً و يعطي F . ولما كانت كل من B و H تغير عدد الأجزاء بوحدة فإن B و H تحدثان تقبلاً بين مجموعة التجزئات التي أجزاؤها مختلفة و عددها زوجي و مجموعة التجزئات التي أجزاؤها مختلفة و عددها فردي كلما كان إجراء B و H ممكناً. وبالتالي فإن $e_n - o_n = 0$ في هذه الحالة.

إذا كان $b(\lambda) \leq h(\lambda)$ فإنه لا يمكن إجراء H في حالة واحدة فقط و ذلك عندما يكون تقاطع وتر λ و قاعدة λ غير خالٍ و $b(\lambda) = h(\lambda)$. لتكن الحال كذلك و $b(\lambda) = h(\lambda) = k$. إذا

$$\begin{aligned} n &= k + (k+1) + (k+2) + \dots + (2k-1) \\ &= \frac{k(3k-1)}{2} \end{aligned}$$

إذا كان $b(\lambda) > h(\lambda)$ فإنه لا يمكن إجراء B في حالة واحدة فقط و ذلك عندما يكون تقاطع وتر λ و قاعدة λ غير خالٍ و $b(\lambda) - 1 = h(\lambda)$. لتكن الحال كذلك و $b(\lambda) - 1 = h(\lambda) = k$

$$\begin{aligned} n &= (k+1) + (k+2) + (k+3) + \dots + 2k \\ &= \frac{k(3k+1)}{2} \end{aligned}$$

وبملاحظة أنه لا يوجد عددين صحيحين موجبين k', k'' بحيث $\frac{k'(3k'-1)}{2} = \frac{k''(3k''+1)}{2}$ فنجد أنه يمكن إحداث التقابل المذكور أعلاه بعد حذف شكل واحد عدد أسطره k من أشكال فيrir عندما يكون $n = \frac{k(3k\mp 1)}{2}$. وبالتالي فإن $e_n - o_n = (-1)^k$ في هذه الحالة.

و تنتج المطابقة التالية مباشرة من البرهنة (٤، ٣) والمثال (١٣، ٣).

برهنة (٥) (مطابقة أويلر Euler's Identity)

$$\prod_{k=1}^{\infty} (1-x^k) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k (x^{\frac{k(3k-1)/2}{2}} + x^{\frac{k(3k+1)/2}{2}})$$

وبالاستناد إلى مطابقة أويلر و البرهنة (٣، ٣) نحصل على المطابقة

$$[1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k (x^{\frac{k(3k-1)/2}{2}} + x^{\frac{k(3k+1)/2}{2}})] [\sum_{r=0}^{\infty} p(r)x^r] = 1$$

وبعد حساب معامل x^n ، $n \geq 1$ من الطرف الأيسر لهذه المطابقة و مساواته بالصفر

نحصل على العلاقة الارتدادية

$$(*) \dots p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + \\ p(n-12) + p(n-15) - p(n-22) + p(n-26) + \dots$$

التي يتكون طرفيها الأيمن من عدد منته من الحدود $p(n-k)$ حيث $n-k \geq 0$. ويمكن استخدام هذه العلاقة الارتدادية بفعالية لحساب $p(n)$ كما يوضح المثال التالي.

مثال (١٤، ٣)

احسب $p(11)$

الحل: $p(0) = 1$ اصطلاحاً، وبالحساب المباشر نجد أن

$$p(1) = 1, p(2) = 2, p(3) = 3, p(4) = 5, p(5) = 7$$

الآن، نستخدم العلاقة الارتدادية (*) لإنشاء الجدول التالي الذي يبين أن

$$p(11) = 56$$

n	6	7	8	9	10	11
$p(n-1)$	7	11	15	22	30	42
$p(n-2)$	5	7	11	15	22	30
$p(n-5)$	1	2	3	5	7	11
$p(n-7)$	-	1	1	2	3	5
$p(n)$	11	15	22	30	42	56

المبرهنة التالية تبين لنا كيف ننشئ دالة مولدة جديدة من دوال مولدة معطاة.
ستظهر أهمية هذا الإنشاء في حل المسائل المتعلقة بإيجاد بعض المجاميع.

مبرهنة (٦، ٣)

إذا كانت $(g(x))$ هي الدالة المولدة للمتتالية (a_n) و $(h(x))$ هي الدالة المولدة للمتتالية

(b_n) فإن :

(أ) $\frac{g(x)}{1-x}$ هي الدالة المولدة للمتتالية $(a_0 + a_1 + \dots + a_n)$.

(ب) C_1, C_2 هي الدالة المولدة للمتتالية $(C_1 a_n + C_2 b_n)$ ، حيث ثابتان.

(ج) $(1-x)g(x)$ هي الدالة المولدة للمتتالية $(a_n - a_{n-1})$.

(د) $xg'(x)$ هي الدالة المولدة للمتتالية (na_n) ، حيث $(g'(x))$ هي مشتقة $(g(x))$.

(هـ) $g(x)h(x)$ هي الدالة المولدة للمتتالية $(a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0)$ التي

تسمى التفاف (convolution) المتتاليتين (a_n) و (b_n) .

البرهان

يمكن للقارئ إثبات المطلوب بسهولة. وفيما يلي نقدم برهاناً للفقرة (د) على سبيل المثال.

$$\text{بما أن } g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \text{فإن} \quad g(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

$$xg'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n$$

مثال (١٥، ٣)

أوجد صيغة مختصرة للدالة المولدة للمتتالية (n^2) .

الحل: الدالة المولدة للمتتالية (١) هي $\frac{1}{1-x}$ ومن فقرة (د) من البرهنة (٣، ٦) تكون الدالة المولدة للمتتالية (n) هي

$$x \left(\frac{1}{1-x} \right)' = x \frac{-(-1)}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2}$$

من فقرة (د) من البرهنة (٦، ٣) تكون الدالة المولدة للمتتالية (n^2) هي

$$x \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)' = x \left[\frac{(1-x)^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^4} \right] = x \left[\frac{(1-x) + 2x}{(1-x)^3} \right] = \frac{x + x^2}{(1-x)^3}$$

مثال (٣، ١٦)

أوجد صيغة مختصرة للدالة المولدة للمتتالية ($0^2 + 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$). ثم جد $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$

الحل: من المثال (١٥) و باستخدام الفقرة (أ) من البرهنة (٦، ٣) تكون الدالة المولدة للمتتالية ($0^2 + 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$) هي

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(1-x)} \frac{x+x^2}{(1-x)^3} = \frac{x+x^2}{(1-x)^4} = (x+x^2)(1-x)^{-4} \\ & = (x+x^2) \left[\binom{4-1+0}{0} + \binom{4-1+1}{1} x + \binom{4-1+2}{2} x^2 + \dots \right] \end{aligned}$$

و منه معامل x^n يساوي

$$\binom{4-1+n-1}{n-1} + \binom{4-1+n-2}{n-2} = \binom{n+2}{n-1} + \binom{n+1}{n-2} = \binom{n+2}{3} + \binom{n+1}{3}$$

$$= \frac{(n+2)(n+1)n}{3!} + \frac{(n+1)n(n-1)}{3!} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

تمارين (١، ٣)

- ١- أوجد الدالة المولدة للمتتالية 2,2,2,... .
- ٢- أوجد الدالة المولدة للمتتالية 2^٠,2^١,2^٢,... .
- ٣- أوجد معامل x^5 في مفکوك $(1+x+x^2+\dots)(1+2x^2+3x^3+\dots)$.
- ٤- ما هي الدالة المولدة لعدد المتتاليات الثنائية من الطول ٢؟
- ٥- ما هي الدالة المولدة لعدد المجموعات المضاعفة التي عدد عناصرها r و المأخوذة من المجموعة $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ؟
- ٦- ما هي الدالة المولدة لعدد المجموعات المضاعفة التي عدد عناصرها r و المأخوذة من المجموعة $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ بحيث يظهر كل عنصر على الأقل مرة واحدة؟
- ٧- أوجد الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة للمعادلة $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = r$ إذا كان $k = 1, 2, 3, 4$ لكل X_k .
- ٨- أوجد الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة غير السالبة للمعادلة X_1, X_3, X_5 إذا كانت $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = r$ أعداداً زوجية و أعداداً فردية.

٩- أوجد الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة للمعادلة

$$X_1 + X_2 = 6 \text{ حيث } X_k \geq 0 \text{ لكل } k = 1, 2, \dots, 6$$

١٠- أوجد الدالة المولدة لعدد الحلول الصحيحة للمعادلة $2X_1 + 3X_2 + 5X_3 = r$

$$\text{إذا كان } k = 1, 2, 3 \text{ لكل } X_k > 0$$

١١- أوجد الدالة المولدة لعدد طرق توزيع r كرة متطابقة على n صندوقاً مختلفاً بحيث لا يوجد صندوق خالٍ وعدد الكرات فردي في كل صندوق.

١٢- أوجد الدالة المولدة لعدد الأعداد الصحيحة غير السالبة التي هي أصغر من مائة ألف و مجموع أرقامها r .

١٣- أوجد الدالة المولدة لعدد طرق اختيار 3 من الأعداد المختلفة من بين الأعداد $n, 1, 2, \dots, n$ بحيث لأي عددين y, x منها يكون $|y - x| < 2$. ثم اوجد عدد طرق الأختيار في حالة $n = 30$.

١٤- وضح لماذا $(1 + x + x^2 + \dots + x^r)^3$ ليست الدالة المولدة لعدد المجموعات المضاعفة التي عدد عناصرها r و المأخوذة من المجموعة $\{x_1, x_2, x_3\}$? ما هي الدالة المولدة الصحيحة؟

١٥- وضح لماذا $(1 + x + x^2 + \dots + x^r)^r$ ليست الدالة المولدة لعدد المجموعات المضاعفة التي عدد عناصرها r و المأخوذة من المجموعة $\{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ ؟

١٦- بين أن $\frac{1}{2}(1 - 4x)^{-\frac{1}{2}} = g(x) = (1 - 4x)^{\frac{1}{2}}$ هي الدالة المولدة للمتتالية (a_n) حيث $a_n = \binom{2n}{n}$

١٧- ما هو معامل x^5 في مفکوك $(1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^3 + \dots)(1 + x^5 + \dots)$ ؟

- ١٨ - أوجد معامل x^{12} في مفهوك $(1 + x + x^2 + \dots)^3$.
- ١٩ - أوجد معامل x^5 في مفهوك $(1 + x + x^2 + \dots)^{10}$.
- ٢٠ - أوجد معامل x^{24} في مفهوك $(x^3 + x^4 + \dots + x^{12})^4$.
- ٢١ - أوجد معامل x^6 في مفهوك $(x + x^2 + \dots)^3(1 - x^3)^3$.
- ٢٢ - أوجد معامل x^{10} في مفهوك $(x^3 + x^4 + \dots)^3(x + x^2 + \dots + x^5)(1 - x^5)^3$.
- ٢٣ - أوجد معامل x^{10} في مفهوك $(x^2 + x^3 + \dots)^3(x + x^2 + x^3 + x^4)(1 - x^3)^3$.
- ٢٤ - أوجد معامل x^5 في مفهوك $\frac{(1 - x^2)^{12}}{(1 - x)^3}$.
- ٢٥ - أوجد معامل x^r في مفهوك $(1 + x + x^2 + \dots)^r(1 - x)^r$.
- ٢٦ - أوجد صيغة مختصرة للدالة المولدة للمتتالية (a_n) حيث $a_n = n(n - 1)$.
- ٢٧ - أوجد صيغة مختصرة للدالة المولدة للمتتالية (a_n) حيث $a_n = n^2 3^n$.
- ٢٨ - استخدم الدالة المولدة المطلوبة في التمارين ٢٦ لإيجاد صيغة بسيطة لما يلي:
- $$2 \times 1 + 3 \times 2 + \dots + n(n - 1)$$
- ٢٩ - استخدم الدالة المولدة المطلوبة في التمارين ٢٧ لإيجاد صيغة بسيطة لما يلي:
- $$3 + 2^2 3^2 + \dots + n^2 3^n$$
- ٣٠ - لكل عدد صحيح $n \geq 0$ ، ليكن a_n هو عدد تجزئات n التي أجزاؤها مختلفة و $a_0 = 1$. أثبت أنه يمكن كتابة الدالة المولدة للمتتالية (a_n) على الشكل
- $$g(x) = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k)$$

(٣،٣) الدوال المولدة الأسيية

تُعنى الدوال المولدة الأسيية بعدد التباديل. في هذا البند سنستخدم بعض الخواص الجبرية والتحليلية لمتسلسلات القوى لإيجاد عدد التباديل.

مثال (٣،١٧)

كم عدد الممتاليات المأخوذة من المجموعة $\{A, B\}$ والتي تظهر فيها A مرة واحدة على الأكثر وعدد مرات ظهور B فيها إما 1 أو 2؟

الحل :

A عدد مرات ظهور	B عدد مرات ظهور	العدد
0	1	$\frac{1!}{0!1!}$
0	2	$\frac{2!}{0!2!}$
1	1	$\frac{2!}{1!1!}$
1	2	$\frac{3!}{1!2!}$

و منه فإن العدد المطلوب يساوي

$$\frac{1!}{0!1!} + \frac{2!}{0!2!} + \frac{2!}{1!1!} + \frac{3!}{1!2!} = 1 + 1 + 2 + 3 = 7$$

مثال (٣، ١٨)

$$\left(\frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} \right) \left(\frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} \right) \quad \text{أوجد مفهوك}$$

الحل:

$$g(x) = \left(\frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} \right) \left(\frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} \right) = \frac{x}{0!1!} + \left(\frac{1}{0!2!} + \frac{1}{1!1!} \right) x^2 + \frac{x^3}{1!2!}$$

لاحظ أن معامل x^i في $g(x)$ مضروباً في $i!$ يساوي عدد الممتاليات من الطول i في المثال (٣، ١٧) لكل $i = 1, 2, 3$. يمكن تعليم هذه الملاحظة كما في البرهنة التالية.

مبرهنة (٣، ٧)

ليكن a_r هو عدد تباديل $r = r_1 + r_2 + \dots + r_n$ شيئاً مأخوذاً من n نوعاً من الأشياء بشرط أن عدد العناصر r_i المأخوذة من النوع i يحقق

$$i = 1, 2, \dots, n \quad \text{لكل } r_i = \alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots$$

إن الدالة المولدة الأسيية للممتالية (a_r) هي

$$g(x) = \left(\frac{x^{\alpha_{1,1}}}{\alpha_{1,1}!} + \frac{x^{\alpha_{1,2}}}{\alpha_{1,2}!} + \dots \right) \left(\frac{x^{\alpha_{2,1}}}{\alpha_{2,1}!} + \frac{x^{\alpha_{2,2}}}{\alpha_{2,2}!} + \dots \right) \cdots \left(\frac{x^{\alpha_{n,1}}}{\alpha_{n,1}!} + \frac{x^{\alpha_{n,2}}}{\alpha_{n,2}!} + \dots \right)$$

البرهان

إن حدا نمطيا في مفكوك $(x)g$ قبل التبسيط و تجميع الحدود المتشابهة يكون على الشكل المرتب

$$\frac{x^{\alpha_1}}{\alpha_1!} \cdot \frac{x^{\alpha_2}}{\alpha_2!} \cdots \cdot \frac{x^{\alpha_n}}{\alpha_n!}$$

حيث الحد $\frac{x^{\alpha_{i,1}}}{\alpha_{i,1}!} + \frac{x^{\alpha_{i,2}}}{\alpha_{i,2}!} + \cdots$ مأخوذ من العامل (\cdots) لكل $i = 1, 2, \dots, n$. و بعد

التبسيط يكون الحد النمطي على الشكل $\frac{1}{\alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!} x^{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}$ و للحصول على

$$\frac{1}{\alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!} x^r \quad \text{لا بد أن يكون } \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = r \text{ و وبالتالي فإن معامل}$$

$\frac{x^r}{r!}$ في مفكوك $(x)g$ يساوي $\sum \frac{r!}{\alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!}$ حيث المجموع مأخوذ على جميع

العديدات $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ من النوع n التي تتحقق $r = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$ و تتحقق $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ لـ $\alpha_i \in \{\alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots\}$ و كما نعلم من البرهنة (٦، ١) فإن عدد تباديل n شيئاً مأخوذنا من n نوعاً من الأشياء بشرط أن عدد

الأشياء المأخوذة من النوع i يساوي α_i هو $\frac{r!}{\alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!}$. إذا معامل $\frac{x^r}{r!}$ في

مفكوك $(x)g$ يساوي a_r . و وبالتالي فإن $(x)g$ هي الدالة المولدة الأسيّة
للمتتالية (a_r) .

مثال (٣،١٩)

كم عدد طرق ترتيب 7 حروف مأخوذة من المجموعة $\{A, B, C\}$ إذا كان عدد مرات ظهور A هو 2 أو 3 أو 6 وعدد مرات ظهور B هو 1 أو 5 وعدد مرات ظهور C هو 0 أو 3 أو 7.

الحل: من البرهنة (٣،٧)، العدد المطلوب يساوي $7!$ مضروبا في معامل x^7 في مفوكوك الدالة

$$g(x) = \left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} \right) \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^5}{5!} \right) \left(1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^7}{7!} \right)$$

$$\text{معامل } x^7 \text{ في } g(x) \text{ يساوي } \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!1!3!} + \frac{1}{6!1!} \\ \frac{7!}{2!5!} + \frac{7!}{3!1!3!} + \frac{7!}{6!1!} = 168$$

مثال (٣،٢٠)

أوجد الدالة المولدة الأسيّة لعدد التباديل من الطول r المأخوذة من مجموعة عدد عناصرها n .

الحل: عدد التباديل من الطول r المأخوذة من مجموعة عدد عناصرها n يساوي $(n)^r$ و منه فإن الدالة المولدة الأسيّة المطلوبة هي

$$g(x) = \frac{(n)_0}{0!} + \frac{(n)_1}{1!} x + \frac{(n)_2}{2!} x^2 + \cdots + \frac{(n)_n}{n!} x^n$$

$$= \binom{n}{0} + \binom{n}{1} x + \cdots + \binom{n}{n} x^n = (1+x)^n$$

يتضح من المثالين (٥، ٣) و (٢٠، ٣) أن $(1+x)^n$ هي الدالة المولدة العادية لعدد التوافيق من الطول r المأخوذة من مجموعة عدد عناصرها n وأنها نفسها هي الدالة المولدة الأسيّة لعدد التباديل من الطول r المأخوذة من مجموعة عدد عناصرها n .

إن استخراج a_r من الدالة المولدة الأسيّة يتطلب أحياناً إيجاد مفكوك عبارات تحتوي على دوال أسيّة. ونقدم في البرهنة التالية بعض العلاقات المقيدة في هذا المجال.

برهنة (٨، ٣)

$$(e^x)^n = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n^k x^k}{k!} = e^{nx} \quad (أ)$$

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} \quad (ب)$$

$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad (ج)$$

البرهان: يمكن للقارئ إثبات المطلوب بسهولة. وفيما يلي نقدم برهاناً جبراً وآخر تركيبياً للفقرة (أ).

(١) البرهان الجبري:

$$\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots\right)^n = (e^x)^n = e^{nx} = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n^2 x^2}{2!} + \dots + \frac{n^k x^k}{k!} + \dots$$

(٢) البرهان التركيبي: ليكن a_k هو عدد الممتاليات من الطول k المأخوذة من مجموعة عناصرها n ، ولتكن $g(x)$ هي الدالة المولدة الأسيية للممتالية (a_k) . نجد $g(x)$ بطريقتين مختلفتين. ينتج من البرهنة (٣، ٧) أن

$$g(x) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots\right)^n$$

و من ناحية أخرى، نعلم من البند (١، ٣) أن $a_k = n^k$. إذا

$$g(x) = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n^2 x^2}{2!} + \dots + \frac{n^k x^k}{k!} + \dots$$

و بالتالي فإن

$$\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots\right)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n^2 x^2}{2!} + \dots$$

مثال (٢١، ٣)

كم عدد الممتاليات الثنائية من الطول r والتي تحوي عدداً فردياً من الأصفار؟

الحل: الدالة المولدة الأسيية لعدد الممتاليات المطلوب هي

$$g(x) = \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots \right)$$

$$= \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right] e^x = \frac{e^{2x} - 1}{2} = \frac{e^{2x}}{2} - \frac{1}{2}$$

و منه معامل x^r في $g(x)$ يساوي $\frac{2^{r-1}}{r!}$. و من البرهنة (٣، ٧)، العدد المطلوب يساوي 2^{r-1} .

مثال (٢٢، ٣)

كم عدد المتراليات من الطول r المأخوذة من المجموعة $\{1, 2, 3, 4\}$ و التي يظهر فيها كل من ١, ٢, ٤ مرة واحدة على الأقل؟

الحل: الدالة المولدة الأسية للعدد المطلوب هي

$$\begin{aligned} g(x) &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots \right) \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots \right)^3 = e^x (e^x - 1)^3 \\ &= e^x [e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1] = e^{4x} - 3e^{3x} + 3e^{2x} - e^x \end{aligned}$$

و عليه فإن معامل x^r في مفکوك $(e^x - 1)^3$ يساوي $g(x)$. و من البرهنة (٣، ٧)، العدد المطلوب يساوي $4^r - 3^{r+1} + 3 \cdot 2^r - 1$.

وفي ختام هذا الفصل نشير إلى أن الدوال المولدة تؤدي دوراً مهماً في معالجة موضوع العلاقات الإرتدادية و سنرى ذلك بشيء من التفصيل في فصل قادم.

تمارين (٢، ٣)

- ١- كم عدد طرق ترتيب ٤ من حروف كلمة ENGINE؟
- ٢- أوجد الدالة المولدة الأسيّة لعدد الكلمات من الطول r والأ孝ونـة حروفها من الأبجدية $\{a, b, c, d\}$.
- ٣- أوجد الدالة المولدة الأسيّة للممتاليـة $(r!)$.
- ٤- أوجد الدالة المولدة الأسيّة للممتاليـة (r^r) .
- ٥- أوجد الدالة المولدة الأسيّة لعدد طرق توزيع r شخصاً على n غرفة مختلفة بحيث لا يقل عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة عن أثنين ولا يزيد عن خمسة.
- ٦- أوجد الدالة المولدة الأسيّة لعدد الكلمات من الطول $0 \leq r \leq n$ والأ孝ونـة حروفها من الكلمات التالية:
 - (أ) MISSISSIPPI
 - (ب) HAWAII
 - (ج) ISOMORPHISM
- ٧- أوجد حـن الفقرة (أ) من التمارين ٦ عندما تظهر I في الكلمة مرتين على الأقل.

-٨- إذا كانت $(g(x))$ هي الدالة المولدة الأُسيّة للمتتالية (a_n) و $(h(x))$ هي الدالة المولدة الأُسيّة للمتتالية (b_n) فأثبت أن $(g(x)h(x))$ هي الدالة المولدة الأُسيّة للمتتالية (c_n) حيث $c_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$. تسمى c_n التفاف ذات الحدين للمتتاليتين (a_n) و (b_n) (binomial convolution).

العلاقات الارتدادية

RECURRANCE RELATIONS

في كثير من مسائل العد، تؤدي دراسة المسألة وتحليلها إلى كتابة الحل على شكل متتالية a_0, a_1, a_2, \dots . أحياناً، نكتفي بوصف حدود المتتالية لتعذر إيجاد أي علاقات بين تلك الحدود. فمثلاً، متتالية الأعداد الأولية $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ لا يعرف لحدتها العام أي صيغة جبرية صريحة كما لا تعرف أي علاقة بين حدود المتتالية. وأحياناً أخرى، يمكن التعبير بسهولة عن الحد العام بصيغة جبرية صريحة كما في حالة المتتاليات الهندسية والمتتاليات الحسابية. وفي بعض المسائل، يمكن حساب الحد العام a_n ارتدادياً، أي، يمكن كتابة معادلة تعطينا a_n بدلالة بعض الحدود a_r حيث $n > r$. تسمى المعادلة علاقة ارتدادية، و إذا أمكن التعبير عن a_n بصيغة جبرية صريحة فإنه يقال إن العلاقة الارتدادية قد حلّت. ولبعض الأغراض تكون الصيغة الجبرية الصريحة للحد العام a_n مفيدة، ولكن العلاقة الارتدادية تكون أكثر فائدة لأغراض أخرى مثل حساب a_n لقيمة معطاة لـ n .

في هذا الفصل، نقدم أصنافاً من العلاقات الارتدادية التي توجد طرائق حلّها، كما نعالج بعض المسائل التي يمكن بناء علاقات ارتدادية لها. وسيلاحظ

القارئ أن المقاربة المتّبعة في دراسة العلاقات الارتدادية تُذكَرُ بطريقة معالجة المعادلات التفاضلية العاديَّة.

(٤،١) مقدمة

لتكن a_0, a_1, a_2, \dots متتالية. كل صيغة تُعبِّر عن الحد العام a_n بدلالة واحد أو أكثر من الحدود السابقة له $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ ، لكل $n \geq k$ حيث k عدد صحيح موجب و ثابت، تسمى علاقَة ارتِداريَّة للممتاليَّة $\dots, a_0, a_1, a_2, \dots$ ؛ كل حد من الحدود a_0, a_1, \dots, a_{k-1} لا يحقق العلاقة الارتداديَّة تسمى قيم هذه الحدود بالشروط الابتدائيَّة للممتاليَّة. تسمى متتالية ما حلاً لعلاقَة ارتِداريَّة معطاة إذا كانت حدود الممتاليَّة تحقق العلاقة الارتداديَّة.

يقال عن علاقَة ارتِداريَّة إنها خطية من الرتبة k إذا كان يمكن كتابتها على الصورة $u_n = g(n)$ حيث $u_n = f_1(n)u_{n-1} + f_2(n)u_{n-2} + \dots + f_k(n)u_{n-k}$ دوال معرفة لكل n و f_k ليست دالة صفرية. إذا كانت g دالة صفرية فإن العلاقة تسمى متجانسة، ويقال إن العلاقة غير متجانسة عندما تكون g ليست دالة صفرية. كما يقال إن العلاقة ذات معاملات ثابتة عندما تكون f_1, f_2, \dots, f_k دوال ثابتة.

تبين البرهنة التالية أن حل العلاقة الارتداديَّة الخطية يكون وحيداً عندما تعطى الشروط الابتدائيَّة.

مبرهنة (٤، ١)

يوجد حلٌّ وحيدٌ للعلاقة الارتدادية الخطية

$$u_n + f_1(n)u_{n-1} + f_2(n)u_{n-2} + \dots + f_k(n)u_{n-k} = g(n)$$

بحيث a_0, a_1, \dots, a_{k-1} ثوابتٌ معطاة.

البرهان: نستخدم الاستقراء الرياضي على n لإثبات أن u_n مُعینٌ بشكلٍ وحيدٍ لكل عددٍ صحيحٍ $n \geq 0$. ينبع من الشروط الابتدائية أنَّ كلاً من u_0, u_1, \dots, u_{k-1} مُعینٌ بشكلٍ وحيدٍ. نفرض أن $n \geq k-1$ وأن u_0, u_1, \dots, u_{n-k} مُعینةٌ بشكلٍ وحيدٍ. بما أن $n+1 \geq k$ فإنَّ العلاقة الارتدادية تعطي

$$u_{n+1} = -f_1(n+1)u_n - f_2(n+1)u_{n-1} - \dots - f_k(n+1)u_{n+1-k} + g(n+1)$$

و بال التالي ينبع من فرضية الاستقراء أن u_{n+1} مُعینٌ بشكلٍ وحيدٍ ■

يساعد المبدأ التالي على إيجاد حلول للعلاقات الارتدادية الخطية.

مبرهنة (٤، ٢) (مبدأ التراكب) (Superposition principle)

إذا كان $u_n^{(1)}$ حلًّاً للعلاقة الخطية

$$u_n + f_1(n)u_{n-1} + f_2(n)u_{n-2} + \dots + f_k(n)u_{n-k} = g_1(n)$$

و كان $u_n^{(2)}$ حلًّاً للعلاقة الخطية

$$u_n + f_1(n)u_{n-1} + f_2(n)u_{n-2} + \dots + f_k(n)u_{n-k} = g_2(n)$$

فإنَّ $c_1u_n^{(1)} + c_2u_n^{(2)}$ يكون حلًّاً للعلاقة الخطية

$$u_n + f_1(n)u_{n-1} + f_2(n)u_{n-2} + \dots + f_k(n)u_{n-k} = c_1g_1(n) + c_2g_2(n)$$

حيث c_1 و c_2 ثابتان.

البرهان:

$$\begin{aligned} & [c_1 u_n^{(1)} + c_2 u_n^{(2)}] + f_1(n)[c_1 u_{n-1}^{(1)} + c_2 u_{n-1}^{(2)}] + f_2(n)[c_1 u_{n-2}^{(1)} + c_2 u_{n-2}^{(2)}] + \dots + \\ & f_k(n)[c_1 u_{n-k}^{(1)} + c_2 u_{n-k}^{(2)}] = c_1[u_n^{(1)} + f_1(n)u_{n-1}^{(1)} + f_2(n)u_{n-2}^{(1)} + \dots + f_k(n)u_{n-k}^{(1)}] + \\ & c_2[u_n^{(2)} + f_1(n)u_{n-1}^{(2)} + f_2(n)u_{n-2}^{(2)} + \dots + f_k(n)u_{n-k}^{(2)}] = c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n) \end{aligned}$$

(٤، ٢) العلاقات الارتدادية الخطية المتتجانسة

في هذا البند نركز اهتمامنا على البحث عن حلول العلاقة الارتدادية الخطية المتتجانسة ذات المعاملات الثابتة. لتكن $u_n + d_1 u_{n-1} + d_2 u_{n-2} + \dots + d_k u_{n-k} = 0$ علاقة ارتدادية حيث d_1, d_2, \dots, d_k ثوابت. واضح أن $u_n = 0$ حل لهذه العلاقة، و يسمى الحل التافه أو الحل الصفرى. إذا كان $u_n = \alpha^n$ حلًا غير تافه للعلاقة فإن $\alpha \neq 0$ تحقق $\alpha^n + d_1 \alpha^{n-1} + d_2 \alpha^{n-2} + \dots + d_k \alpha^{n-k} = 0$ ، وبالتالي فإن $\alpha^k + d_1 \alpha^{k-1} + d_2 \alpha^{k-2} + \dots + d_k = 0$ لتكن $u_n + d_1 u_{n-1} + d_2 u_{n-2} + \dots + d_k u_{n-k} = 0$ علاقة ارتدادية ذات معاملات ثابتة. تسمى $P(x) = x^k + d_1 x^{k-1} + \dots + d_k$ كثيرة الحدود المميزة و تسمى $P(x) = 0$ المعادلة المميزة أو المعادلة المساعدة للعلاقة الارتدادية، و تسمى جذورها الجذور المميزة للعلاقة الارتدادية.

و في الحالة التي تكون فيها الجذور المميزة مختلفة، فإنه يمكن كتابة حلول العلاقة الارتدادية بصورة بسيطة نسبياً، أما في الحالة الأخرى فإنه يمكن الوصول إلى الحلول ولكن الأمر ليس بالبساطة نفسها.

مبرهنة (٤، ٣)

لتكن $0 = u_n + d_1 u_{n-1} + d_2 u_{n-2} + \dots + d_k u_{n-k}$ علاقة ارتدادية خطية ذات معاملات ثابتة، و جذورها المميزة $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ مختلفة. عندئذ ، لكل مجموعة من الثوابت c_1, c_2, \dots, c_k يكون

$$u_n = c_1 \alpha_1^n + c_2 \alpha_2^n + \dots + c_k \alpha_k^n \quad \dots \dots \dots (*)$$

حلاً للعلاقة الارتدادية. و لكل حل للعلاقة الارتدادية ، توجد ثوابت c_1, c_2, \dots, c_k بحيث يمكى كتابة الحل على الشكل (*). تسمى العبارة المعطاة في (*) بالحل العام للعلاقة الارتدادية.

البرهان: بما أن كلاً من $u_n^{(1)} = \alpha_1^n, \dots, u_n^{(k)} = \alpha_k^n$ حل للعلاقة الارتدادية، فإنه ينتج من مبدأ التراكب أن العبارة المعطاة في (*) حل للعلاقة الارتدادية. الآن نفرض أن $u_n = b_n$ حل للعلاقة الارتدادية، و نبحث عن ثوابت c_1, c_2, \dots, c_k بحيث يكون $u_n = c_1 \alpha_1^n + c_2 \alpha_2^n + \dots + c_k \alpha_k^n$ حلاً يحقق الشروط الابتدائية $c_1 + c_2 + \dots + c_k = b_0$. باستخدام الشروط الابتدائية نجد أن

$$c_1 + c_2 + \dots + c_k = b_0$$

$$\alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2 + \dots + \alpha_k c_k = b_1$$

$$\alpha_1^2 c_1 + \alpha_2^2 c_2 + \dots + \alpha_k^2 c_k = b_2$$

$$\alpha_1^{k-1} c_1 + \alpha_2^{k-1} c_2 + \dots + \alpha_k^{k-1} c_k = b_{k-1}$$

و إذا كانت A هي مصفوفة العاملات لهذا النظام من المعادلات الخطية، فإن محدد

A يكون

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_k \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_k^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{k-1} & \alpha_2^{k-1} & & \alpha_k^{k-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq k} (\alpha_j - \alpha_i)$$

لأنه على شكل محدد فاندرموند. وبما أن $\alpha_i \neq \alpha_j$ لكل $i \neq j$ ، فإن

إذاً، يوجد لنظام المعادلات الخطية حلٌّ وحيد. وبالتالي، فإنه يوجد للعلاقة الارتدادية حلٌّ على الشكل (*) بحيث $b_{k-1} = b_0, \dots, b_1 = u_0$. ولكن هذا الحل وحيد حسب المبرهنة (٤)، فإذاً يكون هذا الحل هو $u_n = b_n$.

مثال (٤، ١)

أُوجد صيغة جبرية صريحة للحد العام للمتتالية فيبوناتشي التي تحقق

$$a_0 = a_1 = 1, n \geq 2, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

الحل: المعادلة المميزة $x^2 - x - 1 = 0$ لها الجذران $\alpha_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ و $\alpha_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

$a_0 = a_1 = 1$. $a_n = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$ إذا، الحل العام هو
أن

$$c_1 + c_2 = 1$$

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) c_1 + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) c_2 = 1$$

و بحل نظام المعادلات نجد أن $c_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ و $c_2 = -\frac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ وبالتالي ، نجد أن

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$$

العلاقة الارتدادية لحساب a_n أبسط من استخدام الصيغة الصريحة للغرض نفسه.

مثال (٤، ٢)

أوجد حل المسألة التالية: $a_0 = 2$, $a_1 = 5$ حيث $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$, $n \geq 2$

الحل:

المعادلة المميزة $x^2 - 5x + 6 = 0$ لها الجذران المختلفان $\alpha_1 = 3$ و $\alpha_2 = 2$. إذا،

يمكن كتابة الحل العام على الشكل $a_n = c_1 2^n + c_2 3^n$. و ينتج من أن

$$c_1 + c_2 = 2$$

$$2c_1 + 3c_2 = 5$$

. $a_n = 2^n + 3^n$. $c_1 = c_2 = 1$ بحل نظام المعادلات نجد أن

الآن، نبدأ العمل على الحالة التي لا تكون فيها الجذور مختلفة.

مبرهنة (٤، ٤)

لتكن $u_n + c_1 u_{n-1} + \dots + c_k u_{n-k} = 0$ علاقة ارتقائية ذات معاملات ثابتة و من الرتبة k . إذا كان α جذرا مميزا تكراره $r = \mu(\alpha)$ ، فإن $u_n = n^m \alpha^n$ يكون حل للعلاقة الارتقائية لكل عدد صحيح $0 \leq m < r$.

البرهان:

نضع $c_0 = 1$ في الطرف الأيسر للعلاقة الارتقائية، فنجد أن:

$$\begin{aligned} c_0 u_n + c_1 u_{n-1} + c_2 u_{n-2} + \dots + c_k u_{n-k} &= \\ c_0 n^m \alpha^n + c_1 (n-1)^m \alpha^{n-1} + \dots + c_k (n-k)^m \alpha^{n-k} &= \\ \alpha^{n-k} \sum_{j=0}^k c_j (n-j)^m \alpha^{k-j} &= \\ \alpha^{n-k} \sum_{j=0}^k c_j [(n-k) + (k-j)]^m \alpha^{k-j} &= \\ \alpha^{n-k} \sum_{j=0}^k c_j \alpha^{k-j} \left[\sum_{i=0}^m \binom{m}{i} (n-k)^{m-i} (k-j)^i \right] &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha^{n-k} (n-k)^m \sum_{j=0}^k c_j \alpha^{k-j} & \left[\sum_{i=0}^m \binom{m}{i} (n-k)^{-i} (k-j)^i \right] = \\ \alpha^{n-k} (n-k)^m \sum_{i=0}^m & \binom{m}{i} (n-k)^{-i} \left[\sum_{j=0}^k c_j (k-j)^i \alpha^{k-j} \right] = \\ \alpha^{n-k} (n-k)^m \sum_{i=0}^m & \binom{m}{i} (n-k)^{-i} P_i(\alpha) \end{aligned}$$

حيث $P_i(x) = \sum_{j=0}^k c_j (k-j)^i x^{k-j}$. نلاحظ أن

$P_o(x) = \sum_{j=0}^k c_j x^{k-j}$ هي كثيرة الحدود المميزة للعلاقة الارتدادية. ولكي يتم البرهان،

يكفي إثبات أن $P_i(\alpha) = 0$ لكل $0 \leq i \leq m$. لهذا الغرض يمكن التحقق بسهولة أن

$$P_{i+1}(x) = x \frac{d}{dx} [P_i(x)], \quad 0 \leq i \leq m \quad \dots \quad (*)$$

وبما أن α جذر مميز تكراره r ، فإنه توجد كثيرة حدود $T_0(x)$ بحيث

$$T_1(x) = (x - \alpha)^r T_0(x) \quad \text{نجد أنه يوجد } T_0(\alpha) \neq 0 \quad \text{و} \quad P_0(x) = (x - \alpha)^r T_0(x)$$

$$. \quad T_1(\alpha) \neq 0 \quad \text{و} \quad P_1(x) = (x - \alpha)^{r-1} T_1(x) \quad \text{بحيث}$$

و هكذا ، بالاستخدام المتكرر للعلاقة (*) نجد أنه لكل $0 \leq i \leq m$ توجد كثيرة حدود

$$P_i(\alpha) = 0 \quad \text{و} \quad T_i(x) = (x - \alpha)^{r-i} T_0(x) \quad \text{و} \quad \text{بالتالي فإن} \quad T_i(\alpha) = 0 \quad \text{بحيث} \quad T_i(x)$$

لكل $0 \leq i \leq m$ ■

لقد وصلنا الآن إلى وضع مناسب لتقديم البرهنة التي تعطينا الحل العام
للعلاقة الارتدادية عندما تكون الجذور المميزة في الحالة العامة.

مبرهنة(٤،٥)

لتكن $0 = u_n + c_1 u_{n-1} + \dots + c_k u_{n-k}$ علاقة ارتقائية خطية ذات معاملات ثابتة و $\mu(\alpha_i) = r_i$ من الرتبة k ، وجذورها المميزة المختلفة $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ لها التكرارات r_1, r_2, \dots, r_s لكل $s \leq i \leq 0$. عندئذٍ، لكل مجموعة من الثوابت

$c_{1,1}, c_{1,2}, \dots, c_{1,r_1}, \dots, c_{s,1}, c_{s,2}, \dots, c_{s,r_s}$ يكون

$$u_n = \sum_{i=1}^s (c_{i,1} + c_{i,2}n + c_{i,3}n^2 + \dots + c_{i,r_i}n^{r_i-1})\alpha_i^n \quad (*)$$

حلاً للعلاقة الارتقائية. وكل حل للعلاقة الارتقائية، توجد ثوابت $c_{1,1}, c_{1,2}, \dots, c_{1,r_1}, \dots, c_{s,1}, c_{s,2}, \dots, c_{s,r_s}$ بحيث يمكن كتابة الحل على الشكل (*). و تسمى العبارة المعطاة في (*) بالحل العام للعلاقة الارتقائية.

البرهان:

يخرج من المبرهنة(٤،٤) و مبدأ التراكب أن العبارة المعطاة في (*) حل للعلاقة الارتقائية.

الآن، نفرض أن $u_n = b_n$ حل للعلاقة الارتقائية و نبحث عن ثوابت

$c_{1,1}, c_{1,2}, \dots, c_{1,r_1}, \dots, c_{s,1}, c_{s,2}, \dots, c_{s,r_s}$ بحيث يكون

$$u_n = \sum_{i=1}^s (c_{i,1} + c_{i,2}n + c_{i,3}n^2 + \dots + c_{i,r_i}n^{r_i-1})\alpha_i^n \quad \text{حلاً يحقق الشروط الابتدائية}$$

باستخدام الشروط الابتدائية نجد أن $u_0 = b_0, \dots, u_{k-1} = b_{k-1}$

$$\sum_{i=1}^s c_{i,1} = b_0$$

$$\sum_{i=1}^s (c_{i,1} + c_{i,2} + \dots + c_{i,r_i}) \alpha_i = b_1$$

$$\sum_{i=1}^s (c_{i,1} + c_{i,2} 2 + \dots + c_{i,r_i} 2^{r_i-1}) \alpha_i^2 = b_2$$

.....

$$\sum_{i=1}^s [c_{i,1} + c_{i,2} (k-1) + \dots + c_{i,r_i} (k-1)^{r_i-1}] \alpha_i^{k-1} = b_{k-1}$$

و إذا كانت A هي مصفوفة المعاملات لهذا النظام من المعادلات الخطية، فإن

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \alpha_1 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s \\ \alpha_1^2 & 2\alpha_1^2 & \cdots & 2^{r_1-1}\alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \cdots & 2^{r_s-1}\alpha_s^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1^{k-1} & (k-1)\alpha_1^{k-1} & \cdots & (k-1)^{r_1-1}\alpha_1^{k-1} & \alpha_2^{k-1} & \cdots & (k-1)^{r_s-1}\alpha_s^{k-1} \end{bmatrix}$$

و كما في إثبات المبرهنة (٣، ٤) يكفي إثبات أن $\det(A) \neq 0$. وهذا يكافئ إثبات أن صفوف A تكون مجموعة متجهات مستقلة خطياً. وبهدف الحصول على تناقض، نفرض أن صفوف A تكون مجموعة متجهات مرتبطة خطياً. لكل $0 \leq i \leq k-1$ ضع

$$V_i = (\alpha_1^i, i\alpha_1^i, \dots, i^{r_1-1}\alpha_1^i, \dots, \alpha_s^i, i\alpha_s^i, \dots, i^{r_s-1}\alpha_s^i)$$

و بما أن $\{V_0, V_1, \dots, V_{k-1}\}$ مجموعة متجهات مرتبطة خطياً، فإنه توجد ثوابت

d_0, d_1, \dots, d_{k-1} ليبت جميعها أصفاراً بحيث $d_0 V_0 + d_1 V_1 + \dots + d_{k-1} V_{k-1} = 0$

وللاختصار ضع $Q(x) = \sum_{i=0}^{k-1} d_i x_i$. ليكن $V = d_0 V_0 + d_1 V_1 + \dots + d_{k-1} V_{k-1}$

و ليكن D مؤثراً بحيث $Df(x) = x \frac{d}{dx}[f(x)]$ ، $D^i f(x) = D[D^{i-1} f(x)]$ ، $i \geq 2$

نلاحظ أن

$$\begin{aligned}
 V &= \sum_{i=0}^{k-1} d_i V_i \\
 V &= \sum_{i=0}^{k-1} d_i (\alpha_1^i, i\alpha_1^i, \dots, i^{r_1-1}\alpha_1^i, \dots, \alpha_s^i, i\alpha_s^i, \dots, i^{r_s-1}\alpha_s^i) \\
 &= \left(\sum_{i=0}^{k-1} d_i \alpha_1^i, \sum_{i=0}^{k-1} d_i i\alpha_1^i, \dots, \sum_{i=0}^{k-1} d_i i^{r_1-1}\alpha_1^i, \dots, \sum_{i=0}^{k-1} d_i i^{r_s-1}\alpha_s^i \right) \\
 &= (Q(\alpha_1), DQ(\alpha_1), \dots, D^{r_1-1}Q(\alpha_1), \dots, D^{r_s-1}Q(\alpha_s))
 \end{aligned}$$

ومن $V = 0$ ينتج أن

$$Q(\alpha_1) = DQ(\alpha_1) = \dots = D^{r_1-1}Q(\alpha_1) = \dots = D^{r_s-1}Q(\alpha_s) = 0$$

إذاً لكل $1 \leq i \leq s$ فإن α_i جذر لكثيرة الحدود $Q(x)$ تكراره r_i على الأقل.

و بالتالي، درجة $Q(x)$ أكبر من أو تساوي $r_1 + r_2 + \dots + r_s = k$. وهذا يناقض أن

درجة $Q(x)$ أصغر من أو تساوي $k - 1$.

مثال (٤،٣)

أوجد حل المسألة التالية :

$$u_n - 7u_{n-1} + 16u_{n-2} - 12u_{n-3} = 0$$

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 2, \quad u_2 = 0$$

الحل :

المعادلة المميزة هي $x^3 - 7x^2 + 16x - 12 = 0$ وبالتحليل نجد أن

$(x-2)^2(x-3) = 0$. إذاً 2 جذر ممierz تكراره 2 و 3 جذر ممierz بسيط (تكراره 1).

وبالتالي فإن الحل العام هو $u_n = c_1 2^n + c_2 n 2^n + c_3 3^n$. باستخدام الشروط الابتدائية نحصل على

$$c_1 + c_3 = 1$$

$$2c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 2$$

$$4c_1 + 8c_2 + 9c_3 = 0$$

و بحل نظام المعادلات نجد أن $c_1 = 5$, $c_2 = 2$, $c_3 = -4$. إذًا، $u_n = 5(2^n) + n2^{n+1} - 4(3^n)$ هو الحل المطلوب.

(٤،٣) العلاقات الارتدادية غير المتجانسة

يتضح من البرهنة التالية أن حل العلاقات الارتدادية غير المتجانسة وثيق الصلة بحل المعادلات الارتدادية المتجانسة.

برهنة (٤،٦)

لتكن

$$u_n + c_1 u_{n-1} + \cdots + c_k u_{n-k} = f(n) \dots (*)$$

علاقة ارتدادية ذات معاملات ثابتة و من الرتبة k . ليكن

$$u_n^{(h)} = \sum_{i=1}^s (c_{i,1} + \cdots + c_{i,r} n^{r-1}) \alpha_i^n$$

الحل العام لـ $u_n = u_n^{(p)} + c_1 u_{n-1} + \cdots + c_k u_{n-k} = 0$. عندئذ، إذا كان $u_n = u_n^{(h)} + u_n^{(p)}$ أي حل خاص لـ $(*)$ ، فإن $u_n = u_n^{(h)} + u_n^{(p)}$ حل لـ $(*)$. وإذا كان $a_n = u_n^{(h)} + u_n^{(p)}$ أي حل لـ $(*)$ ، فإنه يوجد ثوابت $c_{1,1}, \dots, c_{s,r_s}$ بحيث يمكن كتابة a_n على الشكل $a_n = u_n^{(h)} + u_n^{(p)}$ حلاً عاماً لـ $(*)$.

البرهان:

ينتج من مبدأ التراكب أن $u_n = u_n^{(h)} + u_n^{(p)}$ حل للعلاقة الارتدادية $(*)$.
الآن، نفرض أن $u_n = a_n$ حل لـ $(*)$ ونبحث عن ثوابت $c_{1,1}, \dots, c_{s,r_s}$ بحيث يكون $u_n = a_n - u_n^{(p)}$ حل للعلاقة الارتدادية $u_n + c_1 u_{n-1} + \cdots + c_k u_{n-k} = 0$ $(**)$
بالتعويض في الطرف الأيسر لـ $(**)$ نجد أن

$$\begin{aligned} u_n + c_1 u_{n-1} + \cdots + c_k u_{n-k} &= \\ a_n - u_n^{(p)} + c_1(a_{n-1} - u_{n-1}^{(p)}) + \cdots + c_k(a_{n-k} - u_{n-k}^{(p)}) &= \\ a_n + c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} - (u_n^{(p)} + u_{n-1}^{(p)} + \cdots + u_{n-k}^{(p)}) &= \end{aligned}$$

$$f(n) - f(n) = 0$$

إذاً، $u_n = a_n - u_n^{(p)}$ حل لـ $(**)$. وبال التالي، توجد ثوابت $c_{1,1}, \dots, c_{s,r_s}$ بحيث يكون

$$\begin{aligned} u_n = a_n - u_n^{(p)} &= \sum_{i=1}^s (c_{i,1} + \cdots + c_{i,r_i} n^{r_i-1}) \alpha_i^n \\ a_n &= \sum_{i=1}^s (c_{i,1} + \cdots + c_{i,r_i} n^{r_i-1}) \alpha_i^n \text{ كما هو مطلوب.} \end{aligned}$$

يعتمد إيجاد حل خاص للعلاقة الارتدادية

$$u_n + c_1 u_{n-1} + \cdots + c_k u_{n-k} = f(n) \dots \dots \dots \quad (1)$$

على $f(n)$ ؛ ولذلك لا توجد طريقة عامة تعطينا حلولاً خاصة في جميع الأحوال. سنكتفي بإعطاء إرشادات للبحث عن حلول خاصة لـ (1) عندما تكون $f(n)$ في شكل معين، وسنتبع ذلك ببعض الأمثلة التي توضح تلك الإرشادات.

(أ) إذا كانت $f(n) = b_0 + b_1 n + \cdots + b_t n^t$ حيث b_0, b_1, \dots, b_t ثوابت و كان العدد

1 ليس جذراً ممياً للجزء المتتجانس من (1) فيمكن البحث عن حل خاص لـ (1) على

الشكل $e_n^{(p)} = e_0 + e_1 n + \cdots + e_t n^t$ حيث e_0, e_1, \dots, e_t ثوابت.

(ب) إذا كانت $f(n) = b_0 + b_1 n + \cdots + b_t n^t$ حيث b_0, b_1, \dots, b_t ثوابت و كان

العدد 1 جذراً ممياً للجزء المتتجانس من (1) تكراره r فيمكن البحث عن حل خاص

لـ (1) على الشكل $u_n^{(p)} = n^r (e_0 + e_1 n + \cdots + e_t n^t)$ حيث e_0, e_1, \dots, e_t ثوابت.

(ج) إذا كانت $f(n) = \beta^n$ حيث $\beta \neq 1$ و كان العدد β ليس جذراً ممياً للجزء

المتتجانس من (1) فيمكن البحث عن حل خاص لـ (1) على الشكل $u_n^{(p)} = e_0 \beta^n$

حيث e_0 ثابت.

(د) إذا كانت $f(n) = \beta^n$ حيث $1 \neq \beta$ و كان العدد β جذراً ممياً للجزء المتتجانس

من (1) تكراره r فيمكن البحث عن حل خاص لـ (1) على الشكل $u_n^{(p)} = e_0 n^r \beta^n$

حيث e_0 ثابت.

يمكن استخدام مبدأ التراكب للبحث عن حل خاص لـ (1) عندما تكون

على الشكل $f(n) = d_1 f_1(n) + \cdots + d_i f_i(n)$ حيث d_1, d_2, \dots, d_i ثوابت

وكل $f_i(n)$ من على شكل $f(n)$ في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعلاه. الأمثلة التالية توضح تلك الحالات المختلفة.

مثال (٤، ٤)

أوجد حل المسألة التالية :

$$a_n + 3a_{n-1} = 4n^2 - 2n$$

$$a_0 = -4$$

الحل

نجد بسهولة أن $a_n^{(h)} = c(-3)^n$ حيث c ثابت اختياري. وبما أن 1 ليس جذراً ممبيزاً، فإنه يمكن الفرض أن $a_n^{(p)} = c_0 + c_1n + c_2n^2$ حل خاص. وبالتعويض نحصل على

$$(c_0 + c_1n + c_2n^2) + 3[c_0 + c_1(n-1) + c_2(n-1)^2] = 4n^2 - 2n$$

و مقارنة المعاملات في الطرفين تعطينا نظام المعادلات الخطية التالي :

$$4c_0 - 3c_1 + 3c_2 = 0$$

$$4c_1 - 6c_2 = -2$$

$$4c_2 = 4$$

. $c_0 = 0, c_1 = 1, c_2 = 1$. وبحل هذا النظام نجد أن

$a_n = c(-3)^n + n + n^2$. وبالناتي فإن $a_n^{(p)} = n + n^2$ إذاً

الآن، نستخدم الشرط الابتدائي $a_0 = -4$ فنجد أن $c = -4$. إذًا،
 $a_n = -4(-3)^n + n + n^2$ هو الحل المطلوب.

مثال(٤،٥)

أوجد حل المسألة التالية:

$$a_n - a_{n-1} = n$$

$$a_0 = 1$$

الحل

واضح أن $c = a_n^{(h)}$ حيث c ثابت اختياري. وبما أن 1 جذر مميز تكراره 1، فإننا
 نفرض أن $a_n^{(p)} = n(c_0 + c_1 n^2) = c_0 n + c_1 n^2$ حل خاص. و بالتعويض نجد أن

$$(c_0 n + c_1 n^2) - [c_0(n-1) + c_1(n-1)^2] = n$$

و بمقارنة المعاملات نحصل على

$$c_0 - c_1 = 0$$

$$2c_1 = 1$$

$$c_0 = \frac{1}{2}, c_1 = \frac{1}{2}$$

إذًا، $a_n^{(p)} = \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2$. و بالتالي فإن $c_0 = \frac{1}{2}, c_1 = \frac{1}{2}$.

إذًا، $a_n = c + \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2$. و باستخدام الشرط $a_0 = 1$ نجد أن $c = 1$. إذًا،
 $a_n = 1 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2$ هو الحل المطلوب.

مثال (٤،٦)

أوجد حلاً خاصاً للعلاقة الارتدادية التالية:

$$u_n - 7u_{n-1} + 10u_{n-2} = 3^n$$

الحل

يوجد للمعادلة المميزة $x^2 - 7x + 10 = 0$ جذران: 2 تكراره 1 و 5 تكراره 1. إذاً، 3 ليس جذراً مميزاً. وبالتالي نفرض أن $u_n^{(p)} = c3^n$ حيث c ثابت. التعويض يعطينا

$$c3^n - 7c3^{n-1} + 10(c3^{n-2}) = 3^n$$

إذاً $9c - 21c + 10c = 9$ و نجد أن $c = -\frac{9}{2}$ وبالتالي فإن $u_n^{(p)} = -\frac{9}{2}3^n$ حل خاص.

مثال (٤،٧)

أوجد حلاً خاصاً للعلاقة الارتدادية التالية:

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 2^n$$

الحل

بما أن 2 جذر مميز تكراره 2 فإننا نفرض أن $a_n^{(p)} = cn^2 2^n$ حل خاص.

و بالتعويض نجد أن

$$cn^2 2^n - 4c(n-1)^2 2^{n-1} + 4c(n-2)^2 2^{n-2} = 2^n$$

إذاً $cn^2 - 2c(n-1)^2 + c(n-2)^2 = 1$ و تعطينا مقارنة المعاملات المعادلة

. إذاً $c = \frac{1}{2}$ وبالتالي فإن $a_n^{(p)} = \frac{1}{2}n^2 2^n = n^2 2^{n-1} . - 2c + 4c = 1$ حل خاص.

مثال (٤، ٨)

أكتب صيغة حل خاص لكل من العلاقات الارتدادية التالية :

$$a_n + 2a_{n-1} = 2^n - n^2 \quad (أ)$$

$$u_n + u_{n-1} = 3n2^n \quad (ب)$$

$$u_n - 4u_{n-1} + 4u_{n-2} = (n+1)2^n \quad (ج)$$

الحل

(أ) نجد حلاً خاصاً لـ 2^n على الشكل $a_n^{(p)} = c2^n$ لأن 2 ليس جذراً

مميزاً، ونجد حلاً خاصاً لـ $-n^2$ على الشكل $a_n + 2a_{n-1} = -n^2$

لأن 1 ليس جذراً مميزاً؛ ثم نستخدم مبدأ التراكب فنجد أن

$a_n^{(p)} = c_0 + c_1n + c_2n^2$ هو الحل الخاص المطلوب.

(ب) بما أن 2 ليس جذراً مميزاً فإننا نفرض أن الحل الخاص المطلوب هو

$$u_n^{(p)} = (c_0 + c_1n)2^n$$

(ج) بما أن 2 جذر مميز تكراره 2 فإننا نفرض أن الحل الخاص المطلوب هو

$$u_n^{(p)} = n^2(c_0 + c_1n)2^n$$

سنقدم في المثال التالي طريقة يمكن اتباعها لحل العلاقات الارتدادية التي يمكن

كتابتها على الشكل $a_n + f(n)a_{n-1} = g(n)$ حيث $f(n) \neq 0$ لـ $n \geq 1$

مثال(٤،٩)

أوجد حل المسألة التالية:

$$a_n - 2na_{n-1} = n, \quad n \geq 1$$

$$a_0 = 2$$

الحل

نبدأ بإيجاد حل للجزء المتتجانس $a_n - 2na_{n-1} = 0$ باستخدام التعويض الأمامي أو التعويض الخلفي. نفرض أن $a_n^{(h)} = u_n$ حل للجزء المتتجانس بحيث $u_0 = 1$. إذا، $u_n = 2nu_{n-1}$ و بالتالي فإن

$$\begin{aligned} u_n &= 2nu_{n-1} = 2n[2(n-1)u_{n-2}] \\ &= 2^2 n(n-1)u_{n-2} = 2^3 n(n-1)(n-2)u_{n-3} \\ &\vdots \\ &2^n n(n-1)(n-2)\cdots(3)(2)1u_0 = n!2^n \end{aligned}$$

والآن نفرض أن الحل المطلوب على الشكل $a_n = u_nv_n$ ، فيكون $a_0 = u_0v_0$ ؛ إذا كما يكون $v_0 = 2$

$$a_n - 2na_{n-1} = n, \quad n \geq 1$$

$$u_nv_n - 2nu_{n-1}v_{n-1} = n$$

$$u_nv_n - u_nv_{n-1} = n$$

$$v_n - v_{n-1} = \frac{n}{u_n}$$

$$v_n - v_{n-1} = \frac{n}{n!2^n}$$

$$v_n = v_{n-1} + \frac{n}{n!2^n}$$

وبالتالي فإن

$$\begin{aligned} v_n &= v_{n-2} + \frac{n-1}{(n-1)!2^{n-1}} + \frac{n}{n!2^n} \\ &= v_{n-3} + \frac{n-2}{(n-2)!2^{n-2}} + \frac{n-1}{(n-1)!2^{n-1}} + \frac{n}{n!2^n} \\ &\quad \vdots \\ &= v_0 + \frac{1}{1!2} + \frac{2}{2!2^2} + \cdots + \frac{n}{n!2^n} \end{aligned}$$

إذا

$$v_n = 2 + \frac{1}{1!2} + \frac{2}{2!2^2} + \cdots + \frac{n}{n!2^n}$$

ويكون الحل المطلوب هو

$$a_n = u_n v_n = n!2^n \left[2 + \frac{1}{1!2} + \frac{2}{2!2^2} + \cdots + \frac{n}{n!2^n} \right]$$

و كما هو معلوم، فإنه يمكن استخدام الدوال المولدة العادية و الدوال المولدة الأésية في حل العلاقات الارتدادية. و نقدم الآن بعض الأمثلة على ذلك.

مثال (٤، ١٠)

أوجد حل المسألة التالية مستخدما الدوال المولدة.

$$a_n = a_{n-1} + n, \quad n \geq 1$$

$$a_0 = 1$$

الحل

نفرض أن الدالة المولدة للمتتالية (a_n) هي $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. إذ

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n-1} + n)x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^n + \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \\ &= 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} nx^n \\ &= 1 + xf(x) + \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

وبالتالي فإن

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1-x} + \frac{x}{(1-x)^2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{n} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)(n+1)}{2} x^n \end{aligned}$$

ومن معامل x^n نجد أن

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \frac{(n+1)n}{2} \\ &= 1 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2 \end{aligned}$$

مثال (١١، ٤)

استخدم الدوال المولدة لحل المسألة التالية :

$$a_n = 2a_{n-1} + 4^{n-1}, \quad n \geq 1$$

$$a_0 = 1$$

الحل

نفرض أن الدالة المولدة للمتتالية (a_n) هي $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. إذا

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (2a_{n-1} + 4^{n-1})x^n \\ &= 1 + 2x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (4x)^n \\ &= 1 + 2xf(x) + \frac{1}{4} \left[\frac{1}{1-4x} - 1 \right] \end{aligned}$$

وبالتالي فإن

$$f(x) = \frac{1-3x}{(1-2x)(1-4x)}$$

و باستخدام الكسور الجزئية نجد أن

$$f(x) = \frac{\frac{1}{2}}{(1-2x)} + \frac{\frac{1}{2}}{1-4x}$$

إذا

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^n$$

وبحساب معامل x^n نجد أن

$$a_n = \frac{1}{2} 2^n + \frac{1}{2} 4^n$$

مثال (٤، ١٢)

استخدم الدوال المولدة الأسيية لحل المسألة التالية :

$$d_n = n d_{n-1} + (-1)^n, \quad n \geq 1$$

$$d_0 = 1$$

الحل

نفرض أن الدالة المولدة الأسيية للمقاييسة (d_n) هي . إذا

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n x^n}{n!} \\ f(x) &= \frac{d_0}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{n!} x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} [n d_{n-1} + (-1)^n] x^n \\ &= 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n \end{aligned}$$

$$= 1 + xf(x) + [e^{-x} - 1]$$

وبالتالي فإن

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{e^{-x}}{1-x} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \right) x^n \end{aligned}$$

ومن معامل x^n نجد أن

$$\frac{d_n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

إذا

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

(٤،٣) بناء العلاقات الارتدادية

ونختتم موضوع العلاقات الارتدادية بإعطاء بعض الأمثلة التي توضح كيفية بنائها.

مثال(٤،١٣)

لتكن $\{0,1\} = \sum$ أبجدية و لترمز a_n لعدد الكلمات التي طول كل منها n والتي لا تحتوي على ثلاثة أصفار متعاقبة، أي لا تحتوي على النسق 000. أوجد علاقة ارتدادية للمتتالية (a_n) و عين الشروط الابتدائية.

الحل

لتكن $x_1 \cdots x_n$ كلمة طولها n و لا تحتوي على النسق 000. إذا كان $x_1 = 1$ فإن $x_2 \cdots x_n$ كلمة طولها $n-1$ و لا تحتوي على النسق 000. أما إذا كان $x_1 = 0$ فإنه إما أن يكون $x_1x_2 = 01$ أو أن يكون $x_1x_2 = 00$. عندما يكون $x_1x_2 = 01$ فإن $x_3 \cdots x_n$ كلمة طولها $n-2$ و لا تحتوي على النسق 000، و عندما يكون $x_1x_2 = 00$ فلا بد أن يكون $x_3 = 1$ و بالتالي فإن $x_4 \cdots x_n$ تكون الكلمة طولها $n-3$ و لا تحتوي على النسق 000. ينبع من النقاش السابق أن $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$ لكل $n \geq 3$. و من جهة ثانية فإن $a_0 = 1$ لأن الكلمة التي طولها صفر، أي الكلمة الخالية، لا تحتوي على النسق 000. و بالمثل فإن $a_1 = 2$ و $a_2 = 4$ لأن جميع الكلمات التي طول كل منها 1 أو 2 لا تحتوي على النسق 000.

مثال(٤،١٤)

لتكن $\{0,1,2,\dots,9\} = \sum$ أبجدية و لترمز a_n لعدد الكلمات التي طول كل منها n و التي تحتوي على عدد زوجي من الأصفار. أوجد علاقة ارتدادية للمتتالية (a_n) و عين الشروط الابتدائية.

الحل

لتكن $x_1x_2x_3\cdots x_n$ الكلمة طولها n و تحتوي على عدد زوجي من الأصفار. إذا كان $x_1 \neq 0$ فإن $x_1x_2x_3\cdots x_n$ الكلمة طولها $n-1$ و تحتوي على عدد زوجي من الأصفار. أما إذا كان $x_1 = 0$ فإن $x_2x_3\cdots x_n$ الكلمة طولها $n-1$ و تحتوي على عدد فردي من الأصفار. بما أن عدد الكلمات التي طول كل منها $n-1$ يساوي 10^{n-1} ؛ فنجد أن $a_n = 8a_{n-1} + 10^{n-1}$. أي، $a_n = 9a_{n-1} + (10^{n-1} - a_{n-1})$ لكل $n \geq 1$. كذلك، $a_0 = 1$ لأن الكلمة الخالية، لا تحتوي على أصفار.

مثال (٤، ١٥)

نقول عن مستقيمات في المستوى إنها في وضع عام عندما تتقاطع زوجاً وأي ثلاثة منها لا تلتقي في نقطة. لترمز a_n إلى عدد المناطق الناتجة عن n من المستقيمات التي هي في وضع عام في المستوى. أوجد علاقة ارتقائية للمنتالية (a_n) و عين الشروط الابتدائية.

الحل

لتكن L_1, L_2, \dots, L_n مستقيمات في وضع عام في المستوى و لتكن A_1, A_2, \dots, A_{n-1} نقاط تقاطع L_n مع L_1, L_2, \dots, L_{n-1} على الترتيب. نلاحظ أن النقاط A_1, A_2, \dots, A_{n-1} تقسم L_n إلى n جزء. كما نلاحظ أن L_1, L_2, \dots, L_{n-1} في وضع عام في المستوى، وكل جزء من أجزاء L_n يقسم منطقة من المناطق المعينة بالمستقيمات L_1, L_2, \dots, L_{n-1} إلى منطقتين. إذا $a_n = a_{n-1} + n$ لكل $n \geq 1$. كذلك، واضح أن $a_0 = 1$.

مثال (٤، ١٦)

لترمز d_n إلى عدد التبديلات التامة للمجموعة $\{1, 2, \dots, n\}$. أوجد علاقة ارتادية للمتتالية (d_n) و عين الشروط الابتدائية.

الحل:

سنجد ثالث علاقات ارتادية مختلفة للمتتالية (d_n) .

(أ) واضح أن $d_1 = 0$, $d_2 = 1$. لتكن $X = \{1, 2, \dots, n\}$ حيث $n \geq 3$, و ليكن $x_1 x_2 \cdots x_n$ تبديل تاما للمجموعة X . إذا $x_1 \neq 1$, و بالتالي فإن مجموعة التبديلات التامة التي فيها $x_1 = 2$ ، و مجموعة التبديلات التامة التي فيها $x_1 = 3$ ، ...، و مجموعة التبديلات التامة التي فيها $x_1 = n$ ، تكون تجزئة لمجموعة التبديلات التامة للمجموعة X . واضح أن كلا من أجزاء هذه التجزئة يحتوي على العدد نفسه من التبديلات التامة للمجموعة X . ليكن a_n هو عدد التبديلات التامة للمجموعة X و التي فيها $x_1 = 2$. إذا $a_{n-1} = (n-1) d_n$. و لحساب a_n فإننا نعتبر مجموعة التبديلات التامة التي لها الشكل:

$$2x_2 x_3 \cdots x_n; x_2 \neq 3, \dots, x_n \neq n$$

توجد تجزئة لهذه المجموعة إلى جزئين: الأول يتكون من التبديلات التامة التي فيها $x_2 = 1$ و الثاني الأول يتكون من التبديلات التامة التي فيها $x_2 \neq 1$. إن عدد التبديلات التامة في الجزء الأول هو d_{n-2} لأنه يساوي عدد التبديلات التامة للمجموعة $\{3, 4, \dots, n\}$ التي فيها $x_3 \neq 3, x_4 \neq 4, \dots, x_n \neq n$. أما

عدد التبديلات التامة في الجزء الثاني فهو d_{n-1} لأنّه يساوي عدد التبديلات التامة

للمجموعة $\{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ التي فيها

$$x_2 \neq 1, x_3 \neq 2, x_4 \neq 3, \dots, x_n \neq n$$

إذاً $d_n = (n-1)[d_{n-2} + d_{n-1}]$, $n \geq 3$ وبالتالي فإن $a_n = d_{n-2} + d_{n-1}$

اصطلحنا على وضع $d_0 = 1$ فإنه يمكن كتابة العلاقة الارتدادية والشروط الابتدائية

على الشكل

$$d_n = (n-1)[d_{n-2} + d_{n-1}], \quad n \geq 2$$

$$d_0 = 1, \quad d_1 = 0$$

(ب) ضع $d_n = (n-1)[d_{n-2} + d_{n-1}]$ لكل $n \geq 1$. باستخدام $a_n = d_n - nd_{n-1}$

نجد أن

$$a_n = d_n - nd_{n-1} = -1[d_{n-1} - (n-1)d_{n-2}]$$

إذاً $a_n = (-1)^n a_{n-1}$ لكل $n \geq 2$ و $a_1 = -1$ ؛ و ينتج أن $a_n = -a_{n-1}$ لكل $n \geq 1$.

$$d_n = nd_{n-1} + (-1)^n \quad n \geq 1$$

$$d_0 = 1$$

(ج) ليكن σ تبديلاً للمجموعة $A = \{1, 2, \dots, n\}$ ولتكن $B = \{x \in A : \sigma(x) \neq x\}$

إذاً σ تعطينا تبديلاً تاماً للمجموعة B التي هي مجموعة جزئية من A . و نصطلح

على أن σ تعطينا التبديل التام الوحيد للمجموعة الحالية عندما تكون $B = \emptyset$.

و بالتالي يمكن تعريف تبديلات المجموعة $\{1, 2, \dots, n\} = A$ كما يلي : نختار مجموعة جزئية $B \subseteq A$ ثم نختار تبديلا تاما τ للمجموعة B ثم نعرف تبديلا σ للمجموعة $|B| = k$ بوضع $\sigma(x) = \tau(x)$ لكل $x \in B$ و $\sigma(x) = x$ لكل $x \notin B$. و إذا كان فإن عدد طرق اختيار B يساوي $\binom{n}{k}$. إذا ، بحساب عدد تبديلات A مباشرة وعن طريق التبديلات التامة للمجموعات الجزئية من A نجد أن

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k = n!$$

و بالتالي فإن

$$d_n = n! - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} d_k, \quad n \geq 1$$

$$d_0 = 1$$

نقدم الآن المسألة المعروفة بأحجية أبراج هانوي


مثال (٤، ١٧)

توجد ثلاثة أوتاد رأسية A, B, C على لوحة أفقية. و يوجد n من الأقراص المثقوبة حول مراكزها ، و هذه الأقراص مختلفة من حيث الأقطار و مرتبة على الوتد A بحيث تتناقص أطوال أقطار الأقراص من أسفل إلى أعلى. نريد نقل الأقراص إلى الوتد C شرط أن نحمل في النقلة الواحدة قرصا واحدا و شرط أن لا نضع قرصا فوق آخر إذا كان الأول أكبر من الثاني قطرها و شرط أن نستخدم الأوتاد A, B, C فقط. المطلوب ايجاد


المتالية (a_n) حيث a_n ترمز إلى أصغر عدد ممكن من النقلات التي تفي بغرضنا عندما يكون عدد الأقراص يساوي n .

الحل

يبين الشكل التالي أن n من الأقراص المختلفة متيبة على A الود بينما الودان B و C خاليان من الأقراص.



أولاً، ننقل جميع الأقراص ما عدا القرص الأكبر من الود A إلى الود B . و بالطبع فإن القرص الأكبر يترك ثابتاً في مكانه أثناء اجراء عمليات النقل. إن عدد النقلات الأمثل لإنجاز المهمة السابقة يساوي a_1 . و يبين الشكل التالي الأقراص في الوضع الجديد.



الآن، ننقل القرص الأكبر من الوتد A إلى الوتد C ونجز هذه المهمة بنقلة واحدة. ثم ننقل الأقراص الأخرى من الوتد B إلى الوتد C ، ونجز هذه المهمة بعدد من النقلات يساوي a_{n-1} . ويرى القارئ بسهولة أن الخوارزمية السابقة هي الخوارزمية المثلثي لنقل جميع الأقراص من الوتد A إلى الوتد C .

إذاً $a_n = a_{n-1} + 1 + a_{n-1}$ ، و بالتالي فإن $a_n = 2a_{n-1} + 1$ لكل $n \geq 2$. كذلك

$a_1 = 1$ ؛ وإذا اصطلحنا على أن $a_0 = 0$ فيكون

$$a_n = 2a_{n-1} + 1, \quad n \geq 1$$

$$a_0 = 0$$


تظهر أعداد كتلان Catalan numbers في كثير من مسائل العد. ولتقديم هذه الأعداد فإننا نختار مقاربة هندسية. إذا كانت لدينا منطقة مضلعة محدبة، و قسمناها إلى مناطق مثلثة مستخدمين أقطاراً غير متقطعة زوجاً زوجاً داخلها، فإننا نسمي مجموعة المناطق المثلثة مثالثة للمنطقة المضلعة.

مثال (٤، ١٨)

لكل عدد صحيح $n \geq 2$ ، لترمز t_n إلى عدد مثلثات منطقة مضلعة محدبة عدد أضلاعها $n+1$. ولنعرف $t_0 = 0, t_1 = 1$. أوجد علاقة ارتدادية للمتالية (t_n) ، ثم أوجد صيغة جبرية صريحة للحد العام t_n .

الحل

نجد بسهولة أن $t_2 = 1$. نفرض الآن أن $n \geq 3$ ، و لتكن R منطقة محدبة عدد أضلاعها $n+1$ ورؤوسها النقاط v_1, v_2, \dots, v_{n+1} كما يوضح الشكل التالي :



نختار ضلعا $[v_k v_{k+1}]$ ، مثلا ، و نثبته . إذا كانت T مثلثة لمنطقة R ، فإن $[v_k v_{k+1}]$ يكون ضلعا لمنطقة مثلثة Δ من مناطق T ويكون أحد الرؤوس v_i رأسا لـ Δ . واضح أن Δ تقسم المنطقة المتبقية من R إلى منطقتين مضلعتين محدبتين R_1 و R_2 عندما يكون $i \neq k+2$ و $i \neq k-1$. أما إذا

كان $i = k + 2$ أو $i = k - 1$ فإن R تنقسم إلى Δ و إلى منطقة مضلعة محدبة أخرى R' . و من هنا فإن عدد أضلاع R_1 يساوي $j + 1$ و عدد أضلاع R_2 يساوي $n - j + 1$ حيث j يساوي أحد الأعداد $2, 3, \dots, n - 2$ ، و عدد أضلاع R' يساوي n . واضح أن T تعطينا مثلثات لكل من R' و R_1 و R_2 ، و إذا كان لدينا مثلثات كل من R' و R_1 و R_2 ، فإننا نحصل على مثلثة للمنطقة R . و بما أن عدد مثلثات R' و R_1 و R_2 يساوي $n + 1$ و $n - j + 1$ على الترتيب فإن عدد مثلثات R يساوي $t_j t_{n-j}$ عندما يكون $i \neq k - 1$ و $i \neq k + 2$ ، كما أن عدد مثلثات R يساوي t_{n-1} عندما يكون $i = k - 1$. إذا ، t_n ، أي عدد مثلثات R ، يحقق العلاقة $t_n = t_{n-1} + t_2 t_{n-2} + t_3 t_{n-3} + \dots + t_{n-2} t_2 + t_{n-1}$ لكل $n \geq 3$. و بما أن

$$t_0 = 0, t_1 = 1 \quad \text{العلاقة } n \geq 3 \text{ تتحقق لـ } t_n \text{ فإن}$$

$$t_n = t_0 t_n + t_1 t_{n-1} + t_2 t_{n-2} + \dots + t_{n-2} t_2 + t_{n-1} t_1 + t_n t_0 \dots \dots \dots (*)$$

و لما كانت $t_2 = 1$ فإن $(*)$ تتحقق لـ $n \geq 2$. و نخلص إلى أن المتالية (t_n) تتحقق

$$t_n = t_0 t_n + t_1 t_{n-1} + t_2 t_{n-2} + \dots + t_{n-2} t_2 + t_{n-1} t_1 + t_n t_0, \quad n \geq 2$$

$$t_0 = 0, t_1 = 1$$

ولإيجاد t_n نستخدم طريقة الدوال المولدة. في الحقيقة ، لتكن $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} t_n x^n$ هي الدالة المولدة للمتالية (t_n) . عندئذ،

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} t_n x^n = t_0 + t_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} t_n x^n$$

$$= t_0 + t_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} (t_0 t_n + t_1 t_{n-1} + \cdots + t_n t_0) x^n$$

$$= t_0 + t_1 x + f(x)f(x) + t_0 t_0 - (t_0 t_1 + t_1 t_0) x$$

$$= x + (f(x))^2$$

$$(f(x))^2 - f(x) + x = 0 \quad \text{إذا}$$

و منه $f(0) = t_0 = 0$ و بما أن $f(x) = \frac{1 \mp \sqrt{1-4x}}{2}$ فإن

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}$$

والآن نجد مفهوك $f(x)$ باستخدام متسلسلة ذات الحدين كما يلي:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-4x)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n \binom{\frac{1}{2}}{n} x^n \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} [1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 4^n \binom{\frac{1}{2}}{n} x^n] = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} 4^n \binom{\frac{1}{2}}{n} x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} 4^n \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\cdots(\frac{1}{2}-n+1)}{n!} x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} 4^n \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\cdots(-\frac{2n+3}{2})}{n!} x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} 4^n \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} \frac{1.3.5\cdots(2n-3)}{n!} x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} \frac{1.2.3.4\cdots(2n-3)(2n-2)}{2.4.6\cdots(2n-2)} x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} \frac{(2n-2)!}{(n-1)! 2^{n-1}} x^n \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n$$

إذا $t_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$ حيث $n \geq 1$. وتسمى المتتالية (c_n) ، حيث

لكل $c_n = t_{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ متتالية أعداد كتلان.

- ١- تسمى الكلمات التي حروفها من الأبجدية $\{0,1\}$ $\sum = \text{كلمات ثنائية. لترمز } a_n$ إلى عدد الكلمات الثنائية التي طول كل منها n و التي تحتوي على النسق ٠٠. أوجد علاقة ارتدادية للمتالية (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية ، ثم أوجد الحل.
- ٢- لترمز b_n إلى عدد الكلمات الثنائية التي طول كل منها n و التي تحتوي على النسق ٠٠٠. أوجد علاقة ارتدادية للمتالية (b_n) ، أوجد الشروط الابتدائية ، ثم أوجد الحل.
- ٣- لتكن $A = \{1,2,\dots,n\}$ عندما $n > 0$ و $A = \emptyset$ عندما $n = 0$. و لترمز a_n إلى عدد المجموعات الجزئية من A التي لا يحتوي كل منها على عددين صحيحين متعاقبين. أوجد علاقة ارتدادية للمتالية (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية ، ثم أوجد الحل.
- ٤- تسمى الكلمة التي حروفها من الأبجدية $\{0,1,2,3\}$ $\sum = \text{كلمة رباعية. لترمز } a_n$ إلى عدد الكلمات الرباعية التي طول كل منها n و التي تحتوي على عدد زوجي من الحرف ٠. أوجد علاقة ارتدادية للمتالية (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية ، ثم أوجد الحل.
- ٥- لترمز a_n إلى عدد الكلمات الرباعية التي طول كل منها n و التي تحتوي على عدد زوجي من الحرف ٠ و عدد زوجي من الحرف ٣. أوجد نظاما من

العلاقات الارتدادية يربط (a) بامثالها من المتتاليات المعرفة بناءً على زوجية أو فردية تكرار الحروف في كلماتها. أوجد الشروط الابتدائية.

- ٦ - (أ) أوجد الحل للتمرين (١) عندما لا تحتوي الكلمة على النسق ٥٥.
 (ب) أوجد علاقة بين المتتالية (a) المعطاة في (أ) ومتتالية فيبوناتشي (b).
 (ج) استند إلى (ب) واستخدم عدد الكلمات الثنائية التي طول كل منها n و
- التي تكرار الحرف ٠ فيها يساوي k لإثبات أن

$$f_{n+1} = \sum_{k=0}^{\left[\frac{n+1}{2}\right]} \binom{n+1-k}{k}, \quad n \geq 1$$

- ٧ - أوجد الحل للتمرين (٢) عندما لا تحتوي الكلمة على النسق ٠٠٥.
 ٨ - تسمى الكلمة التي حروفها من الأبجدية $\{0,1,2\}$ كلمة ثلاثة. أوجد الحلول للتمارين (١)، (٢)، (٦)، (٧) عندما تكون الكلمات ثلاثة.
 ٩ - يقال عن مجموعة الدوائر إنها في وضع عام في مستوى إذا كانت تقع في المستوى بحيث تتقطع زوجا زوجا في نقطتين ولا تتقطع ثلاثة ثلاثة في أية نقطة. لترمز (a) إلى عدد المناطق الناشئة عن n من الدوائر التي هي في وضع عام في المستوى. أوجد علاقة ارتدادية للمتتالية (a)، أوجد الشروط الابتدائية، ثم أوجد الحل.

١٠ - أوجد الحل لمسألة أبراج هانوي عندما يكون عدد الأوتاد أربعة.

١١ - أوجد الحل للتمرين (٥) عندما تكون الكلمات ثنائية.

١٢ - أوجد علاقة ارتدادية للمتتالية (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية ، ثم أوجد الحل عندما يكون

$$(أ) \quad a_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$$

$$(ب) \quad a_n = 1 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + n(n+1)$$

$$(ج) \quad a_n = 1 + 3 + 9 + \dots + 3^n$$

١٣ - تسمى دائرة على سطح كروي دائرة كبرى إذا كان مركزها هو مركز الكرة نفسه. لترمز a_n إلى عدد المناطق على السطح الكروي الناتجة عن n من الدوائر الكبرى التي لا تتقاطع ثلاثة ثلاثة في أية نقطة. أوجد علاقة ارتدادية للمتتالية (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية ، ثم أوجد الحل.

١٤ - لترمز a_n إلى عدد تبديلات المجموعة $\{1, 2, \dots, n\}$ التي يجعل كل منها كل عدد في موضعه الطبيعي أو في الموضع الذي يسبق مباشرة موضعه الطبيعي أو في الموضع الذي يلي مباشرة موضعه الطبيعي. أوجد علاقة ارتدادية للمتتالية (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية ، ثم أوجد الحل.

١٥ - يستطيع ربوت أن يتحرك إلى الأمام بخطوات كل منها متر أو متراً. لترمز a_n إلى عدد الطرائق التي يقطع بها الربوت مساراً طوله n متراً. أوجد علاقة ارتدادية للمتتالية (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية ، ثم أوجد الحل.

١٦ - إذا كانت $A^n = \begin{bmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{bmatrix}$ فأوجد علاقات ارتدادية

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ترتبط بين المتتاليات $(a_n), (b_n), (c_n), (d_n)$ واستخدم تلك العلاقات لحساب A^{100} .

١٧ - لتكن $\{B_n\}_{n=1}^{\infty} = \{1, 2, \dots, n\}$ ، ولتكن $a_n = |A_n|$ حيث $A_n = \{(a, b, c) \in B_n^3 : a < b < c, b - a = c - b\}$. أثبت أن $a_{2n+1} = a_{2n} + n$ وأوجد علاقة مشابهة تربط بين a_{2n} و a_{2n-1} . ثم أثبت أن المتتالية (a_n) تحقق العلاقة $a_n = a_{n-2} + n - 2$. أوجد الشروط الابتدائية، ثم أوجد الحل.

١٨ - لتكن المصفوفة $A_n = [a_{ij}]$ مصفوفة من النوع $n \times n$ بحيث كل عنصر قطرى فيها يساوى 2 وكل عنصر يقع فوق أو تحت القطر مباشرة يساوى 1 بينما كل عنصر آخر يساوى صفرًا. إذا كانت $d_n = \det(A_n)$ ، فأوجد علاقة ارتدادية للممتتالية (d_n) ، أوجد الشروط الابتدائية، ثم أوجد الحل.

١٩ - لدينا $2n$ نقطة P_1, P_2, \dots, P_{2n} موزعة على محيط دائرة بحيث تكون رؤوس مضلع منتظم. لترمز a_n إلى عدد تجزئات المجموعة $\{P_1, P_2, \dots, P_{2n}\}$ إلى أزواج بحيث لا تتقاطع الأوتار المعينة بأزواج التجزئة زوجاً زوجاً. أوجد علاقة ارتدادية للممتتالية (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية، ثم أوجد الحل وقارنه بأعداد كتلان.

-٢٠ - لترمز a_n إلى عدد تجزئات المجموعة $\{1, 2, \dots, n\}$ بحيث تكون أجزاء التجزئة أزواجاً أو مجموعات أحادية. أوجد علاقة ارتقائية للمقاييس (a_n) ، أوجد الشروط الابتدائية، ثم أوجد الحل مستخدماً طريقة الدوال المولدة الأسيّة.

-٢١ - أوجد الحل العام لكل من العلاقات الارتقائية التالية؛ و إذا كانت الجذور المميزة أعداداً مركبة فاكتب الحل العام معتبراً الثوابت الاختيارية أعداداً مركبة.

$$a_n - 4a_{n-1} + 3a_{n-2} = 0 \quad (\text{أ})$$

$$a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0 \quad (\text{ب})$$

$$a_n + 3a_{n-2} = 0 \quad (\text{ج})$$

$$a_n + 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0 \quad (\text{د})$$

$$a_n + 10a_{n-1} + 32a_{n-2} + 32a_{n-3} = 0 \quad (\text{هـ})$$

$$a_n + 3a_{n-1} + 3a_{n-2} + a_{n-3} = 0 \quad (\text{وـ})$$

$$4a_n - 20a_{n-1} + 17a_{n-2} - 4a_{n-3} = 0 \quad (\text{زـ})$$

$$a_n + 6a_{n-1} + 12a_{n-2} + 8a_{n-3} = 0 \quad (\text{حـ})$$

-٢٢ - أوجد حل كل من المسائل التالية؛ و إذا كانت الجذور المميزة أعداداً مركبة فاستخدم صيغة دي موافر لكتابة الحل في شكل بسيط.

$$a_n - 7a_{n-1} + 10a_{n-2} = 0 \quad (\text{أ})$$

$$a_0 = 0, a_1 = 3$$

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0 \quad (\text{بـ})$$

$$\alpha_0=1,\,\alpha_1=6$$

$$\alpha_n+\alpha_{n-1}+\alpha_{n-2}=0\;\;(\zeta)$$

$$\alpha_0=0,\,\alpha_1=2$$

$$\alpha_n-\alpha_{n-1}-\alpha_{n-2}=0\;\;(\wp)$$

$$\alpha_0=1,\,\alpha_1=1$$

$$\alpha_n-2\alpha_{n-1}+2\alpha_{n-2}-\alpha_{n-3}=0\;\;(\rightarrow)$$

$$\alpha_0=2,\,\alpha_1=1,\,\alpha_2=1$$

$$\alpha_n-2\alpha_{n-1}+2\alpha_{n-2}=0\;\;(\wp)$$

$$\alpha_0=1,\,\alpha_1=2$$

$$\alpha_n-2\cos(\alpha)\alpha_{n-1}+\alpha_{n-2}=0\;\;(\wp)$$

$$\alpha_0=1,\,\alpha_1=\cos(\alpha)$$

$$\alpha_n-6\alpha_{n-1}+11\alpha_{n-2}-6\alpha_{n-3}=0\;\;(\zeta)$$

$$\alpha_0=2,\,\alpha_1=5,\,\alpha_2=15$$

$$a_n - a_{n-4} = 0 \quad (\text{ط})$$

$$a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -1, a_3 = 1$$

$$a_n - 7a_{n-1} + 16a_{n-2} - 12a_{n-3} = 0 \quad (\text{ي})$$

$$a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 0$$

٢٣- أوجد حالاً خاصاً لكل من العلاقات الارتدادية التالية

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 3n + 2 \quad (\text{أ})$$

$$a_n + 3a_{n-1} = 4^n \quad (\text{ب})$$

$$a_n - a_{n-1} = 2n^2 - n - 1 \quad (\text{ج})$$

$$a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = n + 2^n \quad (\text{د})$$

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = (-2)^n \quad (\text{هـ})$$

$$a_n + a_{n-1} - 2a_{n-2} = n - 2 \quad (\text{وـ})$$

$$a_{n+2} + 2a_{n+1} - 8a_n = 27(5^n) \quad (\text{زـ})$$

$$4a_{n+2} - a_n = 3 \cos(n \frac{\pi}{2}) \quad (\text{حـ})$$

$$[a_n^{(p)} = c_1 \cos(n \frac{\pi}{2}) + c_2 \sin(n \frac{\pi}{2})] \text{ إرشاد: ضع}$$

٢٤- أوجد الحل لكل من المسائل التالية:

$$a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 3 \quad (\text{أـ})$$

$$a_0 = 1, a_1 = 1$$

$$a_n - 2a_{n-1} = n^2 \quad (\checkmark)$$

$$a_0=1$$

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 2^n \quad (\checkmark)$$

$$a_0=1,\, a_1=2$$

$$a_{n+2} + a_{n+1} - 6a_n = 5(2^{n+1}) \quad (\times)$$

$$a_0=2,\, a_1=-1$$

$$a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 2 \quad (\cancel{\times})$$

$$a_0=1,\, a_1=0$$

$$a_n + 2a_{n-1} = 2^n - n^2 \quad (\times)$$

$$a_0=1$$

$$a_n - 2a_{n-1} = 2^{n-1} \quad (\checkmark)$$

$$a_0=2$$

$$a_n - 7a_{n-1} + 10a_{n-2} = 8(3^{n-2}) + 3(2^{n-2}) \quad (\underline{\text{ج}})$$

$$a_0 = -3, a_1 = -15$$

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + 2a_n = 2^n \quad (\underline{\text{د}})$$

$$a_0 = 1, a_1 = 2$$

-٢٥ - أوجد الحل لكل من المسائل التالية :

$$a_n + na_{n-1} = n! \quad (\dot{\underline{\text{أ}}})$$

$$a_0 = 1$$

$$a_n - 2na_{n-1} = n \quad (\dot{\underline{\text{ب}}})$$

$$a_0 = 2$$

$$a_n - 2^{-n}a_{n-1} = 1 \quad (\underline{\text{ج}})$$

$$a_0 = 1$$

$$a_n^3 - 2a_{n-1}^3 = 1 \quad (\dot{\underline{\text{و}}})$$

$$a_0 = 1$$

$$a_{n+2}^2 - 5a_{n+1}^2 + 6a_n^2 = 7n \quad (\text{هـ})$$

$$a_0 = 1, a_1 = 1$$

$$a_n^2 - 2a_{n-1} = 0 \quad (\text{وـ})$$

$$a_0 = 4$$

[$b_n = \log_2 a_n$ ضع إرشاد:]

$$na_n + (n-1)a_{n-1} = 2^n \quad (\text{جـ})$$

$$a_0 = 273$$

$$a_n - na_{n-1} = n! \quad (\text{حـ})$$

$$a_0 = 2$$

-٢٦- استخدم الدوال المولدة لحل المسائل التالية :

$$a_n - a_{n-1} = n \quad (\text{أـ})$$

$$a_0 = 1$$

$$a_n - 2a_{n-1} = 4^{n-1} \quad (\text{بـ})$$

$$a_0 = 1$$

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 2^n + n \quad (\text{ج})$$

$$a_0 = 1, a_1 = 1$$

$$a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 0 \quad (\text{ج})$$

$$a_0 = 0, a_1 = 1$$

$$a_n = 3a_{n-1} + 2b_{n-1} \quad (\text{هـ})$$

$$b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$$

$$a_0 = 1, b_0 = 0$$

$$a_{n+1} = 2a_n + b_n + c_n \quad (\text{جـ})$$

$$b_{n+1} = b_n - c_n + 4^n$$

$$c_{n+1} = c_n - b_n + 4^n$$

$$a_0 = 1, b_0 = 0, c_0 = 0$$

$$a_{n+1} = 5a_n + 6b_n + 1 \quad (\text{زـ})$$

$$b_{n+1} = -6a_n - 7b_n - 1$$

$$a_0 = \frac{3}{2}, b_0 = \frac{-3}{2}$$

[ملاحظة: الحل ممكن بطريقة الحذف حيث نجد a_{n+2} من العلاقة الأولى ثم

نعرض عن b_{n+1} وعن b_n فنحصل على علاقة للمتالية (a_n) فقط.]

$$a_0a_n + a_1a_{n-1} + a_2a_{n-2} + \cdots + a_na_0 = 2^n a_n \quad (\text{C})$$

$$a_0 = 1, a_1 = 1$$

$$a_n = a_{n-1} + (n-1)a_{n-2} \quad (\text{b})$$

$$a_0 = 1, a_1 = 1$$

$$a_n = 2a_{n-1} + \frac{2^n}{n} \quad (\text{c})$$

$$a_0 = 1$$

الفصل الخامس

مبدأ برج الحمام وأعداد رمزي

THE PIGEONHOLE PRINCIPLE AND RAMSEY'S NUMBERS

(١،٥) مبدأ برج الحمام

إن مبدأ برج الحمام بسيط ولكنه أداة فعالة عندما نحاول إثبات أنه يوجد حل لمسألة تركيبية. وهذا المبدأ لا يرشدنا إلى كيفية الحصول على حل ولا يعطينا عدد الحلول الممكنة ولكنه يخبرنا أنه يوجد حل واحد، على الأقل، للمسألة المعالجة.

مبرهنة (١،٥) (مبدأ برج الحمام)

إذا وزعنا m كرة على n صندوقاً و كان $m > n$ فإنه يوجد صندوق يحتوي على $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor + 1$ كرة على الأقل.

البرهان: نفرض أن كل صندوق يحتوي على $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor$ كرة على الأكثر. إذاً، يكون عدد الكرة أقل من أو يساوي

$$n \left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor \leq n \left(\frac{m-1}{n} \right) = m-1$$

■ m وهذا ينافي أن عدد الكرات

هناك صياغات متعددة لهذا المبدأ، و يمكن التعبير عنه بلغة المجموعات كما

يلي:

إذا كان $f: A \rightarrow B$ تطبيقاً بحيث $|A| = m, |B| = n, m > n$ وإذا رمزنا للصورة

العكسية لأي عنصر $y \in B$ بالرمز $f^{-1}(y)$ ، فإنه يوجد $b \in B$ بحيث

$$|f^{-1}(b)| \geq \left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor + 1$$

مثال (٥،١)

لكل عدد صحيح موجب n فإن كل مجموعة جزئية $\{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$ عدد

عناصرها $n+1$ من المجموعة $\{1, 2, \dots, 2n\}$ يجب أن تحتوي على

(أ) عددين أوليين نسبياً.

(ب) عددين يقسم أحدهما الآخر.

البرهان:

(أ) نكون مجموعة الأزواج $A = \{(1,2), (3,4), \dots, (2n-1, 2n)\}$. لاحظ أن $|A| = n$.

إذن يكون لدينا $n+1$ كرة (الأعداد a) نريد توزيعها على n صندوقاً (الأزواج

$(1, j), (j, 2), \dots, (j, n)$). بتطبيق مبدأ برج الحمام نجد أنه يوجد صندوق يحتوي على كرتين على

الأقل، و بالتالي يحتوي على كرتين بالضبط. إذن تحتوي المجموعة $\{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$ على عددين متعاقبين $2k-1, 2k$ و هما أوليان نسبياً.

(ب) لكل $j \leq n+1$ ليكن $a_j = b_j 2^{i_j}$ حيث b_j عدد فردي، و لتكن $B = \{1, 3, \dots, 2n-1\}$. واضح أن $|B| = n$ و أن $b_j \in B$ لكل j . بما أن عدد عناصر $\{b_1, b_2, \dots, b_{n+1}\}$ يساوي $n+1$ و بما أن $|B| = n$ فإنه يوجد $k \neq m$ بحيث $a_m = b_m 2^{i_m} = b_k 2^{i_k}$ و $a_k = b_k 2^{i_k}$. إذن a_m أو a_k يقسم $b_k = b_m$. و بالتالي فإن $a_m = b_k 2^{i_k}$ و بالآخر.

إذا كان عدد الكرات الموزعة يزيد على عدد الصناديق بواحد، فإنه ينتج من مبدأ برج الحمام أنه يوجد صندوق يحتوي على كرتين على الأقل. المبرهنة التالية تعطينا تعميماً بسيطاً لهذه النتيجة.

مبرهنة (٢،٥)

إذا كانت m_1, m_2, \dots, m_n أعداداً صحيحة موجبة و وزعنا $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ كرة على n صندوقاً، فإنه إما أن يحتوي الصندوق الأول على m_1 كرة على الأقل، أو أن يحتوي الصندوق الثاني على m_2 كرة على الأقل، ...، أو أن يحتوي الصندوق رقم n على m_n كرة على الأقل.

البرهان:

نفرض أن الصندوق رقم k يحتوي على $m_k - 1$ كرة على الأكثر، لكل $k = 1, 2, \dots, n$. إذاً يكون عدد الكرات أصغر من أو يساوي

$$(m_1 - 1) + (m_2 - 1) + \dots + (m_n - 1) = m_1 + m_2 + \dots + m_n - n$$

■ $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ وهذا ينافي أن عدد الكرات يساوي

مثال (٥، ٢)

إذا كانت $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n^2+1}$ متتالية من الأعداد الحقيقة المختلفة، فإنه توجد متتالية جزئية متزايدة طولها $n+1$ أو توجد متتالية جزئية متناقصة طولها $n+1$.

البرهان

لكل $1 \leq i \leq n^2 + 1$ نفرض أن t_i طول أطول متتالية جزئية متزايدة تبدأ بالعدد a_i . إذا كان أي t_i أكبر من أو يساوي $n+1$ فإننا نحصل على المطلوب. لذلك نفرض أن $n \leq t_i \leq n^2 + 1$ للكل i . إذاً يكون لدينا $n^2 + 1$ كرة (الأعداد t_i) نريد توزيعها على n صندوقاً (الأعداد $n, 1, 2, \dots, n^2 + 1$). بتطبيق مبدأ برج الحمام نجد أنه يوجد صندوق يحتوي على $\left\lfloor \frac{n^2+1-1}{n} \right\rfloor + 1 = n+1$ كرة على الأقل. أي، يوجد على الأقل $n+1$ من الأعداد t_i بحيث تكون متساوية. سنتثبت أن الأعداد a_i المصاحبة لهذه الأعداد t_i تكون متتالية جزئية متناقصة. نفرض أن $t_j < t_i$ حيث $j < i$. سنتثبت أن $a_j > a_i$. إذا كان $a_i \leq a_j$ فإن $a_j > a_i$ لأن حدود المتتالية المعطاة مختلفة. إذاً المتتالية الجزئية المكونة

من a متبوعاً بأطول متتالية جزئية تبدأ بالعدد t_j تعطينا متتالية جزئية متزايدة طولها t_{j+1} . إذا $t_i \geq t_j + 1$ ، وهذا ينافي أن $t_i = t_j$.

(١،٥) تمارين

١- نقول إن A نقطة شبكية عندما تكون إحداثياتها أعداداً صحيحة.

(أ) إذا كانت $A_i, i = 1, 2, 3, 4, 5$ خمس نقاط شبكية مختلفة في المستوى،

فأثبتت أنه توجد بينها نقطتان بحيث تكون نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي تصلهما شبكية.

(ب) إذا كانت $A_i, i = 1, 2, \dots, 9$ تسعة نقاط شبكية مختلفة في الفضاء

R^3 ، فأثبتت أنه توجد بينها نقطتان بحيث تكون نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي تصلهما شبكية.

٢- أثبتت أنه إذا رتب الأعداد $1, 2, \dots, 36$ عشوائياً بشكل دائري، فإنه توجد ثلاثة

أعداد متعاقبة بحيث يكون مجموعها أكبر من أو يساوي 56.

٣- تم تشغيل جهاز تكييف لمدة 300 ساعة خلال فترة امتدت 15 يوماً. أثبتت أنه

توجد ثلاثة أيام متعاقبة شغل خلالها الجهاز لمدة 60 ساعة على الأقل.

٤- عمل سائق سيارة لمدة 81 ساعة خلال فترة عشرة أيام. أثبتت أنه يوجد يومان متتاليان عمل خاللهاهما السائق 17 ساعة على الأقل.

٥- تدرب لاعب شطرنج لمدة 77 يوماً. و كان يلعب مباراة واحدة في اليوم على الأقل، لكنه لم يلعب أكثر من 132 مباراة طوال فترة التدريب. أثبتت أنه توجد أيام متتالية خاض خلالها اللاعب 21 مباراة بالضبط.

٦- إذا كان $G = (V, E)$ رسمياً (بسطأً متهيأً) بحيث $2 \leq |V|$ ، فأثبتت أنه يوجد رأسان $x, y \in V$ بحيث $\deg(x) = \deg(y)$.

٧- إذا كانت C_{10} دورة في رسم ما ، و إذا عنونت رؤوسها عشوائياً بالأعداد $1, 2, 3, \dots, 10$ ، فأثبتت أنه توجد 3 رؤوس متتالية بحيث يكون مجموع عناوينها أكبر من أو يساوي 17.

٨- إذا كانت A_1, A_2, \dots, A_{2n} نقاطاً في المستوى بحيث $2 \geq n$ ، و إذا كانت أي ثلاثة منها غير متسامة (أي، لا يمر بها مستقيم) ، و إذا كانت $n^2 + 1$ من القطع المستقيمة تصل بين هذه النقاط، فأثبتت أن الشكل يحتوي على مثلث. [إرشاد: استخدم الاستقراء الرياضي على n و مبدأ برج الحمام]

٩- إذا صبغت أضلاع الرسم الناتم K_6 باللونين الأحمر والأزرق ، فأثبتت أنه توجد دورة ثلاثية بحيث يكون لأضلاعها اللون عينه.

١٠ - إذا كان f تبديلاً ينتمي إلى زمرة التناظر (S_n) ، فأثبت أنه يوجد عدوان صحيحان موجبان j, i بحيث $f^j = f^i$ ، ثم استنتج أنه يوجد عدد صحيح موجب k بحيث f^k يساوي التبديل المحايد.

١١ - إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً ، فأثبت أنه يوجد عدد صحيح موجب m يقبل القسمة على n بدون باقٍ و يحتوي تمثيله العشري على الرقمين 7,0 فقط.

١٢ - لتكن $a_m, a_1, a_2, \dots, a_n$ متتالية من الأعداد الصحيحة الموجبة بحيث تحتوي بالضبط على n من الحدود المختلفة. إذا كان $m \geq 2^n$ ، فأثبت أنه توجد متتالية جزئية حدودها متعاقبة في المتتالية الأصلية بحيث يكون حاصل ضرب حدودها مربعاً كاملاً.

١٣ - إذا كانت $a_1, a_2, \dots, a_{mn+1}$ متتالية من الأعداد المختلفة ، فأثبت أنه إما توجد متتالية جزئية متزايدة عدد حدودها $n+1$ أو توجد متتالية جزئية متناقصة عدد حدودها $m+1$.

١٤ - لتكن $a_1, a_2, \dots, a_{mn+1}$ متتالية من الأعداد الصحيحة الموجبة بحيث $m+1 < a_1 < a_2 < \dots < a_{mn+1}$. أثبت أنه إما توجد متتالية جزئية عدد حدودها أي حد من حدودها لا يقسم أي حد آخر أو توجد متتالية جزئية عدد حدودها $n+1$ بحيث يقسم كل حد من حدودها الحد الذي يليه.

١٥ - مثلث متطابق الأضلاع، طول ضلعه 2 سم. ما هو أكبر عدد من النقاط التي يمكن اختيارها من بين النقاط التي تقع داخل المثلث وعلى أضلاعه بحيث تكون المسافة بين كل زوج من النقاط المختارة أكبر من 1 سم؟


١٦ - مربع طول ضلعه 2 سم. ما هو أكبر عدد من النقاط التي يمكن اختيارها من بين النقاط التي تقع داخل المربع وعلى أضلاعه بحيث تكون المسافة بين كل زوج من النقاط المختارة أكبر من $\sqrt{2}$ سم؟

١٧ - لتكن $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\} \subset \mathbb{Z}^+$ مجموعة مؤلفة من 6 أعداد صحيحة موجبة مختلفة بحيث $\max(A) \leq 14$. لكل $X \subseteq A$ ، $\max(X) \in \phi$ ، نجد مجموع الأعداد المنتمية إلى X . أثبتت أن الأعداد الناتجة لا يمكن أن تكون مختلفة.


١٨ - لتكن $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \subset \mathbb{Z}^+$ مجموعة مؤلفة من 5 أعداد صحيحة موجبة مختلفة بحيث $\max(A) \leq 9$. لكل $X \subseteq A$ ، $\max(X) \in \phi$ ، نجد مجموع الأعداد المنتمية إلى X . أثبتت أن الأعداد الناتجة لا يمكن أن تكون مختلفة.

(٢،٥) أعداد رمزي

إذا صبغت أضلاع الرسم التام K_6 باللونين الأحمر والأزرق، فإنه يمكن استخدام مبدأ برج الحمام لإثبات أنه توجد دورة ثلاثة أحادية اللون. في الحقيقة، نختار أي رأس v في K_6 فيكون $\deg(v) = 5$. إذا لدينا 5 كرات (الأضلاع الساقطة على v) نريد توزيعها على صندوقين (اللونين الأحمر والأزرق). ينتج من مبدأ برج الحمام أنه يوجد على الأقل $3 = \left\lceil \frac{5-1}{2} \right\rceil$ أضلاع أحادية اللون ساقطة على v . أي، توجد ثلاثة أضلاع، ولتكن $\{v,a\}, \{v,b\}, \{v,c\}$ ، لها اللون عينه، وليكن الأحمر مثلاً. الآن، إذا كان أحد أضلاع الدورة الثلاثية التي رؤوسها a, b, c مصبوغاً باللون الأحمر فإننا نحصل على مثلث أحمر و إلا فإننا نحصل على مثلث أزرق. نلاحظ أنه يمكن صبغ أضلاع كل من K_4 و K_5 باللونين الأحمر والأزرق بحيث لا نحصل على أي مثلث أحادي اللون. على سبيل المثال، إذا مثلنا اللون الأحمر بخط متصل واللون الأزرق بخط متقطع فإن كلاً من الرسمين التاليين لا يحتوي على أي مثلث أحادي اللون.



K_4



K_5

كما نلاحظ أنه إذا صبغنا أضلاع K_n بلونين، فإنه لكل $n \geq 6$ لا بد أن يحتوي K_n على مثلث أحادي اللون؛ لأن K_6 يحتوي على نسخة من K_6 لكل $n \geq 6$.

مما سبق ينتج أنه إذا صبغنا أضلاع K_n بلونين، فإن أصغر عدد n يضمن لنا احتواء K_n على مثلث أحادي اللون يساوي 6. ونقول إن العدد 6 له خاصية رمزي من النوع (3,3) والعدد 5 ليس له هذه الخاصية كما نقول إن العدد 6 أحد أعداد رمزي. وأكثر تحديداً نقول إن 6 هو عدد رمزي من النوع (3,3) ونكتب $R(3,3) = 6$.

تعريف (٥،١)

لتكن i, j, m أعداداً صحيحة موجبة بحيث $2 \leq j \leq i$. نقول إن m له خاصية رمزي من النوع (j, i) إذا تحقق ما يلي: كلما صبغنا أضلاع K_m باللونين الأحمر والأزرق، فإنه إما أن يحتوي K_m على K_i أحمر اللون أو على K_j أزرق اللون.

تعريف (٥،٢)

ليكن j, i عددين صحيحين موجبين بحيث $2 \leq j \leq i$. يسمى أصغر عدد صحيح موجب له خاصية رمزي من النوع (j, i) بعدد رمزي من النوع (j, i) ويرمز له بالرمز $R(i, j)$.

نهدف الآن إلى إثبات أن العدد $R(i, j)$ موجود لكل $i \geq 2$ و $j \geq 2$ ، و سنصل إلى ذلك عبر النتائج التالية.

تمهيدية (١، ٥)

(أ) إذا كان n له خاصة رمزي من النوع (i, j) و كان $m > n$ ، فإن m له خاصة رمزي من النوع (i, j) .

(ب) إذا كان n ليس له خاصة رمزي من النوع (j, i) و كان $m < n$ ، فإن m ليس له خاصة رمزي من النوع (i, j) .

(ج) إذا كان $k \geq i$ و وجد $R(i, j) \geq R(k, j)$ ، فإن $R(i, j) = R(j, i)$

(د) $R(i, j) = R(j, i)$ كلما وجد $R(i, j) \geq R(k, j)$ و $k \geq i$.

(هـ) $R(2, k) = 2$ لكل $k \geq 2$.

البرهان: نترك البرهان كتمرين بسيط للقارئ.

تمهيدية (٢، ٥)

إذا كان j, i عددين صحيحين بحيث $j \geq 3$ و $i \geq 3$ و وجد $R(i, j - 1)$ موجود و يحقق

$$R(i, j) \leq R(i, j - 1) + R(i - 1, j)$$

البرهان:

ضع (j) $n = R(i, j - 1) + R(i - 1, j)$. يكفي أن نثبت أن n له خاصية رمزي من النوع (i, j) . اصبع كل ضلع في K_n إما باللون الأحمر أو باللون الأزرق، وافرض أن v أحد رؤوس K_n . عرف مجموعتي الرؤوس المنفصلتين D و F كما يلي:
إذا كان الضلع $\{v, x\}$ أحمر اللون و $x \in F$ فإذا كان الضلع $\{v, x\}$ أزرق اللون. و بال التالي فإن

$$|D| + |E| = |D \cup E| = n - 1 = R(i, j - 1) + R(i - 1, j) - 2 + 1$$

إذًا، بتطبيق البرهنة (٢، ٥)، ينتج أنه إما أن يكون $|D| \geq R(i, j - 1)$ أو $|F| \geq R(i - 1, j)$.

افرض أن $|D| \geq R(i, j - 1)$ [البرهان مشابه في الحالة الأخرى]. إذًا، يحتوي K_m على K_{j-1} أحمر اللون أو على K_{j-1} أزرق اللون. ومن $m < n$ ، ينتج أن K_n يحتوي على K_i أحمر اللون أو على K_{j-1} أزرق اللون. في الحالة الثانية، يحتوي K_n على الرسم التام $K_{j-1} + v$ الذي هو أزرق اللون. إذًا، n له خاصية رمزي من النوع (i, j) ■

إن النتيجة المباشرة لمبرهنة رمزي التالية هي أن عدد رمزي $R(i, j)$ موجود لكل $i \geq 2$ و $j \geq 2$.

مبرهنة (٣، ٥) (مبرهنة رمزي)

إذا كان j, i عددين صحيحين بحيث $i \geq j \geq 2$ ، فإنه يوجد عدد صحيح موجب له خاصية رمزي من النوع (i, j) .

البرهان:

نستخدم الاستقراء الرياضي على n حيث $n = i + j$. من التمهيدية (١، ٥) ينتج أن $R(3,2) = R(2,3) = R(2,2) = 2$ ، و بالتالي فإن المطلوب صحيح عندما $n = 4$.
الآن نفرض أن المطلوب صحيح عند n و ثبت صحته عند $n+1$. افرض أن $n+1 = i + j$. إذا ، $i + (j-1) + n = n$ و من فرضية الاستقراء ينتج أنه يوجد عدد صحيح موجب له خاصية رمزي من النوع $(j-1, i)$ كما يوجد عدد صحيح موجب له خاصية رمزي من النوع $(i-1, j)$. و بالتالي، فإن كلاً من $R(i-1, j)$ و $R(j-1, i)$ موجود. الآن، بتطبيق التمهيدية (٢، ٥)، نجد أن (j, i) موجود؛ أي
■ $n+1$ المطلوب صحيح عند

في بداية هذا البند، استخدمنا تلويثات أضلاع K_m لتعريف خواص رمزي.
ولغرض تعميم و تطوير الأفكار السابقة، فإن تعريف خاصية رمزي من نوع ما يصاغ بلغة المجموعات على النحو التالي.

تعريف (٣، ٥)

لتكن m, i, j أعداداً صحيحة موجبة بحيث $j \geq 2$ و $i \geq 2$. نقول إن m له خاصية رمزي من النوع (j, i) إذا تحقق ما يلي: إذا كانت V مجموعة عدد عناصرها m ، وكانت $P = \{X, Y\}$ تجزئة لمجموعة المجموعات الجزئية من V التي عدد عناصر كل منها 2 ؛ فإنه إما أن توجد مجموعة جزئية I من V بحيث عدد عناصر I يساوي i و بحيث تكون مجموعة المجموعات الجزئية من I التي

عدد عناصر كل منها 2 محتواة في X ، أو أن توجد مجموعة جزئية J من V بحيث عدد عناصر J يساوي j و بحيث تكون مجموعة المجموعات الجزئية من J التي عدد عناصر كل منها 2 محتواة في Y .

وبناءً على ما سبق، نرمز لعدد رمزي من النوع $(i, j; 2)$ بالرمز $R(i, j; 2)$ و بهدف التعميم، لتكن i_1, i_2, \dots, i_n, k أعداداً صحيحة موجبة بحيث $i_j \geq k$ و $n \geq 2$ لكل $j = 1, 2, \dots, n$. نقول إن العدد الصحيح الموجب له خاصية رمزي من النوع $(i_1, i_2, \dots, i_n; k)$ إذا تحقق ما يلي: إذا كانت V مجموعة عد عناصرها m ، وكانت $P = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ تجزئة لمجموعة المجموعات الجزئية من V التي عدد عناصر كل منها k ؛ فإنه يوجد r بحيث توجد مجموعة جزئية I_r من V بحيث عدد عناصر I_r يساوي i_r و بحيث تكون مجموعة المجموعات الجزئية من I_r التي عدد عناصر كل منها k محتواة في X_r . و يرمز $R(i_1, i_2, \dots, i_n; k)$ بالرمز $R(i_1, i_2, \dots, i_n; k)$. و يمكن العودة إلى المراجع للاطلاع على البراهين التي تبين وجود هذه الأعداد، و سنكتفي هنا بعرض الحالة البسيطة التي تجعلنا نلاحظ أن نظرية رمزي تعميم عميق لمبدأ برج الحمام.

مبرهنة(٤،٥)

$$R(i_1, i_2, \dots, i_n; 1) = i_1 + i_2 + \dots + i_n - (n - 1)$$

البرهان:

ضع $m = i_1 + i_2 + \dots + i_n - (n-1) = i_1 + i_2 + \dots + i_n - n + 1$. سنتثبت أولاً أن m له خاصية رمزي من النوع $(i_1, i_2, \dots, i_n; 1)$. لتكن V مجموعة عدد عناصرها m و لتكن $P = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ تجزئة لمجموعة المجموعات الجزئية من V التي عدد عناصر كل منها 1. بالاستناد إلى البرهنة (٢، ٥) نجد أنه يوجد Z بحيث $|X_j| \geq i_j$. إذا، X_j تحتوي على مجموعات جزئية عدد عناصر كل منها i_j ، وباختيار أي من هذه المجموعات الجزئية على أنها I_j ، نستنتج أن m له الخاصة المطلوبة. إذا، $R(i_1, i_2, \dots, i_n; 1) \leq m$. وللحصول على المساواة ثبت أن ليس له خاصية رمزي من النوع $(i_1, i_2, \dots, i_n; 1)$. في الحقيقة، إن V كانت $m-1 = i_1 + \dots + i_n = (i_1 - 1) + \dots + (i_n - 1)$ عناصرها $m-1$ ، و كانت $P = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ تجزئة لمجموعة المجموعات الجزئية من V التي عدد عناصر كل منها 1 بحيث تحقق $|X_j| = i_j$ لكل $j = 1, 2, \dots, n$ فإنه لا توجد X_j بحيث تحتوي على مجموعة جزئية I_j عدد عناصرها i_j .

ونهي هذا البند بالإشارة إلى أن هناك بعض النتائج التي تعطي حدوداً علياً أو حدوداً سفلية لأعداد رمزي. ولكن حساب هذه الأعداد أمر في غاية الصعوبة، كما أن المعروف منها قليل جداً.

تمارين (٢، ٥)

- أثبت التمهيدية (١، ٥).

- إذا كان $i \geq k, j \geq k$ فأثبت أن

$$R(k, j; k) = j \quad (ب)$$

$$R(i, k; k) = i \quad (أ)$$

- ليكن j, i عددين صحيحين بحيث $j \geq 3, i \geq 3$. إذا كان كل من $R(i, j-1)$ و $R(i-1, j)$ عدداً زوجياً، فأثبت أن


$$R(i, j) \leq R(i, j-1) + R(i-1, j) - 1$$

- أثبت أن $R(3, 4) = 9$ كنتيجة لما يلي :

(أ) استخدم التمارين ٣ لبيان أن $R(3, 4) \leq 9$

(ب) أصبغ الرسم أدناه باللون الأحمر وبقية أضلاع الرسم K_8 باللون الأزرق،

ثم استنتج أن العدد 8 ليس له خاصية رمزي من النوع (٣, ٤).



٥- أثبتت أن $R(3, 5) = 14$ كنتيجة لما يلي :

(أ) استخدم التمهيدية (٢، ٥)، التمهيدية (١، ٥)(هـ)، و التمرين ٤ لبيان أن

$$R(3, 5) \leq 14$$

(ب) أثبتت أن العدد 13 ليس له خاصة رمزي من النوع (3,5)، و ذلك

باستخدام التلوين التالي للأضلاع K_{13} . لتكن $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{13}\}$ هي مجموعة رؤوس K_{13} . لكل $13 \leq j, i, 1 \leq i \leq j$ اصبح الصلع $\{v_i, v_j\}$ باللون الأحمر إذا كان $|j - i|$ يساوي 1، 5، 8 أو 12 واصبح الأضلاع المتبقية باللون الأزرق.

٦- إذا كان j, i عددين صحيحين بحيث $j \geq 2, i \geq 2$. فأثبت أن

$$R(i, j) \leq \binom{i+j-2}{i-1}$$

دليل المصطلحات

Bell numbers	أعداد بل
Ramsey's numbers	أعداد رمزي
Catalan numbers	أعداد كتلان
Stirling numbers of the second kind	أعداد ستيرلنج من النوع الثاني
Convolution	التفاف
Permutation	تبديل
Derangement	تبديل تام
Partitions of positive integers	تجزئات الأعداد الصحيحة
Partitions of sets	تجزئات المجموعات
Edge coloring	تلوبن الأضلاع
Combination	توفيق أو تركيب
Generating function	الدالة المولدة

Exponential generating function	--- الأسيّة
Ordinary generating function	--- العاديّة
Order of a recurrence relation	رتبة علاقّة ارتّداديّة
Complete graph	رسم تام
Closed formula	صيغة مختصرة
Ferrers diagram	شكل فيرير
Recurrence relation	علاقّة ارتّداديّة
Linear recurrence relation	--- خطّية
Homogeneous recurrence relation	--- متّجانية
Pigeonhole principle	مبدأ برج الحمام
The inclusion-exclusion principle	مبدأ التضمين و الاقصاء
Superposition principle	مبدأ التراكب
The rule of sum	مبدأ المجموع
The rule of product	مبدأ حاصل الضرب
The rule of correspondence	مبدأ التقابل
Sequence	متّالية

Triangulation	مثالية
Multiset	مجموعة مضاعفة
Binomial theorem	مبرهنة ذات الحدين
Pascal's identity	متطابقة باسكال
Binomial series	متسلسلة ذات الحدين
Formal power series	متسلسلة قوى شكلية
Generalized binomial coefficients	معاملات ذات الحدين العممة
Multinomial theorem	مبرهنة متعددة الحدود
Transpose	منقول
The sample model of counting	نموذج العينة للعد
The distribution model of counting	نموذج التوزيع للعد

المراجع

المراجع العربية

- [1] سمحان، معروف و شراري، احمد، مبادئ الرياضيات المتقطعة. جامعة الملك سعود، ١٤١٩هـ.

المراجع الأجنبية

- [2] Biggs N. L., *Discrete Mathematics*. University press, Oxford, 1987.
- [3] Michaels J. G. and Rosen K. H., *Applications of Discrete Mathematics*. McGraw-Hill, Inc., International Edition 1992.
- [4] Roberts F. S., *Applied Combinatorics*. Prentice-Hall, 1984.
- [5] Stanley R. P., *Enumerative Combinatorics , Volume I*. Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books and Software, Monterey, California, 1986.
- [6] Townsend M., *Discrete Mathematics: Applied Combinatorics and Graph Theory*, The Benjamin/Cummings, California, 1987.
- [7] Tuker A., *Applied Combinatorics*. John Wiley and Sons, 1980.