






الكيمياء


اكتشف التأثير العجيب للكيمياء على كل جوانب حياتنا، وسر أهميتها البالغة لمستقبل البشرية





مشاهدات علمية

الكيمياء





البروم: أحد العناصر
اللافلزية

من الممكن أن يلطف مرهم
قلوي من أثر الحمض الذي
يوجد في لدغة النحلة




مشاهدات علمية

الكيمياء

تأليف: د. أن نيومارك



تساهم جزيئات الفواكه الحمضية
في إكسابها رائحتها



برمجنات البوتاسيوم
أثناء ذوبانها في الماء



قحف مصري محنط



ملحان فلزيان مشتقان
من عنصر النحاس






يستخدم جل السليكا في وعاء التجفيف
لإزالة الرطوبة



نموذج للتركيب
الجزيئي لحمض
الطريك (1914)



تصور لشكل الذرة في
بداية القرن العشرين


استخدم الزعفران والكرم لتلوين
الأظعمة والأقمشة منذ القدم




تفاعل الترسيب حيث
يضاف يوديد البوتاسيوم
إلى نترات الرصاص



جهاز كيب لتحضير
كبريتيد الهيدروجين



رواسب لواند مع
كبريتيد الهيدروجين



المحتويات




44	تكوين الأملاح
46	الكهرباء والكيمياء
48	كيمياء الكربون
50	كيمياء الحياة
52	التخليق العضوي
54	أولى المواد البلاستيكية
56	صناعة المواد المخلقة
58	قصة التحليل الكيميائي
60	مراقبة المواد
62	الصناعات الكيميائية
64	هل تعلم؟
66	الخط الزمني
68	اكتشف المزيد
70	المصطلحات
72	الكشاف

6	ما الكيمياء؟
8	الكيمياء في الطبيعة
10	الكيمياء في العوالم القديمة
12	الكيميائيون الأوائل
14	دراسة المخاليط
16	الذرات والجزيئات
18	العناصر
20	دراسة المركبات
22	الجدول الدوري
24	نظرة على الفلزات
26	اكتشاف اللافلزات
28	نظرة على الهواء
30	تفاعلات الاحتراق
32	الغازات الخاملة
34	التفاعلات الكيميائية
36	ما الذي يحدث التفاعل الكيميائي؟
38	معدلات التفاعل
40	التأكسد والاختزال
42	الأحماض والقواعد



مفصل
اصطناعي
للورك من
البلاستيك
للجراحة
التعويضية

عينات أولية من ألياف
الحزير الصناعي



ميكروسكوب جوزيف
بريستلي (1767)

اسم السلسلة: مشاهدات علمية
العنوان: الكيمياء
تأليف: د. أن نيومارك
ترجمة: أ.د. ليلى سعدو بالومال
كلية العلوم - جامعة القاهرة
إشراف عام: ذاليا محمد إبراهيم



'A Dorling Kindersley Book'
www.dk.com


Original Title : Eyewitness Guides: Chemistry
Copyright © 1993, 2005 Dorling Kindersley Limited.
Published by arrangement with Dorling Kindersley Limited,
80 Strand, London WC2R0RI..

ترجمة كتاب Chemistry
تصدرها شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
بترخيص من DK

يحظر طبع أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب سواء النص أو الصور
بأية وسيلة من وسائل تسجيل البيانات، إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.



نهضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع
أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1998



نموذج مبسط للحمض النووي الريبي
منقوص الأكسجين (دي. إن. إيه)



إيديومتر زجاجي لقياس نقاء
الهواء (حوالي 1820)

الطبعة 1: يوليو 2007

رقم الإيداع: 2007/16010

الترقيم الدولي: 4-3946-14-977

فرع الإسكندرية: 408 طريق الحرية - رشدي
تليفون: 03 5462090
فرع المنصورة: 13 شارع المستشفى الدولي التخصصي - متفرع
من شارع عبد السلام عارف - مدينة السلام
تليفون: 050 2221866

Website: www.nahdetmisr.com

مركز التوزيع: 18 شارع كامل صدقي - الفيالة - القاهرة
تليفون: 02 25908895 - 25909827
فاكس: 02 25903395

E-mail: publishing@nahdetmisr.com — customerservice@nahdetmisr.com

المركز الرئيسي: 80 المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة 6 أكتوبر
تليفون: 02 38330287 - 38330289
فاكس: 02 38330296

الإدارة العامة: 21 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة
تليفون: 02 33472864 - 33466434
فاكس: 02 33462576



بدائل الغذاء

تستخدم الكيمياء بتوسع في الصناعات الغذائية لتصنيع أغذية جديدة مناسبة وللكشف عن وجود شوائب (ص 60-61).
ويُعرف الزبد بأنه من الدهون المشبعة بينما تشكل معظم الزيوت النباتية التي توجد عادة في الحالة السائلة دهونا متعددة عدمية التشبع.
ويمكن تحويلها إلى الحالة الصلبة مثل المارجرين عن طريق عملية كيميائية تسمى الهدرجة - أي إضافة الهيدروجين للزيوت باستخدام عامل مساعد (ص 36-37) مثل النيكل. وعملية الهدرجة تجعل الزيت أكثر شبهاً بالزبد وأكثر سهولة عند فركه على الخبز. وقد صنع المارجرين لأول مرة في ستينيات القرن التاسع عشر في فرنسا كبديل رخيص للزبد.

ممارسة قديمة

إن التقطير فن عتيق. وهو عبارة عن أسلوب لفصل مكونات خليط ما (ص 14، 15) من خلال الغلي والتكثيف. ويمكن استخدامه في تحضير الزيوت العطرية ذات الاستخدام الطبي.



ملفات نحاسية حيث يتكثف البخار بها

أنبوب توصيل

تقطير المخاليط

تم تطوير أنواع كثيرة ومختلفة من التقطير من أجل تقطير المخاليط. وعند تسخين الخليط فإن المواد ذات درجات الغليان الأقل تبخر أولاً. ثم يبرد البخار المنبعث على نسبة أكبر من الكحول في المكثف بينما تتخلف البقايا.

يحيطد القرميد بهيكل الفرن

واقود تبريد خشبي



الكيمائيات ككاشفات

يُمتص الكحول في الدم، ومنه ينتقل إلى الهواء الذي يطرد أثناء الزفير، ويحتوي جهاز تحليل النفس المين الذي يعمل بالنفخ في الكيس على مادة كيميائية صفراء في قطعة الفم تتحول إلى اللون الأخضر عندما تتفاعل مع الكحول الموجود في النفس؛ مما يتيح للشرطة التأكد من مستويات الكحول في دم السائق الذي قد يفقد سيارته محموراً بما يشكل خطورة على الآخرين.

بمبدأ كيس من البلاستيك بهواء من الرقبتين

فوهة

وعاء من الصلب

زجاجة تحتوي على حمض الكبريتيك تفكسر الزجاجاة بواسطة السدادة عندما يقلب الوعاء

الصمام

نموذج للمقطر المزجلى

يتصاعد البخار خلال العنق

المقطر النحاسي حيث يسخن الخليط

محلول من بيكرينات الصوديوم في الأسطوانة

يتفاعل الحامض مع بيكرينات الصوديوم لينتج غاز ثاني أكسيد الكربون

صنبور للتخلص من البقايا


مطفأة الحريق

يؤدي التفاعل الكيميائي إلى اندفاع محلول مائي خارج فوهة مطفأة الحريق المينة. وينبغي الحفاظ على المادتين المتفاعلتين - حمض وقاعدة - (ص 42-43) منفصلتين حتى تظهر الحاجة لاستخدام المطفأة. وعندما تختلط المادتان معاً ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون مما يدفع الماء خارج الأسطوانة.

كيمائى أم فيزيائى؟

ليست كل التغيرات كيميائية. فعندما ينصهر الجليد ليكون الماء أو عندما يغلي الماء ليكون البخار لا يحدث تغير كيميائي ولكن الحالة الفيزيائية هي التي تتغير. ويختلف سلوك الوحدات الفردية (الجزيئات ص 16-17) في كل حالة من الحالات. وبشكل التجاذب بين الجزيئات تركيبياً قوى الترابط في المادة الصلبة. وتقل قوة الترابط هذه في المادة السائلة نظراً لانزياح الجزيئات فوق بعضها البعض. وتسبب الحرارة انطلاق الجزيئات فتقفز ويصطدم بعضها ببعض في الغاز.

باب الفرن



ما الكيمياء؟

علم الكيمياء هو علم التغير . فهو يتناول كل الأنواع المختلفة للمواد وكيف يتفاعل بعضها مع بعض . وتتم هذه التفاعلات حولنا في كل الأوقات (ص 8-9) وكذلك تجري التفاعلات الكيميائية في المعامل العلمية، وفي مجال الصناعات الكيميائية. ويستخدم البشر الكيمياء في شتى مناحي الحياة يوميًا - الطبيب والطاهي والفلاح وعامل البناء. تساهم الكيمياء في مساعدة شركات تصنيع الأغذية وكذلك المشروبات. ويستعين فني العمل في المستشفى بالكيمياء؛ للبحث عن الأمراض في عينات الدم (ص 60-61). ويُستخدم عالم





قالب الجص

الجبس شكل من أشكال كبريتات الكالسيوم المحتوى على بعض الماء في تركيبه. فإذا تعرض للتسخين فقد 75٪ من هذا الماء مما ينتج مسحوقاً من جص باريس الذي يُستخدم في هذا الشكل لتصحيح عيب في العمود الفقري.

الطب الشرعي الكيمياء لحل لغز الجرائم (ص 42-43). وفي مجال الزراعة تُستخدم الكيمياء لزيادة إنتاجية المحاصيل لمكافحة العديد من الآفات (ص 62-63). وتحافظ المواد الكيميائية على سلامة إمدادات الماء وعلى نظافة حمامات السباحة، وتعد صناعة البتروكيماويات من أكبر الصناعات في العالم، وتقتزن هذه الصناعة أساسًا بالبنزين والكيماويات التي تُشتق من النفط الخام (ص 62-63). وتُنتج الأدوية والأصبغ الصناعية والبلاستيك والمنسوجات بطرق كيميائية من المواد الخام الموجودة في الطبيعة.

مفهومنا عن الكيمياء

ترتبط النظرة الشائعة للكيمياء بأنابيب اختبار وروائح غريبة وأحلبة سيئة المظهر موجودة في المعامل. ويدرس علماء الكيمياء التفاعلات الكيميائية التي تحدث عند مزج المواد معًا لتكون مواد جديدة. وفي التفاعل المبين يُضاف حمض النيتريك إلى فلز النحاس. وينتج الغاز بني اللون (ثاني أكسيد النيتروجين المسبب للتلوث) بسرعة شديدة حتى إنه يدفع السائل للفقوران؛ فينسكب. وقد ابتكر علماء الكيمياء لغة لوصف التفاعلات الكيميائية باستخدام رموز ومعادلات معارف عليها دوليًا. ويمكن كتابة هذا التفاعل على الصورة التالية:



غاية الأمطار الحمضية

تعرضت أشجار الصنوبر هذه في بولندا للتلف الشديد من جراء الأمطار الحمضية التي تنتج عن الغازات التي تطلقها المصانع مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت. وعندما تتفاعل هذه الغازات مع الرطوبة الموجودة في الجو تكون أحماضًا مخففة ويمكن أن تحمل الرياح هذه الملوثات لبعض المسافات قبل أن تطلقها في الأمطار التي تلحق الضرر بالنباتات والبحيرات.

وينتج الماء H_2O أيضًا في التفاعل

إن غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO_2) هو غاز ملوث ينتج من أبخرة عوادم محركات السيارات

تتكون تترات النحاس الزرقاء ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$) في المحلول




رواسب الحجر الجيري تحت الأرض


تتكون الأحجار الجيرية بالدرجة الأولى من كربونات الكالسيوم الناشئة عن القواقع وهياكل بعض أنواع الحيوانات الصدفية. وعندما تنفذ مياه المطر خلال الصخور فإنها تذيب كميات قليلة من كربونات الكالسيوم. وعندما تتكون الكهوف تحت الأرض يرشح الماء من خلال أسقفها فيتبخر بعضه مرسباً الكربونات المتصلبة على السطح. وعبر آلاف السنين تنمو الرواسب لتصبح هابطة مثل الهوابط الواقعة في كهوف ولاية فلوريدا الأمريكية.

عملية الهضم

الإشريكية القولونية (إشريشيا كولاي) عبارة عن بكتيريا تسكن في أمعائنا. وتستطيع أن تحلل بعض الأطعمة التي نأكلها مثل الخضراوات الحضرء والبقول إلى عناصر غذائية مختلفة. وأثناء العملية الكيميائية تنطلق الغازات مما يتسبب في حدوث التظيل (امتلاء المعدة بالغازات) بعد وجبة من البقول، كما تنتج هذه البكتيريا أيضاً فيتامين (ك) الذي يحتاجه الجسم لكي يجعل الدم يتجلط، وتنسب هذه البكتيريا في المرض فقط في حالة ما إذا دخلت في مجرى الدم، أما في الأمعاء فهي غير ضارة.



يحتوي القشر على الزيوت العطرية



يستخرج حمض الستريك من الليمون لكي يضفي النكهة على شراب الليمونادة

البرتقال والليمون

تنتج رائحة الليمون جزئياً عن الليمونين وهو زيت أساسي في قشره، وتعطي هذه المجموعة من المركبات العضوية اللون والرائحة للعديد من النباتات. ولتركيب الليمونين صورة مرآوية (ص 48) توجد في قشر البرتقال. وتحتوي كل الحمضيات على حمض الستريك (ص 42، 43) مما يضفي عليها الطعم اللاذع، وهناك تركيز أكبر لحمض الستريك في الليمون عنه في البرتقال.

يعطي الكاروتين اللون البرتقالي



تنشأ نكهة البرتقال من مئات المركبات

تحاكي تغيرات القتامين في الجلد ألوان فرع الشجرة

التمويه الكيميائي

تستطيع الخرباء مثلها مثل الأخطبوط والحبار والصبيدج أن تغير لون جلدها لكي تتخفى من فريستها. والمركب الكيميائي الرئيسي المسؤول عن ذلك هو القتامين الذي يساعد أيضاً على اسمرار الجلد البشري عند تعرضه للشمس. ويمكن أن تنشط خلايا الخرباء المنتجة للقتامين عن طريق الخوف أو الغضب وعندئذ تنتشر حبيبات القتامين فتنتج ألواناً تتعد من الأصفر إلى البني والأسود، وتحتج لون الخرباء الطبيعي. وعندما يتجمع القتامين مرة أخرى يعود للخرباء لونها الأخضر الأصلي وتستطيع بعض الخرباء أن تغير لون جلدها إلى الأزرق والأحمر الساطع.

الكيمياء فى الطبيعة

لطالما كان التغير الكيميائى جزءاً من الكون حتى قبل وجود الإنسان، وبالفعل يعتقد بعض العلماء أن الحياة قد بدأت على الأرض نتيجة لتكاثر بعض الكيماويات المعقدة عبر مليارات السنين. والكيمياء من العلوم الطبيعية، وهى تقع فيما بين علوم الحياة؛ إذ تساعد على تفسير العديد من العمليات الحيوية (ص 50-51) وقوانين الفيزياء التى تشمل المادة والطاقة. وتحدث العمليات الكيميائية باستمرار داخلنا - فعندما تتحرك أجسامنا تحدث سلسلة من التفاعلات الكيميائية؛ لكى تعطى العضلات الطاقة المستمدة من الغذاء. وتستخدم أنواع عديدة من الحيوانات الكيمياء للدفاع عن أنفسها ولقتل فرائسها ولبناء تركيبات هشة وإن كانت ذات قوة مذهلة. وقد أدت طرق التحليل الكيميائى الحديثة إلى فهم أعمق لكيمياء الطبيعة بحيث يمكن التعرف على المركبات الكيميائية (ص 20-21) التى تنتج لون وطعم ورائحة زهرة ما أو فاكهة ما.



أقوى من الفولان

تصنع حشرة عنكبوت الحديقة المينة شبكتها من خيوط حريرية رقيقة من البروتين. ومن المثير للدهشة أن خيط البروتين هذا أقوى من خيط من الصلب بمائته فى السمك. ويستطيع العنكبوت أن يغير صفات الخيط - فهناك الخيوط الجافة المتماصة من أجل اليرمق (شعاع الدولاب) وخيوط أخرى لزجة لاصطياد الفريسة.

قليل أحمر
حار

الكيماويات السامة

يقوم هذا الثعبان بحقن فريسته بالسم من خلال أنياب أو أسنان مجوفة. وينتج هذا السم فى غدد خاصة تقع خلف القم وهو عبارة عن بروتين يهاجم الدورة الدموية للصحية مسبباً التورم والنزيف. وسم الثعبان لا يكون ساماً عند بلعه؛ لأن الجهاز الهضمي يستطيع أن يكسر البروتينات.



أفعى الثعبان

الإحساس بالحرق

ينتج إحساس الحرق الذى ينتاب من يأكل الفلفل الحار عن المركب العضوي الكبيسين؛ مما يساعد على الهضم عن طريق إطلاق إنتاج اللعاب. ويساعد أيضاً على التخلص من فضلات الجسم. ويوجد الكبيسين أيضاً فى تابل البابريكا (الفلفل الحلو).



الروائح الكيميائية

ينتج طعم الفواكه ورائحتها عن أخلطة من عدد كبير من المركبات العضوية. وتنتج رائحة نوت العليق القطوف لونه جزئياً عن كيتون (نوع من المركبات العضوية) يطلق عليه اسم أيونون. ويوجد هذا الكيتون نفسه فى الحشيش المخزوز حديثاً مما يفسر تشابه الرائحتين. ويستخدم الأيونون لإضفاء رائحة شبيهة برائحة نوت العليق على الأطعمة مثل زبادى الثوت الأحمر ذى النكهة الصناعية.

توت العليق

ويحتوى الزيت الأساسى المشتق من زهور البنفسج أيضاً على مركب الأيونون الذى ينتج صناعياً لكى يُستخدم للحصول على النكهات.



أوراق نبات
القراص أيضاً
تحدث اللسع

يحتوى الشوك أيضاً
على حمض النمليك

الكيماويات المؤلمة

يمكن أن تسبب الأشواك الدقيقة الواقعة على ساق نبات القراص وأوراقه فى لسعة عندما تلمس جلد الإنسان. وأحد المركبات المسئولة عن ذلك هو حمض النمليك وهو أصغر الأحماض العضوية وأكثرها حمضية (ص 42-43). ويمكن أن يُطلق لسع نبات القراص بدهن الجلد بمادة قلوية (ص 42-43) كما فى حالة لسع النحل. ويوجد حمض النمليك أيضاً فى النمل اللاسع، ويحقن النمل ضحيته بسم يحتوى على حمض الفورميك.

نبات
القراص



جز الحشيش

تصنيع الزجاج

ربما تم تصنيع الزجاج لأول مرة في مصر حوالي عام 3000 قبل الميلاد عن طريق صهر الرمل والصودا معاً - لتخفيض درجة الانصهار - ومعهما الجير الذي عمل كمثبت، وبإضافة أكاسيد فلزات معينة للخليط نبع الزجاج الملون. وعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على الزجاج الأزرق بإضافة أكسيد النحاس. وقد صنعت العديد من الأواني المنزلية من الزجاج في العصور الرومانية. وقد وجدت هذه التقنية الزجاجية في مقبرة رومانية، ويعزى غشاء العنق اللؤلؤي إلى تبلور الزجاج مع مرور الزمن. ولم تتغير مواد تصنيع الزجاج الآن عما كانت عليه منذ الأزمنة القديمة إلا قليلاً (ص 44، 45).



تصنيع الجلود

كانت جلود الحيوانات تشكل مواد قيمة بالنسبة للقديما، ولكن الجلد الخام يصبح قاسياً عندما يجف. والديغ هي عملية تزويد الجلد بمواد تحافظ عليه بحيث يبقى مرناً بعد جفافه. وبعد تنظيفه ونقعه يُعالج بمستخلصات من لحاء الشجر والخشب وورق الشجر تحتوي على خليط من الأحماض الخاصة التي تسمى أحماض التنيك التي تتفاعل مع البروتين الذي يكون الجلد. وبعد تحقيقها كانت الجلود تستخدم لجميع الأغراض، على سبيل المثال حاملات للماء وأطقم للخيل وأحذية.

الرمح السوداني الحديدي

يرجع هذا الرمح الشائك المصنوع في السودان بإفريقيا إلى ثلاثينيات القرن العشرين غير أنه قد أنتج بالأسلوب نفسه لتصنيع الرماح قبل ألفي سنة. وقد كان استخراج الحديد من خاماته أصعب من استخراج النحاس أو القصدير نظراً لارتفاع درجة انصهار الحديد بالنسبة للأفران القديمة. وكان ينبغي أن تسخن المادة الخام حتى درجة الاحمرار وتعالج مرة بعد مرة للتخلص من الشوائب. وكان الكربون يُضاف في شكل الفحم إلى المادة الخام لتحسين خواص المعدن بما يجعله أكثر قابلية للشحذ بحيث يكون له حد قاطع جيد.



المصريون وتشكيل المعادن

يستخدم عمال المشغولات المعدنية المبتون في اللوحة أنابيب النفخ حتى تصبح النار بدرجة السخونة الكافية لصهر المعادن. وقد استخدم الذهب والفضة على نطاق واسع لصنع الخلى. ولكن كان هناك تفضيل للبرونز - وهو عبارة عن سبيكة من النحاس والقصدير - في تصنيع الأغراض الأخرى؛ وذلك لسهولة تصنيعه وتشكيله.

القط المحنط

أدى اعتقاد قديما المصريين بوجود حياة بعد الموت إلى حفظهم أجساد موتاهم. وكثيراً ما كانوا يحنطون الحيوانات التي كانوا يعيدونها، وتعود هذه الموصياء إلى حوالي عام 1000 قبل الميلاد. وكان الجسم يغطى في البداية بالنظرون الجفاف. وهي مادة كيميائية توجد في الطبيعة وتتكون في الأساس من صودا الغسيل. تعمل هذه المادة على امتصاص الماء من الجسم فتحفظه، وبعد أربعين يوماً كان الجسم يُنظف ويُدهن بالراتنجات العطرية ثم يلف بقطع طويلة من الكتان.

طلبت قسماً الوجه بالكحل وهو خضاب أسود يستمد من الأنتيمون (ص 12)

قطع طويلة من الكتان نسجت من خيوط الكتان

قطع مستطيلة مصبوغة

سطح طرق أثناء تصنيعه

شوكة

قصبة الرمح

الكيمياء فى العوالم القديمة



الرسم على الوجه

كثيراً ما استخدم الناس الألوان لتزيين أنفسهم وممتلكاتهم. وقد استخدم هذا المواطن الهندي الأمريكي الألوان لإضفاء هيئة الحرب على وجهه وتخويف الأعداء وإظهار مكانته.

مارست الشعوب القديمة الكيمياء للمرة الأولى بعد أن تعلموا استخدام النار. وبمجرد أن استطاعوا أن يسيطروا على النار بدأ الناس فى طبخ طعامهم وإعداد الطين لصنع الآنية الفخارية. وأدى بهم الفضول الطبيعى لمعرفة معلومات عن المواد إلى التجريب؛ فصهروا المعادن الخام للحصول على الفلزات، وعندما تأسست الجماعات البشرية اكتشف الناس أنه من الممكن أن تستخدم مواد معينة لأغراض خاصة. فقد استخدمت الخمائر لتحضير الجعة والخمر والخبز، وتم حفظ الأغذية عن طريق التمليح أو التدخين. واستخدمت عصارات من النباتات لصبغ الثياب، ووفر لحاء الشجر مواد لدبغ الجلود وصنعت مستحضرات التجميل من الصبغات والمواد الملونة. وقد استخدم الزجاج فى أول الأمر كطلاء لتلميع الخرز أو الآنية الفخارية ثم أصبح ينفخ لصنع أشكال مختلفة بحلول عام 100 قبل الميلاد. وقد حنط قدماء المصريين أمواتهم باستخدام المستحضرات الكيميائية. وقد كان للصينيين باع طويل فى الحرف الكيميائية. ولعل طلاء اللاك (اللاك) هو أقدم مادة بلاستيكية صناعية، وقد كان يستخدم فى الصين فى إطار صناعة منظمة منذ عام 1300 قبل الميلاد. وقد كانت صناعة الورق والبارود من الاكتشافات الصينية.



زخرفة من الرصاص الأحمر

زعفران من زهرة الزعفران



صبغة النيلة المستخلصة من أوراق نبات الأنديجوفيرا



الصبغات ومواد الصبغ

تلتصق الصبغات العضوية - مثل نيات الفوة والرؤسة والنيلة - كيميائياً بالمنسوجات. ويعالج القماش أحياناً بمادة كيميائية «لتهيئ» اللون - تعرف باسم المرسخ. وقد كانت الشبة (ص 12، 13) من أوائل المرسحات. وهناك أسلوب آخر للتلوين وهو استخدام الحطب أو الصبغ. وبمكثنا الحصول على العديد منها من المعادن التى تطحن على هيئة مسحوق دقيقة لى تستخدم فى مستحضرات التجميل والدهانات والأحبار.

العطر الإغريقى


الطين مادة يسهل تشكيلها، وعندما يجفف ويُخبز يفقد الماء وتحدث له تغيرات كيميائية وينتج الخزف. وقد زينت قنينة العطر المينة باستخدام الأصباغ مثل الرصاص الأحمر وهو عبارة عن أكسيد الرصاص (ص 24، 25). وكانت العطور تصنع من زيوت مستخلصة من الزهور والتوابل عن طريق تسخينها تسخيناً معتدلاً فى زيوت مثل زيت الزيتون.



كرعم

لوح المرهم

يرجع تاريخ لوح المرهم المصرى المصنوع من المرمر المين إلى حوالى عام 2000 قبل الميلاد. ويميز كل تجويف من التجاويف السبعة اسم مرهم تجميل معين. وكانت تطحن الصبغات والحطاب على هيئة مسحوق دقيقة، ثم تخلط بالزيت والعسل أو الصمغ للحصول على القوام المناسب. وقد اشتهر المصريون أيضاً باستخدامهم للعقاقير. وعلى سبيل المثال كانوا يستخدمون السامكى وزيت الخروع كمليّنات.



هذه الرموز الهيروغليفية عبارة عن أسماء مرهم

تجاويف للمخلوط والعطن

جهاز التقطير

كان التقطير أو تسخين السوائل لفصلها بشكل جزءاً هاماً من الكيمياء القديمة واقترب بها العديد من أجزاء الجهاز. ويُعتقد أن أول «جهاز تقطير» قد نشأ عن مشاهدة غطاء القدر وهو يجمع البخار المتكثف. واشتملت الأجهزة اللاحقة على المعوجة التي نشأت عن الإنبيق (انظر أسفله) ويمكن أن تصنع من الزجاج أو الفلز أو الخزف. وكان لون الزجاج أخضر أو بنيًا بسبب وجود شوائب من الحديد في الرمل.



جهاز تقطير قديم

(ص 44-45).

توضع المادة المراد تقطيرها هنا

زيوت عطرية للدواء

في العصور الوسطى كان يتم الحصول على الزيوت العطرية مثل زيت الورد عن طريق تسخين مستخلصات من النباتات في معوجة. وكان يتم تبخير الزيوت ثم تبريدها في أثناء مرورها في عنق المعوجة الطويل، لكي تتكثف في قارورة تبرد عادة عن طريق غمرها في الماء (ص 6، 7). وكان وفود الأفران عادة من القمح.

لون أخضر ناشئ عن شوائب الحديد في صناعة الزجاج القديمة

يساعد الأنبوب الطويل على تكثيف الأبخرة

رأس الإنبيق تتجمع الأبخرة المتكثفة في الإطار

إنبيق إيراني

وعاء الإنبيق

البخار المتكثف يقطر شيئاً فشيئاً من العنق الطويل

142. Papaver خشخاش قنب

XXV. Litera حرف الالف المقطع Adfsal 149.

ميراث ابن سينا

اشتقت كلمة Alchemy وتعني الكيمياء القديمة «الخيمياء» من الكلمة العربية الكيمياء al kimia بمعنى الثمن المصري. وقد انتشرت تعاليم الكيمياء القديمة من الإسكندرية بمصر وكانت لغتها العربية. وقد قام ابن سينا (980-1037) وهو فيلسوف فارسي يجمع هذا المسرد مع ترجمة باللاتينية. وتظهر به كلمات مثل «قلوي» Alkali و«إنبيق» alembic - لا تزال تشكل جزءاً من لغة الكيمياء في وقتنا الحالى.

باب لإذكاء النار بوقود الفحم



نقش من كتاب «الخيمياء»

دراسة الكيمياء

بدأ الناس في العصور الوسطى تدريس أفكار الخيميائيين. وقد تطور علم جديد عرف باسم الكيمياء الطبية على أساس الاعتقاد الذى نادى به الخيميائيون، والذي يقول بأن الجسم البشري عبارة عن نظام كيميائي من الممكن علاجه بالمواد الكيميائية. وعلى الجانب الآخر، نشر اندرياس ليبافيوس (1560-1616) أحد أوائل الكتب الكيميائية - وحمل عنوان الكيمياء «Alchymia» - وذلك في عام 1597. وقام أيضاً بتوثيق نتائج بحثية معاصرة ذات صلة بالصيدلة وعلم المعادن.

وعاء الإنبيق المصنوع من رمال العظم

الإنبيق

الإنبيق عبارة عن جهاز يُستخدم في التقطير. ويتضمن الرأس ووعاء الإنبيق (قاعدة على شكل ثمرة اليقطين) ويُعتقد أنه من اختراع ماريا اليهودية التي سمي على اسمها الحمام المائي (يان ماري) وهو مصدر قديم للحرارة المعتدلة.



فرن

ملقط معدني طويل المقبض

رموز للحفاظ على السرية

كان هناك ارتباط وثيق بين الكيمياء القديمة وعلم التنجيم وكانت الرموز المميزة للفلزات السبعة المعروفة للخيميائيين القدماء هي نفسها الرموز المميزة للأجرام السماوية السبعة المعروفة وقتذاك. وقد نشأ استخدام رموز المواد الكيميائية بسبب رغبة الخيميائيين القدماء في الحفاظ على سرية اكتشافاتهم.



الرموز الخيميائية للفلزات

الأدوات الكيميائية

استُخدمت بوتقة من رمال العظم وملقط فلزي طويل لنقل الفلزات من الفرن وسكبها في القوالب، وما زالت أدوات أخرى مما كان يستخدمها الخيميائيون واختبرون القدامى ترى في المعامل في الوقت الحالى - مثل الهاون والمدقة (ص 24، 25) والقوارير والكنوس والأقماع والمرشحات.

الكيميائيون الأوائل

بدأ الفلاسفة في وضع نظريات حول المادة في اليونان القديمة، وقد امتزجت هذه النظريات بأفكار دينية وبالمعرفة المكتسبة من الحرف الكيميائية للقدماء (ص 10، 11) مما أدى إلى ازدهار الكيمياء القديمة «الخيمياء». وكان علماء الكيمياء القديمة «الخيميائيون» يجمعون بين الأفكار الغامضة التي تهدف إلى الوصول للكمال وبين التجارب العملية. وأدى بهم الاعتقاد بإمكانية تغيير عنصر إلى آخر إلى البحث عن طرق لتغيير ما يسمى بالفلزات الخسيسة مثل الرصاص إلى الذهب الذي كان الفلز الأمثل في اعتقادهم. وقد استخدم التقطير (ص 7، 6) - وهو أسلوب ابتدعه هؤلاء الكيميائيون القدامى - لتحضير الزيوت العطرية والعطور. وفيما بعد تعلم الكيميائيون تحضير الأحماض المعدنية التي كانت أقوى بكثير من الأحماض التي كانت معروفة لديهم من قبل مثل عصائر الفاكهة. ومن خلال هذه الدراسات انبثقت نظريات طبية جديدة. ونشأ الاعتقاد بأن المرض يمثل اختلالاً في توازن النظام الكيميائي للجسم، وينبغي معالجته بالكيمياء لكي يسترد توازنه. وأصبح التعدين من الأنشطة الهامة، وتم اكتشاف فلزات جديدة وأصبح لطرق التعرف عليها أهمية بالغة، وكذلك أكتشفت طرق لفحص الفلزات وتثمينها - أي تقدير قيمتها.




نجمة الأنتيمون

عندما يبرد الأنتيمون من الحالة المنصهرة يكون أشكالاً كائنجوم. وقد اعتبر الكيميائيون القدماء أن المعادن الخسيرة على الأنتيمون مناسبة لتحويل الفلزات (أي تحويلها إلى الذهب).



أهمية علم المعادن

ومع بزوغ الأهمية الاقتصادية للتعدين ظهرت مؤلفات مثل دي رى ميتاليكا الذي كتبه جورج باور (1494 - 1555) وهو طبيب ألماني كان يكتب تحت اسم مستعار هو أجريكولا. وغطى هذا الكتاب تقنيات التعدين والصهر لتحويل المعدن الخام إلى الفلز والفحص والاختبار للكشف عن الفلزات الموجودة به.



معمل الاختبارات

كانت البوتقة إحدى الطرق الشائعة لاختبار نقاء الفلزات الثمينة، وقد أُنشئت الأفران الجديدة الأصغر حجماً لحفاظ على انتظام الحرارة على فترات زمنية طويلة. وكانت عينات الفلزات توضع في بوتقة مسامية ومعها بعض الرصاص لمساعد على انصهار الفلزات. ثم تُسخن في الفرن حتى يتحول الرصاص وجميع الفلزات - فيما عدا الذهب والفضة - إلى أكاسيد الفلزات (ص 40، 41) التي تمتصها البوتقة المصنوعة من رماد العظم فتبقى كرية الذهب النقي أو الفضة النقية لكي تُختبر باحتمال ورنها.

اختبار الفلزات

عمل إخصائيو التحليل والتحوص في اختبارات الصناعات الأولى في مناطق التعدين بأوروبا الوسطى لاختبار المعادن لمعرفة ما تحتويه من فلزات. وأصبحوا ملزمين بالعديد من التفاعلات الكيميائية حتى وإن لم يفهموا الأساس الكيميائي لها وكان بمثابة لهم العديد من الكيمائيات مثل الملح الصخري (نترات البوتاسيوم) والشبة (كبريتات الألومنيوم) والبوتاسيوم) والزاج الأخضر (كبريتات الحديدوز). وبقطر هذه الكيمائيات معاً ينتج ماء الفضة أو حمض النيتريك الذي يمكن أن يُستخدم لفصل فلز الفضة (الذي يدوب فيه) عن الذهب (الذي لا يدوب فيه). وكان الماء الملكي Aqua regia (حمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك المركزان) يُستخدم لإذابة الذهب مع ترك الفضة.



الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة


قارورة مستديرة القاعدة

الماء الفضة

الماء الملكي

قارورة مسطحة القاعدة

قارورة مستديرة



التقطير التجزيئي

يشكل الزيت الخام أساس صناعة البتر وكيمائيات الحديثة (ص 62-63). وهو يحتوي على العديد من المركبات الكيميائية المختلفة التي يمكن فصلها إلى مجموعات باستخدام التقطير التجزيئي؛ حيث يُسخن الزيت الخام ويُضخ في برج التجزئة. وتبرد الأبخرة في أثناء صعودها. وتتكثف المنتجات المشتقة من الزيت بمجرد أن تنخفض درجة حرارتها إلى ما دون درجة غليانها وتُجمع على صواب. ثم تُسحب من خلال أنابيب.

3 تسخين المحلول

يمكن التخلص من الماء بالتبخير، وتبقى بلورات كبريتات النحاس الزرقاء.

بلورات كبريتات النحاس المستردة من المحلول

الفصل

الكروماتوجرافي الحبر الأسود عبارة عن خليط من عدة صبغات مختلفة، يمكن فصلها بطريقة تسمى الكروماتوجرافي. عندما يتغلغل الحبر والمذيب (استخدم الماء هنا) خلال قطعة من ورق النشاف فإن أية مادة مذابة فيه سوف تصعد إلى أعلى بسرعة اعتماداً على الحجم والشكل والميزات الكيميائية لجزيئات هذه المادة.

تتحرك الصبغات المختلفة بسرعات مختلفة

ورق نشاف



حبر أسود

نبيذ أحمر

المخاليط العضوية

النبيذ عبارة عن خليط مركب من الكيمائيات العضوية (كيمائيات مستخرجة من الكائنات الحية) ولكن الاختلافات لا ترى فيه بوضوح حتى تحت المجهر؛ إنه متجانس. والخشب مثال على خليط غير متجانس؛ إذ إنه من الواضح بمجرد النظر إليه أنه غير متظم.

عملة برونزية

عملة مصنوعة من النيكل

مخاليط العملات

أستخدم الذهب والفضة والنحاس كمعادن لسك العملات المعدنية منذ القدم وأحياناً كان هذا الاستخدام يأخذ شكل المخاليط عُرفت باسم السيكة. كما استخدمت سبائك من النحاس والقصدير والزنك لصنع عملات البرونز.

الغذاء الكامل

على الرغم من أن اللبن يبدو سائلاً متجانساً فإنه يظهر من خلال الميكروسكوب خليطاً من سائل مائي تعلق فيه قطرات زيتية. ويُعرف هذا الخليط باسم المزيج المعلق؛ حيث تنتشر جسيمات صغيرة خلال السائل، ولكنها لا تذوب فيه. وهذه الجسيمات أصغر من تلك التي توجد في معجون الأسنان وهو مزيج معلق أيضاً.



دراسة المخاليط

يتكون كل شيء حولنا من الكيماويات بما فيها أجسامنا وقد صُنعت بعض الأشياء من مادة كيميائية واحدة. وعلى سبيل المثال يتكون الماء من نوع واحد فقط من الجزيئات (ص 16-17)، بينما يحتوى عصير البرتقال على أنواع مختلفة من الجزيئات وهو عبارة عن خليط من عدة مواد. والخل عبارة عن محلول يقوم فيه الماء بدور المذيب الذى تذوب فيه المواد الأخرى. ويمكن فصل

هذه المواد عن بعضها فيزيائياً. ومعظم الأطعمة عبارة عن مخاليط، وصلصة السلاطة هي أيضاً خليط يُسمى مستحلباً يحتوى على الزيت والخل. ولكنهما لا يمتزجان تماماً بل ينفصلان إلى طبقة زيتية خفيفة نسبياً وطبقة أكثر ثقلاً من الماء المحتوى على الخل. وهناك أنواع أخرى من المخاليط، قد تكون عبارة عن مادة صلبة مثل العملات المعدنية أو مادة غازية مثل الهواء المخيط بنا (ص 28-29). ومعجون الأسنان أيضاً خليط يُسمى بالمزيج المعلق وفيه تعلق الجسيمات الدقيقة فى السائل ولا تذوب. وكثيراً ما يضطر الكيميائيون لفصل الكيماويات لكي يتعرفوا عليها.



فصل السوائل

أستخدم جهاز الفصل المين الذى قد يعود إلى القرن السابع عشر لفصل سائلين غير قابلين للامتزاج عن بعضهما. يُصب السائل الأكثر ثقلاً من الأسفل تاركاً السائل الأخف فى الجهاز.

صنع الأخلطة وفصلها

من الممكن أن تُستخلص الكيماويات من المخاليط بعدة طرق متنوعة ومنها طريقاً الترشيح والتبخير الموضحة هنا. إن كبريتات النحاس عبارة عن ملح يذوب فى الماء - أى قابل للذوبان، والكبريت عنصر صلب لا يذوب فى الماء - أى غير قابل للذوبان.

ورقة الترشيح

لا تمر جسيمات الكبريت الصلبة من خلال ورق الترشيح

قمع الترشيح

قارورة مخروطية

كأس

مزيج معلق من الكبريت

محلول أزرق اللون لكبريتات النحاس المذابة فى الماء

2 فصل الكبريت

إذا رُشح الخليط يفصل الكبريت الأصفر بسهولة ويبقى فى ورقة الترشيح. ولكن الماء وكبريتات النحاس لا ينفصلان بل يبقيان معاً فى المحلول، ويمكن غسل الكبريت الأصفر بالماء لإزالة أى آثار لكبريتات النحاس. وتستخدم تقنية الترشيح تلك لاستخلاص الكيماويات النقية.

محلول كبريتات النحاس

1 خلط المواد معاً

عندما تُضاف كبريتات النحاس والكبريت إلى الماء تذوب كبريتات النحاس، ولكن الكبريت لا يذوب؛ لأن الماء ليس مذيباً للكبريت.

الكبريت

كبريتات النحاس

الجزئيات والمقاييس

الذرات والجزئيات بالغة الصغر حتى إن عددها في كمية قليلة من المادة ضخمة جداً. ويستخدم عدد أفوجادرو ($6,02 \times 10^{23}$) كثابت لحساب عدد الذرات أو الجزئيات في كمية من المادة. ويطلق على كمية المادة المحتوية على عدد أفوجادرو من الجزئيات اسم الوزن الجزيئي الجرامي «مول». ويمكن التوصل إلى الصيغة الكيميائية (ص 6-7) باستخدام هذا المقياس. وتحتوي كل عينة كيميائية مينة هنا على عدد الجزئيات نفسه (عدد أفوجادرو). ويُعين وزن كل منها عن طريق حساب الوزن الجزيئي بالجرامات - وهو عبارة عن مجموع الأوزان الذرية لكل الذرات المكونة للجزء المضاف.

أنبوب مدرج
مملوء بالزئبق

ترموتر



حوض من الحديد
مملوء بالزئبق

جهاز كثافة البخار

ابتكر جوزيف جاى لوساك (1778-1850) هذا الجهاز لقياس وزن بخار مركب ما. كان يتم وضع المركب في أنبوب زجاجي محكم الغلق ثم يُسخن حتى يتفجر ويتبخر العينة، ثم تحسب كثافة البخار من حجم التوزيع المزاح من الأنبوب، ومنه يمكن معرفة الوزن الجزيئي والصيغة الكيميائية.



$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

كبريتات النحاس المائية

الأوزان الذرية هي:
النحاس 63,5 الكبريت 32، الأكسجين (4×16)
الماء (5×18) مما يجعل الوزن الجزيئي الجرامي «المول» 249,5 جرام.

ذابت البلورات مكونة
محلولاً متجانساً

تبدأ الجزئيات
في الانتشار خلال السائل



NaCl

كلوريد الصوديوم

الأوزان الذرية هي: الصوديوم 23، الكلورين 35,5 مما يجعل الوزن الجزيئي الجرامي «المول» 58,5 جرام.

الزنك

الوزن الذري للزنك هو 65 مما يجعل الوزن الجزيئي الجرامي «المول» 65 جراماً.



Zn

حمض الخليك

الأوزان الذرية هي:
الكربون (2×12)،
الأكسجين (2×16)،
الهيدروجين (4×1)
مما يجعل الوزن الجزيئي الجرامي «المول» 60 جراماً.
(أضيف كاشف لإظهار أن المادة حمضية).

الماء


الأوزان الذرية هي:
الهيدروجين (2×1)،
الأكسجين 16
يُجعل الوزن الجزيئي الجرامي «المول» 18 جراماً.



CH_3COOH



H_2O



رؤية الذرات الحقيقية

لا يمكن أن تُرى ذرات اليوم المينة هنا بواسطة مجهر عادي فهي في غاية الصغر. ولكن ثمة مجهر إلكتروني يستخدم حزماً من الإلكترونات بدلاً من الضوء؛ لأن الطول الموجي للإلكترونات أقصر من طول موجات الضوء المرئي؛ مما يسمح برؤية أشياء أصغر. والمجهر المستخدم هنا يُعرف باسم المجهر النفقي الماسح.

الذرات والجزيئات



طبيعة المادة


كان الإنجليزي جون دالتون (1766-1844) الذي علم نفسه بنفسه ابتداءً من طائفة الكويكرز «الصالحين». وقد كان المؤيد الرئيسي لوجود الذرات وقد أثرت أفكاره في دراسة الكيمياء تأثيراً قوياً. وكان كل ما حوله يثير اهتمامه، وخاصة الطقس. وبدأ في دراسة المستنقعات القريبة من منزله في شمال إنجلترا. وقد استخدم نتائج تجاربه العملية على الغازات وتلك التي أجراها أنطوان لافوازييه (1743-1794) في فرنسا. وقد ابتكر دالتون أيضاً مجموعته الخاصة من رموز العناصر.

كان الفيلسوف الإغريقي ديموقريطس (حوالي 460-370 قبل الميلاد) أول من اقترح فكرة أن المادة تتكون من جسيمات بالغة الصغر غير قابلة للانقسام. وقد أطلق على هذه الجسيمات اسم ذرات، وفي أواخر القرن الثامن عشر نشأت نظرية حديثة عن الذرات. وفي ذلك الحين كان قد تم اكتشاف غازات وفلزات ومواد أخرى جديدة كما درس العديد من التفاعلات الكيميائية، وتم قياس أوزان المواد المشاركة فيها بدقة. وقد انبثقت النظرية الذرية لجون دالتون من تلك المشاهدات. وقد اعتقد أن ذرات عنصر ما (ص 18-19) تتطابق كلها معاً وتختلف عن ذرات العناصر الأخرى. وقد تتحد ذرتان أو أكثر معاً اتحاداً كيميائياً لتنتج «جزيئات» لمواد تسمى مركبات. وكل جزيئات المركب متطابقة. وقد أكد المفكر الإيطالي أماديو أفوجادرو (1776-1856) أن الحجم نفسه من أي غاز يحتوي على عدد الجزيئات نفسه. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة لم تلق القبول على الفور فإنها في آخر الأمر ساعدت الكيميائيين على حساب الأوزان الذرية والجزيئية. وترتبط هذه الأوزان بوزن الهيدروجين الذي يُعتبر وزنه الذري هو واحد (ص 22-23).



الذرات تتحرك

الذرات بالغة الصغر، حتى إنه لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولكن وجودها يمكن أن يفسر العديد من المشاهدات اليومية. انظر إلى الطريقة التي ينتشر بها لون برمنجنات البوتاسيوم النفسي عندما تذيب بلوراته في الماء؛ ويحدث هذا لأن الذرات دائمة الحركة، ولذلك فإنه عند خروجها من البلورات تتحرك خلال الماء حتى تتوزع توزيعاً منتظماً.



أحد التصورات عن الذرة

شهدت الأعوام الأولى من القرن العشرين بزوغ أفكار جديدة عن تركيب الذرة بنواتها المركزية، وما يدور حولها من إلكترونات. وإلى جانب هذه الاكتشافات نشأ لهم لكيفية ترابط الذرات معاً لتكوين الجزيئات. وقد وضع نيلز بور (1885-1962) - وهو فيزيائي دنماركي - نماذج ذات مدارات ثابتة، بحيث تدور الإلكترونات حول النواة المركزية المكونة من بروتونات (جسيمات موجبة الشحنة) ونيوترونات (جسيمات غير مشحونة) في مجموعات أو «قشرات». وقد ظهر أن هذا النموذج للذرة مناسب ومفيد، ولكنه لا يشكل التصور الوحيد - فالإلكترونات أيضاً تسلك سلوك موجات من الطاقة (مثل الضوء)، وأحياناً ما يكون أفضل تصور لها هو أنها تنتشر حول النواة على شكل سحابة. وبمثل نموذج بوهر المين ذرة صوديوم: حيث تقع نواتها في مركزها. وهناك عشرة إلكترونات في القشرتين الداخليتين تعرفان بالمدارين الإلكترونيين الداخليين - بينما يوجد إلكترون واحد في المدار الإلكتروني الخارجي في قشرة غير مكتملة. وعدد البروتونات الموجودة في الذرة يساوي العدد الذري (ص 22-23).

نموذج ذرة الصوديوم

مدار إلكتروني داخلي

نواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات

مدار إلكتروني خارجي

مطياف كروكس

لقد شاهد كروكس الخط الأخضر الذي تعرف عليه على أنه المميز لعنصر الثاليوم من خلال مطياف. وفي خلال القرن التاسع عشر اكتشفت عناصر جديدة بطرق متنوعة، وقد كان روبرت بنزن (1811-1899) أول من استخدم المطياف للتعرف على الفلزين السيزيوم والروبيديوم بالنظر إلى أطيافهما في عام 1859. وقد أصبح المطياف أداة فعالة للتعرف على العناصر الكيميائية الجديدة، وهو يحتوي على منشور يفرق الشعاع الضوئي إلى الألوان أو الأطوال الموجية المختلفة التي يتكون منها (طيفه). وإذا وضعت محاليل من الفلزات في لهب، فإنها تنتج ألواناً مميزة (ص 58-59) تظهر على هيئة خطوط في الطيف. ويمكن وضع الغازات في أنبوب تفريغ للدراسة طيفها.

مصغر «ميكرومتر»
لقياس الطول الموجي

مرآة تعكس تدريج
المصغر: الميكرومتر

العينية

محور ارتكاز

فتحة لمرور الضوء

ماسورة تحتوي
على منشور

الخط الأخضر
المميز للثاليوم

طيف الثاليوم

غصن أخضر جديد

تعطى مركبات الثاليوم لهباً أخضر عند حرقها، وعندما يُنظر إلى هذا اللهب من خلال منشور (موجود داخل المطياف)، فإنه يعطى طيفاً به خط أخضر مميز، وقد كان هذا هو الخط الأخضر الذي رآه كروكس وتسبب في حيرته، إذ إنه كان يتوقع أن يتوقع على واحد من عنصرين آخرين - السيلينيوم أو التيلوريوم - اللذين يعطيان عطين أزرق وأصفر على التوالي.

دراسة الثاليوم

الثاليوم فلز أبيض مائل للزرقة قابل للطرق (ص 24-25) يشبه القصدير ولكنه أكثر نعومة. وهو حساس للرطوبة الجو ويتفكك عندما يتعرض لها. وهو يكون الكثير من الأملاح مثل الفلزات الأخرى (ص 44-45). وقد سارع كروكس بتحصين أملاح الثاليوم المبينة بعد اكتشافه للثاليوم ودراسة خواصه الكيميائية. وقد وضعت أملاح الثاليوم في أوان زجاجية محكمة للعرض. وللثاليوم عدد قليل من الاستخدامات التجارية، على الرغم من أنه كان يُستخدم كسم للفئران؛ لأنه يحاكي مفعول الصوديوم - العنصر الضروري للعمليات الحيوية.

أملاح الثاليوم في
زجاجات العرض



اكتشاف بالمصادفة

كان السير ويليام كروكس (1832-1919) مولفًا بدراسة الكيمياء التطبيقية مثل الصباغة، وكان يعمل كخبير في التحليل الكيميائي. وامتد عقاؤه عبر سبعين عاماً من البحث الكيميائي، وقد أسرع إلى تطبيق تقنية التحليل الطيفي الكيميائي الجديدة للبحث عن عناصر لم تعرف من قبل. وفي عام 1861 أثناء فحص كروكس للرواسب المتبقية من إنتاج حمض الكبريتيك شاهد خطاً أخضر جديداً في الطيف، فأدرك أن هناك عنصراً جديداً موجوداً وقد أطلق عليه اسم الثاليوم من الكلمة الإغريقية ثالوس وتعني غصناً أخضر أو متبرعمًا. وقد اكتشف المزيد من العناصر منذ ذلك الحين، وتعلم الآن أن هناك 92 عنصراً مختلفاً في القشرة الأرضية، وقد ساهم العديد من الأشخاص في التعرف عليها وفصلها.

أثر من الراديوم

شريحة المجهر

شاشة فوسفورية من
كبريتيد الزنك



ثلاثة من مناظير أشعة ألفا التي استخدمها كروكس

مشاهدة الراديوم

صمم كروكس منظار أشعة ألفا لقياس النشاط الإشعاعي للراديوم. تتكون هذه الأجهزة من شاشات من كبريتيد الزنك توضع وراءها مقادير قليلة من الراديوم الذي زودت به ماري كوري - الكيميائية البولندية التي فصلت الراديوم - العالم كروكس. والراديوم يبعث جسيمات ألفا التي تحدث ومضات مرئية من الضوء عند سقوطها على الشاشة الموضوع أمامها، وتُشاهد بواسطة المجهر.

والراديوم عنصر نشط إشعاعياً يوجد في الطبيعة (ص 32-33). ومنذ عام 1940 أضيف 17 عنصراً أخرى إلى العناصر المعروفة بالفعل وعددها 92. وكل هذه العناصر الجديدة نشطة إشعاعياً وعادة ما تكون قصيرة العمر، إذ تنكسر إلى ذرات أصغر وتطلق إشعاعاتها. وهي لا توجد بصورة طبيعية، ولذلك ينبغي أن يحضرها العلماء في التفاعلات النووية، وثمة بعض العناصر التي لم يحضر منها إلا عدد قليل من الذرات.

العناصر

العنصر هو مادة تحتوي على نوع واحد من الذرات. فالذهب لا يحتوي إلا على ذرات الذهب، والهيدروجين لا يحتوي إلا على ذرات الهيدروجين. ومن ناحية أخرى، يحتوي الماء على ذرات كل من الهيدروجين والأكسجين؛ ولذلك فهو مركب (ص 20-21). وقد اعتبر أنطوان لافوازييه (1743-1794) أن العناصر مواد لا يمكن تجزئتها إلى مواد أخرى. وقد أعد قائمة بالعناصر عام 1789 توجد كلها تقريباً في القوائم الحديثة، إلا أنه أضاف أيضاً الحرارة والضوء.

وقد ازداد عدد العناصر المعروفة أثناء القرن الثامن عشر عندما حلل علماء المعادن الخامات ووجدوا فلزات جديدة. وقد ساعدت الأجهزة الجديدة مثل المطياف في تعرف الكيميائيين على المزيد من العناصر في القرن التاسع عشر.



الكيميائي «المرتآب»

اعتقد الإغريق أن الأرض والهواء والنار والماء هي العناصر الأساسية التي يتكون منها كل شيء آخر. وقد كتب روبرت بويل (1627-1691) في عام 1661 معارضة هذه الفكرة ومهداً الطريق أمام المفاهيم العصرية للعناصر. وقد عرف العنصر بدقة على أنه مادة لا يمكن تفكيكها إلى مواد أبسط منها.

تشكل الخضراوات الخضراء مصدراً
للتصوديوم والكالسيوم والحديد




نبات قرة
العين

المشمش

منجم البوكسيت

يشبه معدن البوكسيت الطين، وهو عبارة عن أكسيد الألومنيوم (ص 40-41) ومنه يُستخرج عنصر الألومنيوم. وتبين الصورة استخراجاً في جاميكا. والبوكسيت هو المصدر الرئيسي لفلز الألومنيوم (ص 46-47) الذي يستخدم لصنع أجزاء الطائرات ومحر كاتباته لأنه خفيف الوزن ومتين ولا يتآكل.

الفواكه المجففة غنية
بالمغنيسيوم والكالسيوم والحديد



الضراوة

فاكهة التوت هي
مصدر لحمض
الفوليك الذي
يساعد في
امتصاص الحديد



القشرة الأرضية

أكثر العناصر توافراً في القشرة الأرضية هو الأكسجين، يليه السيليكون الذي يوجد في الصخور على نطاق واسع متحداً بالأكسجين على هيئة السيليكات.

ولكن الهيدروجين - وهو أكثر

العناصر شيوعاً في الكون - ليس

شائعاً على الأرض، ويُعزى هذا جزئياً إلى

أنه غاز خفيف يمكن الهرب من الغلاف الجوي للأرض. وعلى الرغم من أن أغلب عناصر القشرة الأرضية من الفلزات فإنها تشكل أقل من ربع كتلتها الإجمالية. ويكون النيتروجين حوالي أربعة أضعاف غلافنا الجوي (ص 28-29) ولكنه غير قابل للتفاعل حتى إنه يشكل نسبة ضئيلة للغاية من القشرة الأرضية.

عناصر قليلة المقدار

يحتاج البشر إلى غذاء متوازن للحفاظ على صحتهم. ووجود كميات ضئيلة من عناصر عديدة ضروري للعمليات الكيميائية التي تجري بداخلنا، وكثيراً ما تُضاف مكملات للأغذية الرئيسية مثل الحيز والتسمين لمنع حدوث نقص في التغذية. وتشكل الأطعمة البحرية مثل أعشاب البحر والأسماك الدهنية مصادر غنية بالكالسيوم واليود. كما أن الحوز والبدور أيضاً غنية بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام والأسنان، وصفار البيض مصدر جيد للكبريت والتصوديوم والزنك.

الحوز
والبدور




صفار البيض



المسردين

أعشاب البحر






وليام براج

دراسة البلورات

طور وليام براج (1862-1942) مطيافاً يعمل بالأشعة السينية. وقد استخدمه ابنه لورانس براج (1890-1971) للوصول إلى ترتيب الذرات في التراكيب البلورية عن طريق قياس مقدار حيود (الحناء) الأشعة السينية عندما تمر خلالها. وتكون الأملاح تراكيبات بلورية - وكذلك يمكن لبعض المركبات مثل فيتامين ب 12 أن تكون بلورات ذات تركيب بالغ التعقيد.



ينتج التجاذب
الإلكتروستاتيكي
الروابط الأيونية

أيون الكلوريد

أيون الصوديوم

تستخدم الحرارة من
ثعب موقد بترن

2 التعريض للحرارة

إذا سخن خليط الحديد والكبريت بدرجة كافية يحدث تفاعل كيميائي. حيث تعطي ذرات برادة الحديد إلكترونات لذرات الكبريت فتتكون الرابطة الأيونية. وتكون العناصر البعيدة عن بعضها في الجدول الدوري (ص 22-23) هذا النوع من الروابط. وتسمى مركبات أيونية. وفي هذه التجربة أعطت الحرارة الطاقة اللازمة لإحداث الروابط بين ذرات العنصرين ولصنع المركب.

كيف تبدو المركبات؟

يرجع الفضل في تعيين تركيب ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم (NaCl) إلى لورانس براج. ويتكون كلوريد الصوديوم من عنصرين شديدي القابلية للتفاعل - الصوديوم والكلور - يتحدان لتكوين مركب مستقر بصورة جديرة بالملاحظة. وملح الطعام روابط قوية مثله مثل كل المركبات الأيونية مما يعني أن له درجتى الصهار وغليان مرتفعتين، وهو موصل جيد للكهرباء عندما يكون مصهوراً أو في محلول.

3 المركب

أصبح الحديد والكبريت الآن متحدين مكونين كبريتيد الحديد أو الحديدوز. وقد فقدت كل ذرة حديد إلكترونين بينما اكتسبت كل ذرة كبريت إلكترونين ولم يعد لون الكبريت أصفر، ولم يعد المغناطيس يجذب الحديد؛ لأنه أصبح مرتبطاً بالكبريت كيميائياً. ويمكن كتابة المعادلة الكيميائية بالصورة التالية: $Fe + S \rightarrow FeS$.

لا يستطيع المغناطيس أن يجذب
الحديد الموجود في المركب الجديد

كبريتيد الحديدوز



دراسة المركبات

عندما تتحد العناصر تكوّن المركبات. والمركبات تحتوي على أكثر من نوع من الذرات ترتبط معاً لتكون الجزيئات. ويحتوي المركب النقي على نوع واحد من الجزيئات. وتساعد النظرية الذرية الحديثة على تفسير كيفية تماسك (ارتباط) الذرات معاً لتكون الجزيئات. وتتكون الروابط الكيميائية باستخدام إلكترونات القشرة الخارجية للذرة (ص 16-17). وإما أن تكتسب الذرات إلكترونات وإما أن تتفقد أو تفقد أثناء هذه العملية. فإذا أعطت ذرة إلكترونات لذرة أخرى أصبح لكل منهما شحنة كهربائية فتجذب كل منها الأخرى مثل قطبي المغناطيس المتعاكسين مكونة رابطة «أيونية». وتنزع الفلزات إلى تكوين الروابط «الأيونية»، بينما تنزع اللافلزات إلى تكوين الروابط «التساهمية» مع بعضها البعض. وفيها تشارك الذرتان في الإلكترونات بدلاً من أن تسلم ذرة إلكترونات أو أكثر إلى ذرة أخرى والعناصر التي لا تعطى إلكتروناتها لغيرها مثل الغازات الحاملة (ص 32-33) لا تتفاعل عادة مع العناصر الأخرى، ويقال إنها غير قابلة للتفاعل ولا تكوّن المركبات بسهولة.




دوروثي هودجكين

يحتوي جزيء فيتامين ب 12 المركب على عدد إجمالي من الذرات يصل إلى 181 ذرة مقارنة بالماء الذي يحتوي على ثلاث ذرات. وقد فصل هذا الفيتامين في عام 1948 على هيئة مادة بلورية حمراء. وقد فحصته دوروثي هودجكين (ولدت عام 1910) باستخدام علم دراسة البلورات بالأشعة السينية، ثم اشتركت مع ألكسندر تود (ولد عام 1907) الذي درس تفاعلاته الكيميائية حتى توصلا إلى صيغته الكيميائية وتركيبه في عام 1955.

الصيغة
البسيطة للماء
 H_2O

الصيغة
التركيبية للماء




نموذج الكرة
والعصا للماء

الروابط التساهمية

قد تكون المركبات التساهمية على هيئة مواد صلبة أو سائلة أو غازية في درجات الحرارة العادية. ويتكون الماء وهو أكثر المركبات شيوعاً وأهمية على الأرض من جزيئات لذرتين من الهيدروجين ترتبطان بذرة من الأكسجين (H_2O). وتشارك كل ذرة هيدروجين بإلكتروناتها الوحيد مع أحد إلكترونات الأكسجين في تكوين رابطة تساهمية.



نموذج الماء
المائل للضراع



الروابط الأيونية

الأيون عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات تحمل شحنة كهربائية. ويتفاعل الصوديوم (Na) وهو فلز مع الكلور (Cl) وهو لا فلز، ليكون مركباً أيونياً - وهو ملح الطعام (NaCl). حيث تغطي ذرة الصوديوم الإلكترون الوحيد بقشرتها الخارجية إلى ذرة الكلور، مما يكمل القشرة الخارجية لذرة الكلورين. وفي بلورة الملح الصلب توجد أيونات الصوديوم والكلور مرتبة بالتبادل في سبكة حيث تتماسك الأيونات معاً بسبب قوة التجاذب الإلكتروستاتيكية.

تتجاذب الأيونات
الموجبة والسالبة لبعضهما البعض




يجذب المغناطيس
برادة الحديد

1 خلط العناصر

يفصل الكبريت وبرادة الحديد بسهولة باستخدام مغناطيس عادي، يجذب برادة الحديد ولا يجذب الكبريت.

يتبقى مسحوق
الكبريت الأصفر



H_2O

صنع مركب

في هذه التجربة تخلط برادة الحديد (Fe) مع مسحوق الكبريت (S). وعلى الرغم من أنهما مخلوطان خلطاً جيداً فإنهما لا يتفاعلان كيميائياً. ولكن عند تعرضهما للحرارة (خطوة 2) يتحد الكبريت مع الحديد ليكون ملحاً فلزياً - كبريتيد الحديد أو الحديدوز. وكثيراً ما تكوّن الفلزات أملاحاً مع اللافلزات (ص 44-45).



دمتري مندلييف

دمتري مندلييف

في محاولة لوضع بعض النظام في دراسته للعناصر الكيميائية المعروفة صنع مندلييف مجموعة من البطاقات، بطاقة لكل عنصر، مسجلاً خواصه الكيميائية. وفي أثناء ترتيبه لهذه البطاقات اكتشف القانون الدوري. وعندما وضعها بترتيب تزايد الكتل الذرية وجد أن الخواص تتكرر دورياً.

الغازات الخاملة (إلى اليمين)

لم يتوقع أحد اكتشاف مجموعة جديدة تماماً من العناصر في تسعينيات القرن التاسع عشر (ص 32-33). وقد أضيفت هذه العناصر في عمود منفصل في الجدول الدوري، ولم يكن للجدول الدوري تأثير مباشر على النظريات الكيميائية حتى تم اكتشاف العناصر الناقصة.

3	7	1	9
Li	Be		
الليثيوم	البيريليوم		
11	23	12	24
Na	Mg		
الصوديوم	المغنسيوم		

19	39	20	40	21	44	22	48	23	51	24	52	25	55	26	56	27	59
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co									
البوتاسيوم	الكالسيوم	الإسكندريوم	التيتانيوم	الفاناديوم	الكروم	المنجنيز	الحديد	الكوبالت									
37	85	38	88	39	89	40	91	41	93	42	96	43	99	44	101	45	103
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh									
الروبيديوم	الإسترونشيوم	الايتريوم	الزركونيوم	النيوبيوم	الموليبدينوم	التكنيشيوم	الروثينيوم	الروديوم									
55	133	56	137	57	139	72	178	73	181	74	184	75	186	76	190	77	192
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir									
السيوم	الباريوم	اللانثانوم	الهافنيوم	التنتالوم	التنجستن	الرينيوم	الأوزميوم	الإيريديوم									
87	223	88	226	89	227	104 (261)	105 (262)	106 (263)	107 (262)	108 (265)	109 (266)						
Fr	Ra	Ac	Unq	Unp	Unh	Uns	Uno	Une									
الفرانسيوم	الراديوم	الأكتيونيوم	اليوتيلوكواديم	اليوتيليتيوم	اليوتيلهكسيوم	اليوتيلسبيتيوم	اليوتيلوكيتيوم	اليوتيلينيوم									

تكون العناصر الموجودة في سلسلة الانتقال الصفوف الوسطى من الجدول

قراءة الجدول

تبين العنصر التي حددها مندلييف في جدولته المنشور عام 1871 هنا على هيئة بطاقات، وترتب الذرات تصاعدياً حسب «العدد الذري»، ويمثل هذا العدد عدد البروتونات (الجسيمات ذات الشحنة الموجبة) الموجودة في نواة الذرة، وهو عدد الإلكترونات نفسه (ذات الشحنة السالبة) التي تحيط بالنواة. وتُعين الكتل الذرية عن طريق مقارنة كتل العناصر بكتلة ذرة كربون التي تقدر كتلتها الذرية بـ 12.

اللانثانيدات

الأكتيونيدات

58	140	59	141	60	144	61	147	62	150	63	152	64	157
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd							
السيريم	البراسيوديميوم	الثيوميوم	البروميثيوم	الساماريوم	اليوروبيوم	الجانوليثيوم							
90	232	91	231	92	238	93	237	94	242	95	243	96	247
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm							
الثوريوم	البروتكتينيوم	اليورانيوم	النيبتونيوم	البولوتونيوم	الأمريسيوم	الكوريوم							

الجدول الدوري

كلما اكتشفت عناصر جديدة تم تحديد كتلتها الذرية ودراسة طريقة تفاعلها مع المواد الأخرى. وبدأ الكيميائيون يلاحظون عائلات من العناصر التي يتشابه سلوكها. ومنذ وقت مبكر حوالي 1829 اقترح يوهان دوبراينر (1780-1849) فكرة ثلاثية العناصر (مجموعات من ثلاثة)، وهكذا كون الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم - وكلها فلزات متشابهة - مجموعة واحدة تنزع لنفس السلوك (ص 24-25). وقد لاحظ الكيميائي الروسي دميتري مندلييف (1834-1907) أنه عند ترتيب العناصر حسب كتلتها الذرية، فإنها تظهر خواص تتكرر بانتظام (أو دوريًا). وقد أعلن عن قانونه الدوري في عام 1869 ونشر قائمة بالعناصر المعروفة في شكل جدول. وكانت لديه الشجاعة في أن يترك فراغات في مواضع لم يبد أن القانون الدوري يناسبها، متنبئًا باكتشاف عناصر جديدة لتملأ هذه الفراغات.

تُعرف الصفوف الأربعة باسم الدورات

والمجموعة الثانية وأنها تتكون من 18 عنصراً. وقد لاحظ الكيميائي الروسي دميتري مندلييف (1834-1907) أنه عند ترتيب العناصر حسب كتلتها الذرية، فإنها تظهر خواصاً تتكرر بانتظام (أو دورياً). وقد أعلن عن قانونه الدوري في عام 1869 ونشر قائمة بالعناصر المعروفة في شكل جدول. وكانت لديه الشجاعة في أن يترك فراغات في مواضع لم يبد أن القانون الدوري يناسبها، متنبئاً باكتشاف عناصر جديدة لتملأ هذه الفراغات.

تُعرف الصفوف الأفقية باسم الدورات

28 Ni النيكل	59 Cu النحاس	29 Zn الزنك (الخارصين)	31 Ga الجاليوم	70 Ge الجرمانيوم	33 As الزرنيخ	75 Se السيلينيوم	80 Br البروم	36 Kr الكريبتون
46 Pd البلاديوم	106 Ag الفضة	47 Cd الكاديوم	49 In الإنديوم	115 Sn القصدير	50 Sb الانتيمون	52 Te التيلوريوم	128 I اليود	54 Xe الزينون
78 Pt البلاتين	195 Au الذهب	79 Hg الزئبق	80 Tl التاليوم	201 Pb الرصاص	81 Bi البيزموث	84 Po البولونيوم	210 At الاستاتين	86 Rn الرادون

وضع العناصر الجديدة في أماكنها (في الأعلى)

كان الإنجاز المتروك لمندليف الدوري هو التنبؤ بالعناصر الجديدة؛ إذ لم تكن عناصر الجاليوم والجرمانيزم والإسكندريوم معروفة عام 1871 ولكن مندليف ترك لها فراغات حتى إنه تنبأ بما سوف تكون عليها كتلها الذرية وسائر خواصها الكيميائية. وأول عنصر يكتشف منها كان الجاليوم في عام 1875. وقد تطابقت كل المميزات التي تنبأ بها مع خواص هذا العنصر، وقد أسماه مندليف أليكا - ألو منيوم - لأنه جاء تحت الألو منيوم في جدولته.


العناصر النووية الحديثة (إلى اليسار)

أطلقت على العناصر الحديثة أسماء مرتبة بناء على أعدادها الذرية، وذلك لتجنب الخلافات حول تسميتها. ولذلك أصبح العنصر 104 أنيلكواديم المشتقة من العدد اللاتيني أو واحد - صفر - أربعة وهكذا.

سلسلة الانتقال الداخلية (إلى اليسار)


يعرف هذان الصفتان باسم اللاتانييدات والأكتينييدات طبقاً لاسمى أول أعضاء المجموعتين - اللانثانوم (عدده الذرى 57) والأكتينيوم (عدده الذرى 89). وقد جرت العادة على فصل هذه العناصر عن باقى الجدول لإضفاء شكل مترابط منطقياً عليه. وكثيراً ما توجد اللاتانييدات معاً فى المعادن، ويطلق عليها أحياناً اسم العناصر الأرضية النادرة، على الرغم من أنها ليست نادرة بشكل خاص. وكل الأكتينييدات نشطة إشعاعياً ولا توجد منها فى الطبيعة إلا العناصر الثلاثة الأولى بينما ينتهى أن يحضر الباقى اصطناعياً.

65 159 Tb التريبيوم	66 162 Dy الديسبريزيوم	67 165 Ho الهولميوم	68 167 Er الأربيوم	69 169 Tm الثليوم	70 173 Yb الايتربيوم	71 175 Lu اللوتيتيوم
97 247 Bk البركليوم	98 251 Cf الكاليفورنيوم	99 254 Es الاينشتاينيوم	100 253 Fm الفيرميوم	101 256 Md المنشدينيوم	102 254 No النوبليوم	103 257 Lr اللورنسيوم



الفلزات في الجدول الدوري

تمثلت مجموعات العناصر الرئيسية الخمس ذاتها. وكل الفلزات القلوية الواقعة على يسار الجدول تتفاعل مع الماء مكونة مادة قلوية. أما الفلزات الانتقالية التي تقع بدءاً من الصف الأفقي الرابع حتى أسفلها، فهي تشتهر بتنوع ألوان الأملاح التي تكونها.



فصل الفلزات التفاعلية

أصبح السير همفري ديفي (1778-1829) أستاذاً في المؤسسة الملكية بإنجلترا في عام 1801 أي بعد إنشائها بعام واحد. وقد أحرزت محاضراته في الموضوعات العلمية نجاحاً باهرًا وتوافد أفراد المجتمع الراقي للاستماع إليه. وبعد اكتشاف العمود الفلظاني (ص 46-47) بنى ديفي بنفسه بطارية ضخمة من الخلايا الفلظانية واستخدم الكهرباء الناتجة منها في فصل فلز البوتاسيوم أولاً ثم فلز الصوديوم من هيدروكسيداتهما. وفي العام التالي فصل الماغنسيوم والكالسيوم والإسترونيوم والباريوم. ويجب أن تستخرج هذه الفلزات من خاماتها المنصهرة بواسطة الكهرباء لأنها شديدة التفاعلية (القابلة للتفاعل). ويمكن أن تستخلص الفلزات الأقل تفاعلية - على سبيل المثال النحاس (ص 44-45) - من خاماتها عن طريق تسخينها إلى درجات حرارة عالية.

الإسترونيوم

سمى هذا العصر الفلزي على اسم مدينة سترونشيان الإسكتلندية حيث وجدت الخامات احتوية على الإسترونيوم أول مرة. وهذا الفلز القضي الناعم يتفاعل مع الماء ويحترق في الهواء. ويستخدم لهبه الأحمر في الألعاب النارية، وقد صنعت زجاجات العينات تلك خصيصاً لكي تتناسب مع لوحة العرض.

الجاليوم

هذا الفلز أملس ولونه أبيض فضي بالألوانيوم، وقد تنبأ مندليف بوجوده (ص 22-23) ونظرًا لانخفاض نقطة انصهاره حوالي $F^{\circ} 86$ ($C^{\circ} 30$) فإنه ينصهر إذا حمل في يد دافئة. ويتم استخلاصه بواسطة التحليل الكهربائي كمنتج ثانوي لتعدين البوكسيت (ص 18-19) ويستخدم في صناعة الإلكترودات.




كيف تتفاعل الفلزات؟

يقال إن عنصرًا ما تفاعلي إذا كان من السهل أن يكتسب أو يفقد الإلكترونات التي تستخدم في تكوين الروابط (ص 20-21) ويمكن ترتيب الفلزات حسب قابليتها للتفاعل مع الماء والهواء. ويعرف هذا الترتيب بسلسلة التفاعلية، وهو يبين مدى سهولة استخلاص الفلز من خامه. ويأتي الذهب وهو أقل الفلزات قابلية للتفاعل في ذيل القائمة فهو لا يتفاعل مع الماء أو الأحماض الخفيفة أو الهواء ويوجد في الطبيعة على هيئة عنصر.



تفاعلية الفلزات المختلفة

يسلك البوتاسيوم والقصدير سلوكًا مختلفًا عندما يلمسان الماء، فلز البوتاسيوم (إلى اليمين) يتفاعل بشدة وتولد كمية حرارة ضخمة حتى إن غاز الهيدروجين الناتج يحترق ويشعل محدثاً لهباً بنفسجي اللون. أما القصدير (إلى أعلى) الذي يقع في موضع منخفض في السلسلة التفاعلية، فيتفاعل بالكاد مع الماء. فإذا استخدم حمض مخفف كان تفاعل البوتاسيوم أشد بينما يتفاعل القصدير ببطء شديد لينتج الهيدروجين.



نظرة على الفلزات

معظم العناصر من الفلزات. وكثيراً ما توصف الفلزات بأنها متينة وثقيلة ولا معة، ويصعب صهرها. والعديد من الفلزات قابل للطرق: أى يمكن أن تشكل بواسطة مطرقة. وبعضها قابل للسحب: أى يمكن سحبه على هيئة أسلاك رفيعة. ولكن هناك استثناءات - فالزئبق فلز غير أنه سائل في درجة حرارة الغرفة. وللفلزات أيضاً خواص كيميائية مميزة، فهي تتفاعل مع الأحماض لتكون الأملاح (ص 44-45) وتتفاعل مع أكسجين الهواء لتكون الأكاسيد القاعدية (ص 40-41). وعلى الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه بين الفلزات فثمة أيضاً أوجه للاختلاف وهي التي تحدد مدى ملائمة الفلز لاستخدام معين. وبعض الفلزات خفيف الوزن مثل الألومنيوم، مما يجعله مثالياً لمكونات صناعة الطائرات. وبعضها مقاوم للتآكل مثل الكروم الذي يستخدم لصناعة لوازم الحمامات.



السبيكة

يعد الهاون والمدقة من أهم الأدوات للكيميائي والمصنعي. وكثيراً ما كان يصنعهما سابقو الأجراس، ولذا كانا يصنعان من المادة نفسها التي كانت تصنع منها الأجراس - وهي شابة من القصدير (بصفة رئيسية) والنحاس. والسبيكة عبارة عن خليط من الفلزات (ص 14-15)، وكثيراً ما تفضل السبائك على الفلزات النقية، لأنه يمكن مزجها للحصول على خواص مثل الصلابة أو درجة الانصهار المنخفضة.

الفلز السائل

يستخدم هذا الترمومتر الذي يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر الزئبق للإشارة إلى درجة الحرارة، إذ إن الحرارة تجعل الزئبق يتمدد. وقد اعتقد على مدى قرون طويلة أن الزئبق لا يمكن أن يوجد إلا على هيئة سائل، ولكن في أثناء شتاء قارس في روسيا عام 1759 لوحظ أن الزئبق يتجمد عند حوالي 36.4°C - 37°C (درجة فهرنهايت) أى -38°C درجة مئوية.

التعدين والكيمياء

بحث النقبون عن الرواسب المعدنية وساعدوا في تحديد العديد من الفلزات الجديدة. وكانت أنابيب النفخ تشكل أداة هامة في مجال عملهم، وكان كارل فريدريش بلانك (1800-1858) هو أول من وصف «مختبراً» متنقلاً في بحثه عن التحليل باستخدام أنابيب النفخ. وتحتوى هذه المجموعة من الأدوات التي تعود إلى القرن التاسع عشر على أدوات تعدينية للاستخدام في الحقل. كانت عينات الفلز تصهر مع الرصاص في بوتقة صغيرة (ص 12-13) باستخدام أنبوب النفخ للتسخين، ثم تخير لدراسة تفاعلاتها مع الكاشفات الكيميائية المعيارية.

زجاجات
تحتوى على
الكاشفات

صينية تحمل
أدوات التنقيب

نظارة معظمة

صندوق خشبي

صخر الحجر الرملي

تحتوى هذه العينة من صخر الحجر الرملي على خام النحاس الذي يتكون في الغالب من كربونات النحاس الذي يميل لونه إلى الاخضرار. والحجر الرملي عبارة عن حجر رسوبي وهو يتكون بصفة رئيسية من السيليكا وقد تراكمت طبقات السيليكا على هيئة الرمل عبر ملايين السنين. وفي أثناء تكونه تختلط به مواد أخرى، ويقوم الخللون بتعيين مقدار الفلز الموجود في الصخرة لكي يحددوا ما إذا كان للتعدين جدوى اقتصادية.

زجاجة تحتوى
على كاشف

ورق الكاشف

شرائح من
الرصاص

الهاون
والمدقة

بوتقة

فتيلة

موقد
كحولي

أنبوب النفخ


قطعة الفحم

الماس والجرافيت

توجد العديد من العناصر الألفلزية على أكثر من هيئة واحدة (شكل متأصل) والكربون ليس استثناء (ص 48-49). والماس وهو أصلب المواد لا لون له بينما الجرافيت ناعم وأسود اللون، وكل منهما لا يحتوي إلا على ذرات الكربون. وقد استخدمت كاثودين لورنسديل (1903-1971) هذا النموذج لإيضاح ترتيب ذرات الكربون المختلف في الشكلين المتأصلين. ويتكون الجرافيت من طبقات مسطحة، بينها مسافات كبيرة من ذرات الكربون. وتترلق هذه الطبقات بسهولة على بعضها البعض مما يجعل الجرافيت شحيم تزلبيق جيداً. ويمكن القول إن الإلكترونات التي تربط الطبقات معاً لا ترتبط بشدة بذرات معينة، ولذا فهي توصل الكهرباء بشكل جيد. أما في الماس فإن كل ذرة كربون ترتبط بأربع ذرات كربون أخرى في تركيب منظم من روابط شديدة القوة. (وتمثل حلقات المطاط الروابط في النموذجين المبينين هنا).



ترتيب ذرات الكربون في الماس



ترتيب ذرات الكربون في الجرافيت

قناع الغاز (1917)



الاستخدام المأساوي للكلور

استخدم الجانبان (دول الحلفاء، ودول المحور) الغازات السامة في أثناء الحرب العالمية الأولى (1914-1918). وقد استخدم الكلور لأول مرة في مدينة يابر في بلجيكا عام 1915. وقد تدفق الغاز الأخضر الثقيل على الريف واستنشقته جنود الحلفاء، مما تسبب في مقتلهم بالسائل وغرقهم. والذين لم يموتوا أصيبوا بالمرض والعجز مدى حياتهم. وقد أنتجت الأقنعة بأعداد هائلة أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ولكن لحسن الحظ لم تلعب الحرب الكيميائية أي دور في العمليات العدائية الحربية.

قطب من البلاتين عند
الكاثود (الطرف السالب)
أسلاك إلى
مصدر الكهرباء

يجمع غاز
الهيدروجين هنا



استخدام أشباه الموصلات

هذه الشريحة من السيليكون أصغر من ظفر طفل رضيع وقد حفرت على سطحها مجموعة من الدوائر الكهربائية. وكل من السيليكون والجرمانيوم من أشباه الموصلات - أي أنهما ليسا موصلين جيدين للكهرباء. ولكن «إضافة» مقادير ضئيلة من الشوائب إلى شريحة السيليكون تجعلها موصلة للكهرباء. ويمكن تصميم دوائر كهربائية معقدة على مسافة بالغة الصغر وبسبب صغر حجم الشرائح يمكن أن يكون حجم الأجهزة الإلكترونية - مثل الكمبيوتر والساعات الرقمية - صغيراً ومناسباً.

قمع سنائي يعلو
الكلوريد المتبقي

قطب من سبيكة
البلاتينو - إيريديوم
عند الأنود (الطرف
الموجب)



عناصر من البراكين

يمكن أن يوجد الكبريت على منحدرات البراكين. وقد عرف الكبريت منذ القدم، وكان الكيميائيون القدماء يعتقدون أنه يمثل جوهر النار. وأهم مركب صناعي للكبريت هو حمض الكبريتيك (ص 62-63). البركان المشين هو جبل سانت هيلينز في ولاية واشنطن الذي ثار عام 1980.

يجمع غاز الفلورين هنا

حمام التبريد
باستخدام
كلوريد الميثيل


يتكشف فلوريد
الهيدروجين في
قارورة من البلاتين

سوف يستخدم
الثلج والفلور
الموضوعان في
الكأس لتكثيف
فلوريد
الهيدروجين

حامل ثلاثي
القوائم

اكتشاف اللافلزات

معظم العناصر من الفلزات. وتسمى العناصر الأخرى التي ليست بالفلزات باللافلزات. ونصف هذه اللافلزات غازات مثل الأكسجين والنتروجين والكلور. والبروم سائل في درجة حرارة الغرفة بينما تكون العناصر الأخرى اللافلزية من المواد الصلبة. وعادة ما تكون اخواص الفيزيائية لللافلزات عكس تلك المميزة للفلزات. وفي الحالة الصلبة تكون اللافلزات هشة ولا يمكن طرقها لتشكيلها (غير طيعة) أو سحبها على هيئة أسلاك (غير قابلة للسحب). وللعناصر نفسها تركيب كيميائي مختلف عن الفلزات. وهي ليست موصلات جيدة للكهرباء أو الحرارة. وتختلف أيضًا تفاعلات اللافلزات الكيميائية عن تفاعلات الفلزات. فاللافلزات لا تتفاعل مع الأحماض الخفيفة، وعندما تحترق في الهواء أو الأكسجين، فإنها تكون الأكاسيد (ص 40-41) التي تنتج الأحماض مع الماء. وتظهر بعض المواد الصلبة سلوكًا بين سلوك الفلز واللافلز: وتسمى نصف فلزات أو أشباه موصلات. وقد كانت مجموعة كاملة من اللافلزات مجهولة حتى تسعينيات القرن التاسع عشر وهي مجموعة الغازات الخاملة (ص 32-33).



على الجدول الدوري

تقع اللافلزات إلى أعلى يمين الجدول، وتظهر العناصر شبه الفلزية (اللون الوردي الفاتح) سلوك اللافلزات والفلزات معًا. وبعضها مثل السيليكون من أشباه الموصلات. والهيدروجين أيضًا لا فلز.



يتفاعل العامل المؤكسد مع الفوسفور

الفوسفور

حامل الضوء

يتوهج الفوسفور الأبيض


الذي اكتشف في عام 1669 في الظلام، وقد كان يستخدم في أعواد الثقاب؛ لأنه سهل الاشتعال. ولكن نظرًا لسميته العالية، استبدل به الفسفور الأحمر في عام 1845. وفي أعواد ثقاب الأمان المينة تشتمل العلبة على الفوسفور، بينما يحتوي رأس عود الثقاب على مادة مؤكسدة تشتعل عند احتكاكها بالفوسفور.

أنبوب التوصيل

أسنان أكثر قوة وصحة

تحمي كميات ضئيلة من الفلوريد الأسنان من مهاجمة

الأحماض الموجودة بالطعام. ويتم هذا عن طريق إضافة الفلوريد لإمدادات المياه. ويضاف الفلوريد حاليًا لمعجون الأسنان العصري. وقد قللت هذه العملية من تسوس الأسنان الخطير.



مواسان في معمله

يظهر هنا هنري مواسان (1852-1917) في معمله في باريس. وقد نجح مواسان أخيرًا في الحصول على الفلورين - وهو غاز مائل للاصفرار. وقد حرص في تجاربه على ألا تتلامس الغازات الخارجة من القصبين وقد استخدم خليطًا من الكيماويات وصنع الجهاز من البلاتين، لأن فلوريد الهيدروجين يذيب الأواني الزجاجية. وقد عانى مواسان من التأثيرات السامة لغاز فلوريد الهيدروجين وغاز الفلورين مثلما عانى زملاؤه العلماء الذين حاولوا أن يفصلوا هذه المادة الكيميائية الخطيرة.

يتم التسخين بواسطة موقد بنزن

جهاز مصنوع من مادة البلاتين لأن فلوريد الهيدروجين يذيب الزجاج

حامل الماسك ومعه حلقة الموجة

مجموعة تحتوي على ثنائي فلوريد البوتاسيوم الهيدروجيني

اكتشاف الفلورين

على الرغم من أن أملاح الفلورين - الفلوريدات - كانت تستخدم منذ قرون فإن غاز الفلورين - وهو أكثر العناصر قابلية للتفاعل على الإطلاق - لم يُفصل حتى عام 1886. فليس هناك مركب يتخلى بسهولة عما يحتويه من الفلورين. ولذلك فمثله مثل الفلزات الأكثر تفاعلية، لا يمكن فصله إلا عن طريق التحليل الكهربائي (ص 46-47). باستخدام هذا الجهاز كان يتم الحصول على الغاز من محلول ثنائي فلوريد البوتاسيوم الهيدروجيني (KHF_2) في فلوريد الهيدروجين السائل (HF). ويجب أن يكون فلوريد الهيدروجين المستخدم لامائيًا (أي خاليًا تمامًا من الماء) وإلا سوف ينتج الأكسجين.

تسبب الشرارة
الكهربائية
اشتعال
الغازات



الماء المكرين

قام جون نوت وهو طبيب إسكتلندي بتطوير طريقة ابتكرها بريستلي في عام 1767 لتحضير الماء المكرين. وقد كان ثمة اعتقاد خاطئ بأن الماء المكرين يشفى من الأسقربوط وهو مرض ينتج عن نقص فيتامين سي وقد استخدم جهاز نوت الرائع بتوسع في الصيدليات وفي المنازل الخاصة.




نقاء الهواء

في عام 1766 اكتشف هنري كافنديش (1731-1810) الهيدروجين - وقد أسماه «الهواء القابل للاشتعال». وظن أنه قد يكون اللاهوب «الفلوجيستون» النقي (ص 30-31) وقد استخدم إيديومتر (مقياس تحليل الغازات) ليوضح أن الهيدروجين يحترق في الأكسجين لتكوين الماء، مما يثبت أن الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين. وقد استخدم المصطلح «إيديومتري» لوصف قياس درجة نقاء الهواء.


يسمح الصمام للغاز بالمرور إلى أعلى، ولكنه يمنع الماء من أن يتراجع إلى أسفل

يفضي الغاز من هنا



ما الذي يوجد في الهواء؟

يتكون الهواء الذي نستنشق في الغالب من النيتروجين وهو غاز غير تفاعلي ومع الأكسجين الضروري للحياة، والذي تبلغ نسبته حوالي الخمس. ويتكون الجزء الباقى من مقادير ضئيلة من الغازات الخاملة (ص 32-33) والملوثات وثاني أكسيد الكربون الذي تفرزه الحيوانات وتستخدمه النباتات لكي تنمو (ص 50-51).



ميزان بلاك

سجل بلاك بدقة كتل المواد الكيميائية التي استخدمها والغازات التي أنتجها مما ساعده على فهم ما الذي يجري في أثناء تجاربه. وكان من أوائل من أدركوا أهمية القياسات الدقيقة. وعلى الرغم من هذا، فإن هذا الميزان يعد بدائيًا جدًا مقارنة بالموازين الكيميائية الأحدث منه (ص 60-61).



نظرة على الهواء



الغازات الناشئة عن الاحتراق

أدرك «ج.ب. فان هيلمونت» أنه يمكن إنتاج غازات مختلفة كيميائياً عن طريق حرق المواد. وقد أدرك أن هذه الغازات تختلف عن الهواء الذي نستنشق.

يتكون الهواء المحيط بنا من خليط من الغازات. والغازان الرئيسيان في الهواء هما الأكسجين والنيتروجين. ومعظم الغازات لا يمكن رؤيتها أو الإحساس بها. في الواقع، لم يدرك الناس أن هناك غازات مختلفة، وحتى القرن السابع عشر كان في اعتقادهم أن هناك مجرد هواء أُعْثِرَ واحداً من العناصر الإغريقية الأصلية.

وقد حاول يوهان فان هيلمونت (1577-1644) أن يصنع «أشكالاً من الهواء» كيميائياً. ونظراً لتكرار كسر جهازه الزجاجي كثيراً أطلق عليها اسم «غاز» وهو مشتق من كلمة إغريقية تعني القوضى. وقد بدأت دراسة الغازات بجدية في القرن الثامن عشر. وكانت العقبة الرئيسية هي كيفية التعامل مع الغازات. وقد اخترع جوزيف بريستلي حوض تجميع الغازات تحت الماء أو الزئبق،

وما زال يستخدم في المعامل حتى الآن. وكان أول غاز تتم دراسته بالتفصيل هو غاز ثاني أكسيد الكربون. وقد صنعه جوزيف بلاك بعدة طرق مختلفة وإدراكاً منه أنه ليس هواء عادياً أطلق عليه اسم «الهواء الثابت». وبنهاية القرن الثامن عشر كان العديد من الغازات الشائعة قد تم تحضيره ودراسته في إطار علم يعرف باسم كيمياء الهواء.

جوزيف بريستلي (1733-1804)

صنعت هذه الميدالية التي تمثل القس والعالم الإنجليزي على يد الخراف الإنجليزي جوزايا ودجود الذي زود بريستلي أيضاً بالكثير من أجهزته الكيميائية. وقد قام بريستلي بدراسة العديد من الغازات باستخدام حوض تجميع الغازات الذي اخترعه، وذلك قبل اكتشافه الأكسجين. وقد درس ثاني أكسيد الكربون الذي نتج كمنتج جانبي في مصنع الجعة البخار، واخترع طريقة لتحضير الماء المكرن.



تصنيع ثاني أكسيد الكربون

في هذه التجربة يتم تحضير ثاني أكسيد الكربون (CO_2) بواسطة إحدى الطرق التي استخدمها جوزيف بلاك. يضاف حمض الهيدروكلوريك إلى كربونات الماغنسيوم (أو ماغنيسيا ألبا) كما أسماها بلاك، ويجمع الغاز الناتج باستخدام حوض التجميع. وقد أدرك بلاك أنه يمكن أيضاً أن ينتج هذا الغاز عن طريق تسخين أحد الكربونات أو عن طريق حرق الحجر الجيري. وقد أطلق عليه اسم «الهواء الثابت» لأنه أدرك أنه ليس بالهواء نفسه الذي يستنشق على الرغم من أنه أثبت أن مقادير صغيرة من هذا الغاز توجد في الجو.

التعامل مع الغازات

استخدمت مائة الخنزير على نطاق واسع في القرن الثامن عشر لاحتواء الغازات التي تستخدم لإجراء التجارب. وكانت تحمل فيها أيضاً الغازات التي يراد وزنها. وقد استخدم بريستلي ثاني أكسيد الكربون المختوى في مثانة لتحضير مياه معدنية اصطناعية. وقد اشتكى جون نوت (ص 28) من النكهة التي أضفتها المثانة على المياه، وابتكر جهازه الزجاجي بدلاً منها.

قمع سناني

أنبوب توصيل



جوزيف بلاك (1728-1799)

تقد ازدادت المعرفة الكيميائية بصورة هائلة نتيجة للتجارب الدقيقة التي أجراها بلاك وهو كيميائي إسكتلندي مرموق. وقد أثبتت تجاربه العلمية في نهاية المطاف أن هناك غازات أخرى إلى جانب الغازات الموجودة في الجو. وقد حضر بلاك غاز ثاني أكسيد الكربون أول مرة في أثناء دراسته حموضة المعدة وكيفية علاجها.

كربونات الماغنسيوم في أثناء تفاعلها مع الحمض



الغاز المضحك

من الممكن أن تساعد غازات أخرى على الاحتراق ومنها على سبيل المثال أول أكسيد التيروجين. واسمه المشتق من الغاز المضحك الذي يمكنه أيضاً أن يساعد على التنفس - محققاً الصخب والمضحك كما بين هذا الرسم الكاريكاتوري لجيمس جيلراي (1815-1757).




تجارب على الهواء (حوالي 1801)



مقبض لضبط زاوية العدسة

القاعدة



التنفس والاحتراق

عندما نستنشق الأكسجين فإنه يمرر إلى جزئيات خاصة في الدم تسمى هيموجلوبين تقوم بنقله إلى العضلات التي تحتاج إليه. وعندما يصل الأكسجين إليها فإنه يتفاعل مع جزئيات الطعام بالطريقة نفسها التي يتفاعل بها مع المواد التي تحترق فيه فينتج ثاني أكسيد الكربون والطاقة التي نحتاج إليها.

حوض تجمع الغاز الذي سوف يمتلئ بالزئبق من الزئبق

مدخنة

حلقة معدنية

يغلق المنفذ الهوائي فيعطى لهباً أصفر بسبب الكربون غير المحترق

يتحكم المنفذ في سرعة الغاز واحتراق اللهب



قطعتنا الشم

ينفخ العامل بانتظام من خلال هذه القطعة



تحبس الكرة الرطوية الناتجة عن التنفس

فتحة توضع في مركز اللهب

التسخين المحمول

استخدمت أواني النقع منذ القدم (ص 10-11). وقد أدخلها السويدي أكسل فريدريك فون كرونستد (1722-1765) في تحليل المعادن. ويسمح منفذ الهواء ببلوغ درجات حرارة عالية باستخدام الشموع أو مصابيح الكحول فقط.



ناقوس زجاجي

يرتفع مستوى الزئبق هنا عندما يتفاعل الأكسجين مع الزئبق المسخن

تحليل الأكسجين

بدأ لافوازييه في تحليل مكونات هواء الجو، فقام بتسخين الزئبق في معوجة يؤدي عنقها إلى ناقوس زجاجي مقلوب يحتوي على هواء موضوع فوق الزئبق فيما يعرف باسم حوض تجمع الغاز (أو الهواء). وكان يعلم إجمالي حجم الهواء الموجود بالمعوجة والناقوس الزجاجي في البداية، وعندما سخن الزئبق رأى قشوراً حمراء من «الكلس» (أكسيد الزئبق) تظهر على سطح الزئبق. وبعد ذلك بثلثي عشر يوماً عندما تأكد من عدم حدوث أية تفاعلات أخرى قام بقياس حجم الهواء المتبقى في الناقوس الزجاجي، ووجدته حوالي خمسة أسداس الحجم الأصلي. ولكن لا يمكن أن يحترق شيء في الهواء المتبقى ولا أن يستنشق شيء منه. وعندما سخن الكلس الزئبقي حصل على كمية الغاز نفسها (الأكسجين) التي فقدتها من قبل في التجربة الأولى.

تفاعلات الاحتراق

نظرية اللاهوب «الفلوجيستون»

اعتقد الكيميائي الألماني جورج

أرنست شتال (1659-

1734) أنه عندما تحترق

المواد فإنها تطلق مادة

أسمها اللاهوب

«فلوغيستون». وقد ظهر

أن هذه النظرية تساعد على

تفسير التفاعلات وقد اجتذبت

العديد من المفكرين ولكن أنطوان

لافوازييه أثبت خطأها (انظر أسفله).



تزود النار البشر بالضوء والحرارة التي هي وسيلة الطهي وصهر المعادن. وقد كان الاحتراق من أوائل ما درس من تفاعلات كيميائية بالتفصيل. ونحن على علم الآن أنه عند احتراق المواد في الهواء فإنها تتفاعل مع الأكسجين الموجود فيه مكونة مركبات جديدة وتاركة أحياناً بقايا من الرماد. وبعض المركبات تكون في الحالة الغازية فتختفي في الهواء، وبعضها يأخذ شكل مواد صلبة تبقى في الإناء وقد افترضت بعض النظريات المبكرة أن حرق الخشب لتكوين الرماد يماثل في الأساس حرق الفلزات. وفي كلتا الحالتين كان يعتقد أن الحرق يحرر جزءاً من المادة الأصلية على هيئة اللاهوب «الفلوجيستون» (من الكلمة الإغريقية فلوغيستوس وتعني قابل الاحتراق). وقد ظهر أن هذه الفكرة تساعد في فهم العمليات الكيميائية المتصلة بعملية الاحتراق؛ لأنه عندما وزنت نواتج التفاعلات بدقة أكثر أدرك العلماء أنه على الرغم من كون الرماد المتبقى عن احتراق الخشب قد خف وزنه فإن الفلزات ازداد وزنها بالفعل عندما حُرقت.

احتراق الشمعة

الشمع عبارة عن خليط من مركبات تحتوي في الأساس على الكربون والهيدروجين. وعندما تشعل الفتيلة يسحب بعض الشمع إلى أعلى الفتيلة وينبخر. ويحترق البخار مستهلكاً بعض الأكسجين من الهواء وينتج الجزء الأصغر من اللهب عن توهج جسيمات الكربون عند درجات الحرارة المرتفعة. أما الكربون الذي لم يحترق فإنه يكون السخام.

أبو الكيمياء

بعد أن اكتشف الإنجليزي جوزيف بريستلي الأكسجين عام 1774 بدأ الفرنسي أنطوان لافوازييه (1743-1794) - الذي أطلق على الغاز اسم أكسجين - في دراسة خواصه وخواص الهواء. وقد اقترح نظرية جديدة تماماً فسرت تكون أكاسيد الفلزات (ص 40-41) وكذلك أتاحت فهم التفاعلات التي تحدث في أثناء حرق الخشب أو الشمع. وكان لافوازييه ينحدر من أسرة ثرية وقد حوكم وأعدم بالمقصلة في أثناء الثورة الفرنسية بسبب تورطه في تحصيل الضرائب.



يسخن الزئبق في المعوجة ليكون الكلوس

مقبض للحمل

فتحة للوقود

فرن الطين الحراري




استخدامات الهليوم

يستخدم الهليوم ملء البالونات والمناطيد لأنه أخف كثيراً من الهواء. ولأنه لا يتفاعل (خامل) فهو أكثر أماناً من الهيدروجين الذي يمكن أن ينفجر في الهواء. وقد استخدمت مناطيد الأرصاد الجوية المبينة أعلاه لحمل الأجهزة اللازمة لدراسة ثقب طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي عام 1990. وقد بلغ بعض المناطيد ارتفاع 18 ميلاً (28 كيلومتراً). ويستخدم الهليوم أيضاً في صنع صوت شخصية الرسوم المتحركة بطوط (Donald Duck) لأن موجات الصوت تنتقل بسرعة أكبر في الغاز الخفيف وعندما يستنشق الممثل الهليوم يصبح صوته حاد النبرة.



صخر الجرانيت



موقعها في الجدول الدوري

تقع الغازات الخاملة إلى يمين الجدول الدوري شديد (ص 23، 22) بعد عناصر الهالوجين. ولكل غاز قشرة خارجية كاملة من الإلكترونات مما يفسر عدم قابليتها للتفاعل وعدم اكتشافها في وقت مبكر عن ذلك.




بالونات مملوءة بالهليوم

مصادر الرادون

نلاحظ غاز الرادون - وهو أثقل الغازات الخاملة - في أول الأمر باعتباره الغاز الناتج عن تحلل عنصر الراديوم النشط إشعاعياً (ص 34، 35). وقد وجد أن بعض أحجار الجرانيت التي تستخدم لبناء المنازل تبعث منها كميات ضئيلة من الرادون ولكنها يمكن أن تراكم في المناطق الضيقة.

الغازات الخاملة




غاز الأرجون

فتيلة من التنجستين

اتصال بالتيار الكهربائي

استخدام الأرجون في مصابيح الإضاءة

لقد وجدت استخدامات عديدة للغازات الخاملة منذ اكتشافها وذلك بسبب عدم قابليتها للتفاعل. وكثيراً ما يستخدم الأرجون في التجارب للحصول على جو غير متفاعل (خامل) كما في هذا المصباح؛ لأنه لا يتفاعل مع الفتيلة المصنوعة من التنجستين حتى عند درجات الحرارة المرتفعة.



لافتات النيون

يضيء من النيون ضوء مائل للحمرة عندما يمر الكهرباء في أنبوب هوائي يحتوي عليه. ولذلك يستخدم هذا الغاز في إنتاج الإعلانات ذات الألوان الزاهية في مدينة لاس فيجاس. ويتم الحصول على مردود ضوئي عالٍ بالنسبة إلى الطاقة المستخدمة، ويستخدم غاز خامل آخر - وهو الزينون - ملء الأنابيب الفلورية وتزويد النارات بالضوء. وعلى الرغم من الاعتقاد بكونه غير قابل للتفاعل إلا أنه قد تم تحضير بعض مركبات الزينون مع الفلورين شديد التفاعلية (ص 26، 27) منذ عام 1962.

إضافة عناصر جديدة

صمم السير وليام كروكس طريقة خاصة به لتمثيل الجدول الدوري في هذا النموذج الحلزوني المفصل ذي الأبعاد الثلاثة في عام 1888 قبل اكتشاف الغازات الخاملة. وعلى الرغم من ذلك كان من السهل أن يوجد مجموعة العناصر الجديدة مكان ملائم عند منتصف الجدول.

الغازات الخاملة




في بداية تسعينيات القرن التاسع عشر، لم يكن يخطر ببال أحد أن هناك مجموعة منفصلة من الغازات في الجدول الدوري (ص 22-23) - وهي الغازات الخاملة (الغازات النبيلة). والغازات الخاملة مألوفة لنا بسبب استعمالها في لافتات النيون وبالونات الهليوم. وبحلول عام 1900 كان قد تم التعرف على هذه المجموعة الجديدة بأكملها وفصلها. وفي أثناء إجراء محاولة لتعيين الكتلة الذرية للنيتروجين بدقة اكتشف الفيزيائي البريطاني اللورد رايلي (1842-1919) أن النيتروجين المخضر من الأمونيا أخف من النيتروجين المستخرج من الهواء الجوي بشكل ملحوظ. وقد اشترك مع وليام رامزي (1852-1916) في دراسة نيتروجين «الجو» وعندما فصل النيتروجين منه حصل على كمية ضئيلة من غاز آخر. وبما أنه لم يتفاعل مع أي شيء فقد أطلق عليه اسم أرجون من الكلمة الإغريقية التي تعني كسولا. وتم اكتشاف الهليوم بعد ذلك بسنة عام 1895 وبعدها بدأ رامزي ومساعدته موريس ترافرز (1872-1961) البحث عن عناصر إضافية في هذه المجموعة. وكان السبيل إلى ذلك استخدام التقطير التجزيئي (ص 14-15) لكميات كبيرة من الهواء السائل والأرجون. وفي عام 1898 كللت جهودهما بالنجاح فقد قاما بتحضير الكريبتون والنيون والزينون.

التعرف على الهليوم

أثناء كسوف الشمس عام 1868 شاهد عالم الفلك الفرنسي بيير جانسن (1824-1907) خطأ طيفاً لونه أصفر ساطع. وقد اعتقد أن هذا يعني وجود عنصر جديد، سمي هليوم من الكلمة الإغريقية هليوس أي الشمس.

مضخة توبلر

استخدم رامزي وترافرز مضخة توبلر المبتكرة لطرد الهواء من جهازهما وجمع الغازات الخاملة. ويعزى اللون البنفسجي للزجاج إلى الإشعاع الناتج عن الرادون.



السير وليام رامزي

كان رامزي كيميائياً بريطانياً وقد اكتشف الأرجون بالاشتراك مع الفيزيائي لورد رايلي، وقد نال جائزة نوبل في الكيمياء عام 1904.



اكتشاف الأرجون

يكون النيتروجين معظم هواء الجو. وقد صمم رامزي هذا الجهاز لكي يمتص كل الغازات المعروفة من النيتروجين الجوي. مرر الهواء في البداية على نحاس مسخن للتخلص من الأكسجين، ثم مررت الغازات المتبقية خلال الجهاز الذي يزيل الرطوبة وأي أكسجين متبقٍ والمواد وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين ولم يبق في النهاية إلا واحد على ثمانين من حجم الغاز. وقد فحص رامزي هذا الغاز المتبقى بواسطة مطياف (ص 60-61) ووجد خطوط طيف جديدة لا تنتمي لأي غاز معروف حينئذ. وقد اشترك هو ورايلي في إعلان اكتشاف الأرجون في عام 1894.

هليوم من معدن المونازيت



هليوم من معدن الكليفيت



هليوم من معدن البتشيبلند



هليوم من معدن السمركيت



عينات الهليوم

بعد اكتشاف جانسن لعنصر في الشمس انطلق العلماء في البحث عن الهليوم على الأرض. وقد حصل عليه رامزي عن طريق غلي معدن الكليفيت مع الحمض الخفيف وعندما رأى الخط الأصفر الساطع في طيفه أدرك أنه مطابق للخط الذي شوهد في طيف الشمس في أثناء كسوفها عام 1868. وقد أرسل عيناته المينة هنا إلى السير وليام كروكس (ص 18-19) وعالم الفلك نورمان لوكير (1836-1920). وفي عام 1895 أثبتا أن الغاز هو الهليوم عن طريق التحليل الطيفي (ص 58-59).

وقود الصواريخ

يرتكز مكوك الفضاء على صهريج وقود ضخيم يحتوى على الهيدروجين السائل والأكسجين السائل في وعاءين منفصلين. ثم يخلطان بالنسب الموضوعة المضبوطة فيتفاعلان لينتجا الطاقة، ويحترق الهيدروجين في الأكسجين معطياً شعلة نظيفة فينتج الماء الذي يرى هنا على هيئة البخار.



قنبلة زجاجية

محلول نترات الرصاص

تحبس فقاعات الغاز في العجين فتتسبب في تمدده

الكيمياء في المطبخ

ننحكم الأنزيمات التي تعمل كمواد حفازة (ص 36، 37) في عملية صنع العجين

مثلاً يحدث في معظم التفاعلات الكيميائية التي تشمل الكائنات الحية. وتبدأ هذه الأنزيمات في العمل بمجرد أن يخلط العامل الرافع (أي الخميرة) بالماء الدافئ والسكر (والخميرة كائن حي يحتاج إلى الهواء والرطوبة لكي ينمو ويزوده السكر بالغذاء). وتنتج فقاعات من ثاني أكسيد الكربون، وعندما يضاف الخليط إلى الدقيق والماء لصنع العجين يرتفع العجين. وعندما يتم تسخينه ثورت الخميرة ويخيز العجين.



تترك المكونات في مكان دافئ

يصبح خليط الخميرة مزيجاً (ممتلئاً بالرغوة) عندما ينتج ثاني أكسيد الكربون




الكيمياء الحديثة

كان أرستو رذرفورد (1871-1937) أول شخص قام بقذف الذرات بالجسيمات لكي ينتج عناصر متحولة اصطناعياً. وقد وصف هذا الفيزيائي النيوزيلاندي الذرات بأن بها نواة مركزية تدور حولها الإلكترونات. وقد أثبت أن ذرات الراديوم تبعث «أشعة» وتحول إلى ذرات الرادون (ص 10). ويمكن اعتبار مثل هذه التفاعلات النووية على أنها تحولات - أي تغير عنصر إلى عنصر آخر - وهي العملية التي سعى إلى تحقيقها الكيميائيون عن طريق الوسائل الكيميائية (ص 12، 13) ولكن دون جدوى.



تكوين الرواسب

يذوب كل من ملح يوديد البوتاسيوم ونترات الرصاص في الماء ويكونان محاليل لا لون لهما. ولكن يوديد الرصاص غير قابل للذوبان ولذلك فإنه عند خلط محلولي المذبح يتسبب يوديد الرصاص الأصفر خارج المحلول. بينما يظل الناتج الآخر وهو نترات البوتاسيوم الذي لا لون له والذي يذوب في الماء في المحلول. ويطلق على هذا التفاعل تفاعل ترسيب لأن مادة صلبة غير قابلة للذوبان تتكون خلال التفاعل. ويقيد هذا النوع من التفاعلات في تكوين مركبات غير قابلة للذوبان - ويمكن أن يرشح الراسب الصلب ويغسل. ويمكن أيضاً استخدامه في التعرف على المواد الكيميائية المختلطة في مواد مجهولة (ص 58، 59)، ويمكن كتابة هذه المعادلة كالآتي:




يكون يوديد الرصاص راسباً أصفر

تحتوى الفارورة على محلول يوديد البوتاسيوم



التفاعلات الكيميائية



طبقة الأوزون

الأوزون غاز قابل للتفاعل يساهم في التلوث عندما يزداد في جو المدن. ولكن الأوزون الموجود في الستراتوسفير (بين اللون الأحمر هنا الحد الأعلى لتركيز الأوزون) يؤدي مهمة مفيدة وهي امتصاص الضوء فوق البنفسجي (UV) الصادر من أشعة الشمس وحجبه عن الأرض. وتفاعل بعض المواد الكيميائية التخليقية (الاصطناعية) خاصة الكلوروفلوروكربونات (CFCs) مع الأوزون مسببة ثقباً في طبقة الأوزون. وتسمح هذه الثقوب بمرور المزيد من الضوء فوق البنفسجي مما يؤدي إلى زيادة في معدل الإصابة بسرطان الجلد.



استخدام الضوء في التفاعل

تصنع النباتات الكربوهيدرات لبناء السيقان والجذوع والأوراق والجذور في عملية تسمى التمثيل الضوئي (ص50، 51). وفيها تأخذ النباتات الماء من التربة وتغذي أكسيد الكربون من الهواء الجوي وتستخدم طاقة ضوئية من الشمس لتحويلهما إلى كربوهيدرات. وهي تنتج أيضاً الأكسجين كمنتج جانبي تطلقه في الجو من خلال أوراقها.

تفاعل الإزاحة

عندما يغمر ملف من النحاس في محلول من أملاح الفضة يزيح النحاس الفضة في الملح. ويمكن للنحاس أن يحدث هذا الأمر لأنه يعلو الفضة في سلسلة تفاعلية الفلزات (ص24، 25). وفي هذا التفاعل تكون المواد المتفاعلة هي النحاس ونترات الفضة والمواد الناتجة هي نترات النحاس وفضة الفضة. ويطلق على هذا التفاعل اسم تفاعل الإزاحة لأن أحد الفلزين قد أزاح الفلز الآخر من محلول واحد من أملاحه (ص44، 45).

نترات الفضة الذائبة في الماء

يمكن أن تحدث التفاعلات الكيميائية بصورة طبيعية بدون تدخل بشري (ص8-9). وتحدث التفاعلات في الكائنات الحية من خلال استخدام بروتينات تسمى أنزيمات في تفاعلات حفازة مركبة (ص36-37). ويمكن للبشر أيضاً أن يجعلوا التفاعلات الكيميائية تحدث للحصول على بعض المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية. وعندما يحدث تفاعل كيميائي يعاد تنظيم الذرات وتتكون مواد كيميائية جديدة. وتسمى المواد التي يُبدأ بها في تفاعل كيميائي بالمواد المتفاعلة أي التي تتفاعل لتكون منتجات. وتحدث تغيرات في الطاقة في التفاعلات الكيميائية تأخذ في الغالب شكل حرارة. فإذا نتج عن التفاعل حرارة يقال إنه تفاعل طارد للحرارة (البوتاسيوم في الماء ص25) وإذا انخفضت الحرارة كان هذا تفاعلاً ماصاً للحرارة (تخليق الفلورين ص26، 27). وبعض التفاعلات الكيميائية تفاعلات عكسية؛ والبعض يصعب - إن لم يستحل - عكسه. وفي التفاعل الكيميائي يمكن تحضير أو تخليق مركب من عناصره. على سبيل المثال، يكون الحديد (ص20، 21) والكبريت كبريتيد الحديد عندما يسخنان معاً. ويمكن أيضاً أن ينكسر مركب ما إلى مكوناته - على سبيل المثال تسخين خامات المعادن للحصول على الفلزات.

1 المواد المتفاعلة

يغمر الملفان النحاسيان في قارورة تحتوي على أملاح الفضة الذائبة في محلول. والملح في هذا التفاعل هو نترات الفضة عديمة اللون.


سحابة من الفلزين

ملف من النحاس

قارورة زجاجية

2 طلاء الفضة

بمجرد أن يتلامس الملف النحاسي ومحلول الملح ترسب الفضة خارج المحلول - أي أنها تصبح مادة صلبة غير قابلة للذوبان ويمكن أن ترى على هيئة بلورات من الفلز عالقة بشريحة النحاس. ويتحول المحلول إلى اللون الأزرق لأن أيونات النحاس تزيح أيونات الفضة في المحلول لتنتج نترات النحاس. ويمكن كتابة المعادلة على الصورة التالية:




تنمو بلورات الفضة على الملف النحاسي

تتكون نترات النحاس الزرقاء في المحلول



الأنزيمات في أثناء عملها

تقوم الأنزيمات بتوجيه معظم التفاعلات التي تحدث في الكائنات الحية - والأنزيمات عبارة عن مواد حفازة بيولوجية. والأميلاز على سبيل المثال هو أنزيم يوجد في اللعاب يبدأ في تكسير جزيئات النشا من الطعام إلى وحدات من السكر ثمناً بالطاقة. ويبدأ هذا الأنزيم في العمل بمجرد وصول الطعام إلى الفم، والليوسوزيم هو أنزيم آخر يوجد في الدموع يهاجم جدران خلايا البكتيريا فيمنعها من تلويث العين.



3 هواء نظيف

في أثناء وصول الغازات إلى ماسورة العادم تكون أكاسيد النيتروجين قد أعيد تحويلها إلى نيتروجين ثانية بواسطة الروديوم (أحد فلزات البلاتين) ويكون البلاتين قد حفز المواد الهيدروكربونية وأول أكسيد الكربون لنتج بخار الماء وثاني أكسيد الكربون. ويمكن للمحول أن يزيل الملوثات بنسبة تبلغ 95٪ في حالة عمل المحرك بكفاءة.



استخدام الاحتكاك في التفاعل

تحتوي أعواد الثقاب التي «تشعل في أي مكان» على النوع الأحمر غير السام من الفوسفور (ص 27، 26) مع وجود الكبريت في رأس العود. وعندما يحك العود على سطح خشن يوفر الاحتكاك الطاقة التي تسبب اشتعال الفوسفور.

يتسبب الاحتكاك في اشتعال الفوسفور

صورة سلبية زجاجية (تسعينيات القرن التاسع عشر)



طبع الصورة

يمر الضوء من خلال الصورة السلبية الزجاجية على ورقة مطبوعة بمادة كيميائية أخرى - وهي كلوريد الفضة. ولا يصل الضوء إلى الورقة في المواضع المظلمة من الصورة السلبية وبالتالي لا ينشط ملح الفضة. ولكن الضوء ينشط ملح الفضة حيث تكون الصورة السلبية شفافة. وعندما تظهر الورقة وتثبت بالمزيد من المواد الكيميائية تتفاعل المساحات المنشطة فتعطي فضاء داكنة حيث كانت الصورة السلبية شفافة ومساحات فاتحة حيث كانت

الصورة السلبية داكنة.




2 هيكل قرص العسل

يوجد هيكل من الخزف على هيئة قرص النحل داخل غلاف من الصلب الذي لا يصدأ والذي يحتوي على أغول الحفاز. وقرص النحل هذا من الدقة بحيث يوفر مساحة سطح تبلغ ضعف مساحة ملعب كرة القدم تتم عليها التفاعلات الحفازة. وعلى الرغم من ندرة الفلزات الحفازة وارتفاع سعرها (يستخدم فلزات البلاتين) إلا أن تغليف قرص النحل بطبقة رقيقة يحتاج إلى 2 جرام فقط. ويكفي ذلك لتنظيف غازات العادم لمسافة 50-100000 ميل (أي 80-160000 كيلومتر).

ما الذي يحدث التفاعل الكيميائي؟

تحدث التفاعلات الكيميائية أحياناً تلقائياً بينما تحتاج تفاعلات أخرى للطاقة حتى تحدث. ويبدو كما لو أن المواد المتفاعلة عليها أن تقفز فوق حاجز حتى تصبح نواتج. وقد تعطى الحرارة الطاقة المطلوبة. ويمكن أن يزودها الضوء بالطاقة كما في عملية التمثيل الضوئي (ص 50، 51) وعندما تتفاعل الملوثات فإنها تتسبب في حدوث الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي فوق مدنا. وأحياناً ما تكون الطاقة الميكانيكية مسئولة عن حدوث التفاعلات. وعادة ما يكون الديناميت آمناً حتى يُفجر غالباً عن طريق التفجير بمفجر شديد الحساسية للصدمات. ويمكن أن تستحث التفاعلات بواسطة الطاقة الكهربائية، وتشكل هذه الطريقة الوسيلة العملية الوحيدة لاستخلاص الفلزات الأكثر تفاعلية مثل الصوديوم من مركباتها (ص 46، 47). وهناك طريقة أخرى لإحداث تفاعل وهي تخفيض الحاجز الذي ينبغي أن تقفز عليه المواد المتفاعلة. وهذا هو بالضبط ما تقوم به المواد الحفازة عن طريق توفير مسار مختلف وأكثر سهولة لتتخذ المواد المتفاعلة - أي أنها تخفض التفاعل. وكثيراً ما تتحد المواد الحفازة بإحدى المواد المتفاعلة فتسهل تفاعل مركب آخر معها. وتستخدم المواد الحفازة في الصناعة لكي تجعل للعمليات جدوى اقتصادية عن طريق إسراع التفاعلات.



آلة الضوء الضوئية

مصباح دوبرانير


لاحظ يوهان دوبرانير (1780-1849) في عام 1823 أن غاز الهيدروجين يشتعل في الهواء في وجود فلز البلاتين. وقد استغل هذا التفاعل الحفاز في آلة الضوء الجديدة التي ابتكرها. وعندما يُفتح الصنبور تتساقط قطرات حمض الكبريتيك على الزنك فيحدث تفاعل ينتج الهيدروجين. ويخرج الهيدروجين من الإناء حيث تسبب المادة الحفازة وهي البلاتين في اشتعاله مما يشعل المصباح الزيتي الصغير وكذلك السيجار.

تنظيف البيئة

تعتبر أبخرة عوادم السيارات مصدراً للتلوث؛ إذ تحتوي أبخرة العادم على غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون والغازات التي تساهم في إحداث الضباب الدخاني. وتقوم المحولات الحفازة بخفض كميات الغازات الخارجة من مواسير عادم السيارات. وتحتوي هذه المحولات على فلزات ثمينة - وهي بمثابة المواد الحفازة - التي تخفض التفاعلات التي تحول تلك الغازات إلى غازات غير ضارة. ومن السهل أن تتسمم المواد الحفازة، والرصاص هو أحد هذه السموم ولذلك فلا يمكن أن تتركب المحولات الحفازة إلا في السيارات التي تستخدم البنزين الخالي من الرصاص.

1 النواتج السامة

عندما يحترق البنزين فإن المواد الرئيسية الناتجة عن عملية الاحتراق هي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. وتتكون أيضاً أكاسيد النيتروجين (يتفاعل بعض النيتروجين الجوي عند درجات الحرارة العالية للمحرك) وأول أكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق غير الكامل للمواد الهيدروكربونية وكذلك بقايا من المواد الهيدروكربونية غير المحترقة. تمر هذه الغازات مباشرة من المحرك إلى المحولات الحفازة.



تمر الغازات مباشرة من المحرك إلى المحولات الحفازة



مبدأ لوشاتيليه


كان هنري لوى لوشاتيليه (1850-1936) أستاذاً فرنسياً للكيمياء. وقد درس الغازات التي تسبب انفجارات المناجم وكذلك التفاعلات التي تتم في الفرن العالي (ص 40، 41). وقد أدت به هذه الدراسات إلى أن يعلن المبدأ الذي يحمل اسمه. وبين هذا المبدأ أنه إذا حدث تغير في ظروف مثل درجة الحرارة أو الضغط في نظام ما يحتوى على مواد متفاعلة ومواد ناتجة فإن أى تفاعل كيميائى يحدث نتيجة لإبطال هذا الصغير وإعادة الظروف لحالة الاتزان.



هنرى لوشاتيليه

المساعدة فى المجهود الحربى

نجح الكيميائى الألمانى فريتز هابر (1868-1934) فى صنع الأمونيا من غازى النيتروجين والهيدروجين باستخدام الأوزميوم كمادة حفازة (ص 36، 37). وقد كانت مادة نترات الصوديوم تستخدم لتحضير حمض النتريك اللازمة لتصنيع المتفجرات. وفى أثناء الحرب العالمية الأولى انقطعت إمدادات ألمانيا من نترات الصوديوم الآتية من شيلي. ولكنه كان من الممكن أكسدة الأمونيا لتصبح حمض النتريك وبالتالى فقد أمنت عملية هابر الجديدة استمرار إمدادات المتفجرات. وقد استخدم هابر مبدأ لوشاتيليه لمعرفة أفضل ظروف درجة الحرارة والضغط. ولا يتحد إلا حوالى 10-20 بالمائة من النيتروجين والهيدروجين وبالتالى يعاد تدوير الغازين.



فريتز هابر

تفاعلات قابلة للعكس

يمكن أن يتجه التفاعل التقابل للعكس لأى من الاتجاهين. ويمكن أن تتفاعل المواد الناتجة التي تكون في أثناء التفاعل بعضها مع بعض فتعيد تكوين المواد المتفاعلة. وتثبت هذه التجربة أن تكوين أيونات ثاني الكرومات من أيونات الكرومات قابل للعكس.

1 مادة مفاعلة

تذوب كرومات البوتاسيوم فى الماء لتكون محلولاً أصفر زاهياً يحتوى على أيونات البوتاسيوم والكرومات.



كرومات البوتاسيوم المذابة فى الماء

2 التفاعل

يضاف حمض الهيدروكلوريك إلى كرومات البوتاسيوم فقطرة فقطرة. فيبدأ انحلال فى التحول إلى اللون البرتقالى الزاهى فى أثناء إحداث الحمض للتفاعل الكيميائى حيث تتحول أيونات الكرومات فى المحلول إلى أيونات ثاني الكرومات برتقالية اللون فتصنع ملحاً آخر هو ثاني كرومات البوتاسيوم.

فقطرة من حمض الهيدروكلوريك

ماصة



بإضافة الحمض يتحول لون المحلول إلى البرتقالى

3 التفاعل العكسى

يضاف هيدروكسيد الصوديوم وهو قاعدة (ص 42، 43) نقطة نقطة لإزالة الحمض عن طريق معادته. ويبدأ المحلول فى العودة إلى اللون الأصفر الزاهى حيث تتكون الكرومات مرة أخرى. وقد اضطرب الاتزان بسبب تغير كمية إحدى المواد المتفاعلة.

فقطرة من هيدروكسيد الصوديوم

ماصة

يعادل هيدروكسيد الصوديوم الحمض



معدلات التفاعل



التفاعل الفوري

تبدأ عروض الألعاب النارية الباهرة بحرق البارود وهو تفاعل سريع للغاية. وهذا التفاعل طارد للحرارة (ص 34) بشدة بحيث يعطي كمية من الحرارة تكفي لكي تسبب البعثات الألوان المميزة من ذرات الفلزات (ص 58, 59).

تفاعل يستغرق سنوات


على الرغم من كون النحاس مقاوماً جيداً للتآكل فإنه يتفاعل ببطء مع الرطوبة وثاني أكسيد الكربون الموجودين بالهواء مكوناً الكربونات الخضراء الممبأة. وكثيراً ما نرى هذه الطبقة الخضراء على الأسطح النحاسية. وتتكون أيضاً كبريتات النحاس القاعدية في المناطق الصناعية وذلك لوجود ثاني أكسيد الكبريت في الهواء (ص 6).

زيادة سرعة التفاعل


عندما يضاف حمض الهيدروكلوريك إلى شرائح الرخام (شكل من كربونات الكالسيوم يوجد طبيعياً)، تنتج فقاعات من غاز ثاني أكسيد الكربون. ويتفاعل الحمض عندما يلامس سطح الرخام. فإذا طحن الرخام حتى يصبح مسحوقاً دقيقاً تزداد مساحة سطحه ازدياداً كبيراً ويسرع التفاعل إلى درجة أن تجعل الفقاعات تسبب في أن تقور المواد المفاعلة وتفيض.

تصعد فقاعات ثاني أكسيد الكربون إلى السطح بهدوء

شرائح الرخام




كأس زجاجي



الرخام المسحوق

تصعد فقاعات الغاز بسرعة مما يسبب فيضان وانسكاب المواد المفاعلة



يتفاعل السطح الخارجي فقط لشرائح الرخام مع الحمض


أخذ استراحة

يزدى مجهود الشاق ونقص الأكسجين إلى إنتاج حمض اللبنيك في العضلات. وكلما ازدادت كمية حمض اللبنيك في الدم ينتج الإجهاد. وتتيح الراحة وتوافر الأكسجين التخلص من هذا الحمض وتأكيده في الكبد.



الصلب الأمريكي

ابتكر المهندس الأمريكي وليام كيلبي (1811-1888) طريقة مشابهة لطريقة بسم لصنع الصلب في الولايات المتحدة. وقد أدرك أن نفخ الهواء خلال الحديد الخام المصهور يرفع درجة الحرارة بما يكفي لإحراق الشوائب الموجودة في الحديد بدون الحاجة لاستخدام المزيد من الوقود.



وليام كيلبي

المواد الحافظة للطعام

يعزى فساد السمن الصناعي «المرجرين» والدهون الأخرى إلى تفاعلات الأكسدة التي يسببها أكسجين الهواء. ويمكن إطالة فترة صلاحية الدهون إذا استخدمت مواد حافظة خاصة مضادة للأكسدة. وقد استخدمت مضادات الأكسدة في الطهي منذ آلاف السنين. وتحتوي بعض التوابل والأعشاب مثل المريمية وحصي البان على مركبات تمنع حدوث تفاعلات الأكسدة وكذلك تحجب الروائح الكريهة.

المريمية




حصي البان

2 صهر الحديد

يُمال المحول إلى الوضع الرأسى وتحقن في أسفله دفعة من الهواء. يؤكسد أكسجين الهواء بعض الحديد ليصبح أكسيد الحديد في تفاعل يعطى كمية كبيرة من الحرارة. وبهذه الطريقة يظل الحديد في الحالة المنصهرة. ثم تتفاعل الشوائب مثل السيليكون مع الأكسيد فتختزل مرة أخرى إلى الحديد بينما تتأكسد الشوائب نفسها في تفاعل أحسدة، ويحرق الكربون ليعطى غاز ثاني أكسيد الكربون. ويسكب الحث المنصهر المحتوى على الشوائب عند إمالة المحول مرة أخرى تاركاً القلزمقى.

صدأ المراكب

تشكل أكسدة الحديد والصلب مشكلة رئيسية في الصناعة. ولابد من وجود كل من الهواء والرطوبة لتكوين الصدأ. وهو أكسيد حديد مائياً. في سلسلة معقدة من تفاعلات الأكسدة. ويمكن حماية الحديد الهيكلي من الأكسدة عن طريق دهنه بالطلاء بينما يستخدم الزيت في الآلات. وهناك طريقة أخرى تستخدم تفاعلاً كيميائياً كهربائياً (ص 47، 48).



محول رأسى لتلقى تيار هوائى

مقبض تدوير المحول


يحقن التيار الهوائى من هنا

التأكسد والاختزال

عندما يتحد الأكسجين مع مادة مفاعلة (ص 34، 35) يحدث تفاعل أكسدة وكثيراً ما يسبب أكسجين الهواء التأكسد، إما بسرعة عن طريق حرق المواد أو ببطء أكثر في تفاعلات مثل الصدأ. ويسمى نزع الأكسجين من مادة مفاعلة اختزالاً. واستخلاص الحديد من أكاسيده (مركبات تحتوي على الحديد والأكسجين) في خام الحديد عبارة عن تفاعل اختزال. فإذا تأكسدت مادة مفاعلة بينما اختزلت الأخرى يسمى تفاعل أكسدة (اختزال - أكسدة). ويعد نقل الهيدروجين من مركب ما أيضاً نوعاً من التأكسد: يتم الحصول على الفلورين عن طريق أكسدة فلوريد الهيدروجين (ص 26، 27). وإضافة الهيدروجين عبارة عن تفاعل اختزال. ويحدث ذلك في أثناء هدرجة الدهون لصنع السمن الصناعي (المرجرين) (ص 7). والأكسدة أحد أسباب الفساد التدريجي للأطعمة؛ إذ يتحول السطح المقطوع للتفاحة بسرعة إلى اللون البني عند تعرضه للهواء.



توفير الضوء للتصوير الفوتوغرافي
أنتج فلز الماغنسيوم تجارياً منذ ستينيات القرن التاسع عشر على هيئة سلك أو شريط. ويحترق هذا الفلز في الهواء بسهولة حيث يتأكسد ليصبح أكسيد الماغنسيوم. وكان يستفاد من هذا اللهب الأبيض الساطع في التصوير الفوتوغرافي لتوفير الإضاءة في الاستديو.



يصب الحديد الخام المصهور هنا

الغلاف القوي الذي الصلب للمحول

بطانة مصنوعة من طوب السيليكا الحراري لكي تتحمل الحرارة

طريقة بيسمر

تحتاج معظم الفلزات المنتجة عن طريق اختزال خاماتها إلى المزيد من التنقية. وينتج الحديد عن طريق اختزال خامات الحديد (التي غالباً ما تكون أكاسيد) باستخدام فحم الكوك في فرن عالي. ويحتوي الحديد الخام الناتج من أتون الصهر بالدرجة الأولى على الكربون والسيليكون والفوسفور. وقد أحدث ابتكار طريقة بيسمر ثورة بتحويل هذا الفلز الهش إلى الصلب عام 1857. ولكن خام الحديد في بعض المناطق كان يحتوي على كميات كبيرة من الفوسفور لا يتسنى إزالتها كلها بطريقة بيسمر. وفي عام 1878 اقترح عالم الفلزات سيدني توماس تطبيق الخول بمادة الدولوميت (إحدى خامات الكربونات) التي تتفاعل مع الفوسفور لتكون الفوسفات الذي يمتص في البطانة.

السير هنري بيسمر

أحدث المهندس البريطاني بيسمر ثورة في عملية تحويل الحديد الزهر مباشرة إلى صلب عن طريق حرق الشوائب في محول الصلب الذي ابتكره. وقد تسببت العملية الأكثر إيجازاً والأقل في تكلفة الإنتاج في جعل الصلب متوافراً بسهولة بكميات كبيرة لأول مرة.



1 تحميل الفرن

يملأ الخول بحوالي 30 طنًا من الحديد الخام المصهور بالإضافة إلى مواد مساعدة على الصهر مثل الحجر الجيري والفلوريت للمساعدة على انتزاع الشوائب على هيئة غيب منصهر. وقد كانت هذه العملية تتم في البداية في محول ثابت، وقد ابتكر هذا الخول المتحرك ذو الكفاءة الأعلى والذي يمكن إمالة ليعلى الفلز في عام 1860.

العلوم الجنائية

دائمًا ما تبادر الكيمياء إلى مساعدة خبراء المعامل الجنائية عند حل الجرائم. ويمكن قياس الرقم الهيدروجيني (PH) لعينات من التربة المتلصقة بحذاء المشتبه به أو ربما بإطار سيارة حتى يمكن مقارنتها بالتربة المأخوذة من مسرح الجريمة. وتخلط عينات من التريتين جيدًا مع ماء مقطر (متعادل الرقم الهيدروجيني) ثم يتم ترشيحها. وتغير قطرات من محلول كشاف شامل اللون طبقًا للحموضة. ثم يقارن هذا اللون باللون المخطط لإيجاد الرقم الهيدروجيني للتريتين بدقة.

التعرف على الأحماض

فاز العالم السويدي سفانتس أرهينيوس (1859-1927) بجائزة نوبل عام 1903 عن دراساته حول التأين. فقد ابتكر فكرة أن المركبات تتفكك أو تنقسم إلى الأيونات المكونة لها في المحلول. وقد شرح كيف أن قوة الأحماض في المحاليل المائية تعتمد على تركيز أيونات الهيدروجين فيها.



سفانتس أرهينيوس

تحتجز ورقة الترشيح جسيمات التربة الصلبة

ماء مقطر به مواد من التربة قابلة للذوبان

يحول الكشاف الشامل لون المحلول إلى البرتقالي. أي أن التربة معتدلة الحمضية

عينة التربة المخلوطة بالماء المقطر

محلول الكشاف الشامل

فقارة

المنظفات

يصنع الصابون عن طريق تفاعل بين الأحماض العضوية وقاعدة قوية. ويكون الصابون معتدل القاعدية برقم هيدروجيني 8-9 لأن الأحماض العضوية ضعيفة.

ماء الشرب

الرقم الهيدروجيني لمياه الصنبور هو 6. ويتغير مع تغير المنطقة ولكنه يكون حمضيًا بدرجة طفيفة في العادة بسبب المواد الذائبة فيه. والماء النقي متعادل عند رقم هيدروجيني 7-8.

منظف منزلي

تغير قوة المنظفات المنزلية تبعًا للغرض من استعمالها. وتحتوي منظفات الأفران على اللاي (غسول قلوي). وهذا المنتج يحتوي على الأمونيا ورقم الهيدروجيني 10.

منظف منزلي

صابون سائل

ماء الصنبور

الأحماض والقواعد



علاج أساسي

تعد لسعة النحل حمضية وبالتالي يمكن تخفيف الألم بواسطة بيكربونات الصودا أو الأمونيا وهما قلويات. وعلى الرغم من أن ضحية لسع الدبور يشعر بالألم نفسه فإن هذه السعة قلوية ويمكن تخفيف ألمها بمعالجتها بالخل الذي يحتوي على حمض.

توجد الأحماض في الطبيعة في الفواكه: وحمض الستريك مثلاً مسئول عن طعم الليمون اللاذع (ص 9). ويحتوي الخل على حمض الخليك، ويستخدم حمض التانيك المستخرج من لحاء الشجر في دباغ الجلود (ص 11). وقد تم تحضير الأحماض المعدنية الأكثر قوة منذ العصور الوسطى وقد استخدم محللو المعادن أحدها وهو ماء الفضة (حمض النتريك) لفصل الذهب عن الفضة (ص 12، 13). وتحتوي بطاريات السيارات على حمض الكبريتيك وهو أيضاً قوي ويحدث تآكلاً. والقاعدة هي عكس الحمض. وكثيراً ما يكون ملمس القواعد زلقاً؛ ويكربونات الصودا والصابون قاعدتان وكذلك مادة اللاي - وهي مادة يمكنها حرق الجلد. وتسمى القواعد القابلة للذوبان في الماء قلويات. وتنتج الأحماض في الماء أيونات الهيدروجين (ص 20، 21) بينما تنتج القلويات أيونات الهيدروكسيد. وعندما يتفاعل حمض مع قاعدة تتحد أيونات الهيدروجين مع أيونات الهيدروكسيد فيعادل كلاهما الآخر ويكونان الماء بالإضافة إلى ملح (ص 44، 45). ويمكن قياس قوة الأحماض

والقواعد على مقياس الرقم الهيدروجيني (PH).

انقسام الماء

الماء النقي ليس حمضياً ولا قاعدياً، إنه متعادل، ويمكن أن ينقسم (يتفكك) إلى أيونين: أيون الهيدروجين (H^+) موجب الشحنة وأيون الهيدروكسيد (OH^-) سالب الشحنة. وفي محاليل الأحماض يوجد عدد من أيونات الهيدروجين يزيد على عدد أيونات الهيدروكسيد. بينما يزيد عدد أيونات الهيدروكسيد في محاليل القلويات على أيونات الهيدروجين.

جزء الماء
 H_2O

أيون الهيدروجين
 H^+

اختيار اللون

كثيراً ما تكون المركبات المستخلصة من ألوان النباتات حساسة للأحماض والقلويات. ولا تنمو زهرة الكوبية الزرقاء إلا في التربة الحمضية أما في التربة المتعادلة أو القلوية فإن لونها يعود للون الوردي.

أيون الهيدروكسيد
 OH^-

الأحماض القوية

الرقم الهيدروجيني لحمض الهيدروكلوريك الخفيف هو واحد مثل الأحماض المعدنية الأخرى كحمض الكبريتيك وحمض النتريك.

الطعم اللاذع

يحتوي الخل على حمض الخليك. وينتج هذا الحمض أيضاً عند تعرض التبيد للهواء. ورقم الهيدروجيني حوالي 4.

لون زهرة الكوبية أزرق في التربة الحمضية

كوبية وردية اللون من التربة القلوية

شفرة الألوان

ابتكر س. ب. ل. سورينسن (1868-1939) مقياس الرقم الهيدروجيني (PH) لقياس تركيز أيونات الهيدروجين في محلول ما. وكلما زاد عدد أيونات الهيدروجين كان الحمض قوياً. ويمكن أن تؤثر كمية أيونات الهيدروجين في المحلول على لون بعض الأصباغ الموجودة في الطبيعة. ويمكن أن تستخدم هذه الأصباغ ككاشفات لاختبار الأحماض والقلويات. وكاشف مثل صبغة عباد الشمس (التي يحصل عليها من نبات الأشنة) ويتحول إلى اللون الأحمر في الحمض. فإذا أضيفت قاعدة ببطء يتحول إلى اللون الأزرق عندما يعادل الحمض عند حوالي 7-8 على مقياس (PH). ويتغير لون كاشفات أخرى لونها عند قيم أخرى على مقياس الرقم الهيدروجيني (PH). وتستخدم مجموعة من الكاشفات المختلفة لصنع دليل شامل. وقد استخدمت هنا أوراق الكاشف الشامل على مدى رقم هيدروجيني من 2-11 (تقريباً بعض الأوراق من صفير-14). ويبدأ القياس باللون الوردي للأحماض القوية عند رقم هيدروجيني يقل عن 2 ثم تمر الأوراق عبر ألوان مختلفة إلى اللون الأخضر عند التعادل أي عند رقم هيدروجيني 7 ثم تتغير إلى اللون البنفسجي القاتم بالنسبة للقلويات القوية عند عدد هيدروجيني 11 أو أكثر.

خل

حمض الهيدروكلوريك

لوحة بيانية لأوراق الكاشف الشاملة




سدادة محكمة الغلق
لمنع تسرب الهواء

منشور من
الملح الصخري

جل السيليكا

كبريتات النحاس



نترات
النحاس

المحافظة على جفاف المنشور

صنع المنشور الموضوع في هذا الجفاف من مادة الملح الصخري ويستخدم في التحليل الطيفي (ص 59). ويجب أن يبقى جافاً تماماً ولا فُسوف يتحلل. ويُحافظ على جفاف الجو باستخدام جل السيليكا وهو شكل مائياً من ثاني أكسيد السيليكون ينص الماء بكفاءة شديدة. ويلون باللون الأزرق بواسطة ملح آخر هو كلوريد الكوبالت الذي يتحول إلى اللون الوردي في وجود الماء.



هيدروكسيد
النحاس



كربونات
الصوديوم

الحجر
الجيري

الرمل




كلوريد النحاس



كربونات النحاس

مكونات الزجاج

يصنع الزجاج من عدة أملاح. والمكون الرئيسي للزجاج هو ثاني أكسيد السيليكون على هيئة الرمل. ويضاف الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم) وكربونات الصوديوم أيضاً لصنع زجاج الصودا العادي الذي يستخدم لصنع الزجاجات. ويعزى لون الزجاج القديم المائل للخصرة الخفيفة (ص 13) لوجود شوائب من الحديد في الرمل. ويمكن إضافة أملاح فلزات أخرى للخلط لصنع أنواع الزجاج الملون.



تكوين الأملاح



ملح الطعام

يسمى كلوريد الصوديوم بالملح الشائع أو ملح الطعام. ويضاف إليه مقدار ضئيل من ملح آخر قابل للأكل - كربونات الماغنسيوم - للمساعدة على انسيابه.

يمكن تحضير الأملاح عن طريق خلط حمض بقاعدة (ص 42، 43) أو بفلز. فإذا كان الحمض هو حمض الكبريتيك سمي الملح كبريتات، ويكون حمض الهيدروكلوريك أملاحاً تسمى كلوريدات؛ ويكون حمض النتريك أملاحاً تسمى نترات. والأملاح مركبات أيونية (ص 20، 21) تتكون من أيون موجب - عادة ما يكون فلزاً وأيوناً سالباً - قد يكون لافلزياً أو قد يكون مجموعة من الذرات المترابطة معاً. وربما يكون أكثر الأملاح شهرة هو كلوريد الصوديوم - وهو جزء مهم في نظامنا الغذائي. وليست كل الأملاح غير ضارة فقد استخدمت أملاح الثاليوم (ص 18، 19) كسم للجردان. وإذا أتيح للأملاح أن تتكون ببطء تصبح بلورات منتظمة الشكل. وبعضها يذوب في الماء والبعض الآخر لا يذوب. ويمكن أن تستخدم قابليتها للذوبان لمعرفة أي الفلزات توجد في المواد (ص 58، 59). وتأخذ بعض الأملاح الماء من الهواء وتوصف بأنها مائعة. وتفقد بعض الأملاح الماء الملتصق بها تدريجياً وتوصف بأنها مزهرة (صودا الغسيل). وأحياناً تخرج الأملاح من المحاليل بطرق غير مناسبة؛ إذ تنسد الغلايات وأنابيب التدفئة المركزية بأملاح الكالسيوم والماغنسيوم في المناطق التي يكون الماء بها عسراً.



ياقوت



زمرد

شوائب ثمينة

الزمرد في الأساس هو معدن البريل الذي لا لون له. ويعزى لونه الأخضر إلى وجود كميات ضئيلة من الملح الأخضر (أكسيد الكروم). ويتكون الباقوت بصفة رئيسية من أكسيد الألومنيوم على هيئة الكورندم (معدن طبيعي صلد). والكورندم النقي لا لون له ولكن لون الباقوت الأحمر يأتي من ملح الكروم نفسه لأنه يدخل عنوة إلى الهيكل البلوري للكورندم مسبباً إزاحة طفيفة لطيفته.

أملاح من النحاس

يكون فلز النحاس مثل سائر الفلزات مجموعة شديدة التنوع من الأملاح. ويمكن تحضير أملاح النحاس المينة هنا بطرق عديدة مختلفة. ويمكن تحضير أكسيد النحاس (CuO) عن طريق تسخين الفلز مع الهواء. وهو يستخدم كصيغة أو خضاب. ويعطى ملح كربونات النحاس (CuCO₃) ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النحاس عند التسخين، واللون الأخضر الذي يظهر على الأسطح النحاسية شكل من أشكال كربونات النحاس (ص 38). ويزدوب كلوريد النحاس (CuCl₂) في الماء ويستخدم كمادة حفازة. ويخرج هيدروكسيد النحاس (Cu(OH)₂) من المحلول عند إضافة مادة قلوية للأملاح النحاس القابلة للذوبان. ويكون كبريتات النحاس (CuSO₄·5H₂O) بلورات مائية (أي تحتوي على جزيئات الماء)، وتستخدم في الزراعة كمبيد للفطريات. وتعد نترات النحاس (Cu(NO₃)₂) شديدة القابلية للذوبان حتى إنها تأخذ الماء من الهواء وتذيب نفسها.


تحتجز أيونات الفلز الموجبة وتستبدل بها أيونات الهيدروجين (H⁺)

تحتجز الأيونات السالبة وتستبدل بها أيونات الهيدروكسيد (OH⁻)



تتحد أيونات H⁺ و OH⁻ لتكون الماء H₂O

مياه معالجة



يحتجز الغطاء المواد الصلبة المحمولة في الماء

يزيل راتينج التبادل الأيوني الأيونات الموجبة والسالبة

يمتص الضخم الملوثات العضوية مثل المبيدات

الترشيح النهائي لأي مواد صلبة متبقية ومحمولة في الماء

تنقية الماء

يحتوي ماء الصنبور على عدد من الشوائب التي تفسد طعمه وتسبب في تكوين القشور في الغلايات وفي تكوين الزبد مع الصابون. والعديد من الشوائب عبارة عن أملاح يمكن التخلص منها عن طريق عملية تسمى التبادل الأيوني. يستخدم فيها راتينج مكون من خرز صغير من البلاستيك ترتبط بسطحه أيونات تقوم باستبدال أيونات الهيدروجين بأيونات الفلز الموجبة مثل الألومنيوم والكالسيوم وتستبدل أيونات الهيدروكسيد بالأيونات السالبة مثل النترات؛ وتتكون أيونات الهيدروجين والهيدروكسيد الماء.



قشور نحاسية



أكسيد النحاس


تنقية النحاس

يستخرج النحاس في الغالب من كبريتيدات النحاس وهو خام للنحاس يحتوي على الحديد والكبريت. يسحق الخام ويضاف إلى ماء مخلوط بالزيت به زبد للتخلص من الحصى. ثم يجفف ويحمص لإزالة الحديد ويحول المزيد من التسخين مع الهواء كبريتيد النحاس إلى نحاس يصب في قوالب وينقى بالتحليل الكهربائي. وتبين هذه التجربة التي أجريت في كأس مبادئ عملية التنقية هذه.




شرايح فلز الألمنيوم

الألمنيوم فلز متوافر بكثرة لكن استخراجه من خاماته صعب لأنه مترابط بشدة (ص 20، 21). وينتج عن طريق التحليل الكهربائي من معدن البركسيت المصهور أو أكسيد الألمنيوم (ص 18) والألمنيوم يحتل موقعا عاليا في سلسلة التفاعلية (ص 25). وتستخدم هذه العملية كمية كبيرة من الكهرباء.



هاميلتون كاستنر (1859-1899)

أسس المخترع الأمريكي كاستنر شركة لاستخلاص فلز الألمنيوم من كلوريد الألمنيوم باستخدام الصوديوم قبل ظهور عملية أفضل - وهي التحليل الكهربائي. ومع ذلك فقد كون ثروة لأنه أنشأ عملية إلكترونية لتحضير هيدروكسيد الصوديوم النقي من محلول ملحي باستخدام خلية زيتيق سائلة وذلك للحصول على الصوديوم.



قضيب من الماغنسيوم يوضع عادة قريب السطح لسهولة الاستبدال

الوقاية من الصدأ

يمكن أن تصدأ المستودعات المصنوعة من الصلب تحت الأرض (ص 40، 41) ولكن استبدالها مكلف. ولذلك تتم حمايتها من التآكل باستخدام تفاعل كيميائي كهربائي يعرف باسم الوقاية الكاثودية، حيث يوصل قضيب من الماغنسيوم بالصلب باستخدام سلك من النحاس وهو موصل جيد للكهرباء ولا يتآكل. والماغنسيوم أكثر تفاعلية من الصلب (ص 24، 25) فيتآكل بدلاً منه.

1 التوصيل بالكهرباء

توصل شريحة النحاس غير النقية بالطرف الموجب لمصدر الكهرباء، لتصبح قطباً موجياً (مصعداً) بينما توصل شريحة النحاس النقية بالطرف السالب لمصدر الكهرباء فهي قطب سالب (مهبط). وعمل الكأس بالإنكتروليت - محلول كبريتات النحاس - وتقل الكهرباء خلال المحلول بواسطة الأيونات.

القطب السالب (المهبط)

القطب الموجب (المصعد)

القطب السالب (المهبط)

سلك يحمل التيار الكهربائي

يدوب القطب الموجب (المصعد) المصنوع من النحاس غير النقي

2 الفلز المنقى

عندما توصل الكهرباء يمر تيار خلال الإنكتروليت. وعند المصعد يدوب النحاس غير النقي مكوناً أيونات النحاس ويقل سمك المصعد. تتحرك أيونات النحاس إلى المهبط فتتحول إلى الفلز وبذلك يترسب النحاس على شريحة النحاس النقي مما يزيد من سمكها. وتكون الشوائب الآتية من المصعد رواسب. وهذه الرواسب أيضاً قيمة لأنها تحتوي على كميات ضئيلة من الفضة والذهب التي يمكن أن تستخلص.

محلول كبريتات النحاس (الإنكتروليت)

يترسب النحاس النقي على المهبط

شوائب من المصعد النحاسي

الكهرباء والكيمياء

تستخدم المواد الكيميائية لإنتاج الكهرباء ويمكن أن تنتج الكهرباء المواد الكيميائية. فقد نجح اليساندرو فولتا عام 1800 في الحصول على الكهرباء من خلال أول بطارية باستخدام فلزات مختلفة تفصلها محاليل أملاح. وقد بدأت دراسات تأثيرات إمرار الكهرباء من هذه البطاريات خلال المحاليل (الإلكتروليتات) على الفور. وقد وجد أن مرور تيار كهربائي خلال الماء يفصله إلى غازي الهيدروجين والأكسجين، العنصرين اللذين يكونان الماء. وقد بين مايكل فاراداي (1791-1867) أن الماء النقي لا يوصل الكهرباء جيدًا، ولكن توصيله يزداد إذا أضيفت إليه الأملاح. والسبب في ذلك هو أن الكهرباء تنتقل عن طريق الأيونات الموجودة في المحلول والماء موصل أو إلكتروليت رديء لأنه متأين بصورة طفيفة فقط (ص 20، 21). والأملاح والأحماض والقواعد (ص 42-45) إلكتروليتات جيدة. وتستخدم الكهرباء أيضًا لإنتاج المواد الكيميائية في الخلايا الإلكتروليتية ولتنقية المواد.



قرص الزنك
قرص من الكروتون منقوع في محلول ملحي
قرص النحاس

البطارية الأولى

لاحظ العالم الإيطالي اليساندرو فولتا (1745-1827) أنه إذا تلامس فلزان ينجع «طعم مر» عندما يلمسان لساقه. وقد تأكد له من خلال إجراء المزيد من التجارب أن السبب في ذلك هو التيار الكهربائي. وقد وجد فولتا أنه يمكنه توليد الكهرباء بوضع طبقة من الكروتون المنقوع في محلول ملحي بين قرص من النحاس وآخر من الزنك - أي خلية قلوية. وعندما صنع «عمودًا» من هذه الخلايا زادت كمية الكهرباء المتولدة. وكانت هذه أول بطارية - مجموعة من الخلايا.



رائد التحليل الكهربائي

سرعان ما بدأ همفري ديفي (1778-1829) في دراسة الكيمياء الكهربائية بعد اكتشاف الخلية الفلصية. وقد نجح في استخلاص فلزي الصوديوم والبوتاسيوم من هيدروكسيداتهما والتي قاومت من قبل كل محاولات تكسيرها إلى مواد أكثر بساطة. وقد فصل ديفي أيضًا فلزات أخرى مثل الإسترونسيوم (ص 25) عن طريق التحليل الكهربائي.

مشبك من الصلب
طبقة من النحاس
طبقة من النيكل
اللمسة الذهبية الأخيرة

طلاء الفلزات

يستخدم التحليل الكهربائي لإضفاء شكل نهائي جذاب ومثني على الفلزات. وتتضمن اللمسة الذهبية الأخيرة تشييك القلم هذا عدة مراحل. يعلق المشبك الصلب من الكاثود (الطرف السالب أو المهبط) ثم يغمس في الإلكتروليت (سيانيد النحاس). يقوم السيانيد بتنظيف الصلب بينما توفر طبقة النحاس قاعدة أفضل للمزيد من التحليل الكهربائي. وتضمن طبقة طلاء النيكل منتجًا نهائيًا لامعًا وتحسن مقاومته للتآكل. وآخر طبقة هي طبقة الطلاء الذهبي.



عمود فولتاني

بطارية قديمة

انقسام الملح


يعتبر التحليل الكهربائي للمحلول الملحي (كلوريد الصوديوم المركز) عملية صناعية رئيسة. تستخدم هذه الخلايا الضخمة لتحرير التيار خلال المحلول الملحي. وتنتج النواتج الكيميائية وهي غازا الكلور والهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم (اللاي).

تيار ينساب

تحتوي هذه البطارية القديمة على أقطاب من الزنك والنحاس مغموسة في كاسات تحتوي على محلول ملحي (الإلكتروليت). وعندما توصّل الأقطاب يدرب الزنك فيفقد إلكترونات بينما تكتسب أيونات الهيدروجين عند القطب (الإلكترود) النحاسي الإلكترونات لتكون غاز الهيدروجين. وتسبب هذه التفاعلات في انسياب التيار.

سلسلة الكربون

يكون الكربون بسهولة روابط لنفسه وللعناصر الأخرى مؤدياً إلى تكوين تشكيلة ضخمة من المركبات. يظهر في الأسفل الصيغة التركيبية (ص 20) لحمض اللينيك ($C_{18}H_{34}O_2$). ويحتوي حمض الأوليك ($C_{18}H_{34}O_2$) الذي يوجد في زيت الزيتون على سلسلة من 18 ذرة كربون مما يجعله أطول ست مرات.



حمض اللينيك

أنبوب توصيل

سدادة

حامل ماسك لتثبيت الأنبوب ذي شكل الحرف U


ملزم

يتكشف بخار الماء

تحتجز بلورات كبريتات النحاس بخار الماء وتتحول إلى اللون الأزرق

هيدروكربون معقد آخر

يحتوي الفحم على عدد كبير من مركبات الهيدروكربون المعقدة التي تحتوي على الكربون والهيدروجين. ويسمى الكثير منها إلى مجموعة من المركبات التي تحتوي على حلقات من ست ذرات كربون وتوصف بأنها عطرية بسبب رائحتها. والبنزين أبسط مركب عطري ولا يزال ينتج تجارياً من قار الفحم (ص 52-53). وهذه العينة من البنزين قام بتحضيرها مايكل فاراداي (1791-1867) الذي كان أول من فصل البنزين عام 1825 من الغاز الذي يصنع عند تسخين زيت الخوت الذي كان متافراً بصورة تجارية كوقود.



الكربون في كل مكان حولنا

إن عدد المركبات التي تحتوي على الكربون ضخم جداً. وتصنف معظم مركبات الكربون على أنها عضوية - أي مواد كيميائية من كائنات حية - ولكن القليل منها يصنف على أنه غير عضوي، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وأملاح الكربونات (ص 44-45). وقشر البيض وقواقع الخار تتكون بالدرجة الأولى من كربونات الكالسيوم وهو الملح نفسه الذي يوجد في الحصى الجوي والطباشير والرخام.. والسكر من الكربوهيدرات، ويحتوي كما يوحي اسمه على الكربون وعلى الهيدروجين الموجودتين في الماء - الهيدروجين والأكسجين. وينتمي زيت الزيتون لمجموعة من المركبات تسمى الدهون. ولإكمال قشرته الخارجية التي تشترك في تكوين الروابط وتكوين جزيئات مستقرة يحتاج الكربون لتكوين أربع روابط تساهمية بذرات أخرى (ص 20-21). ويكون الكربون الروابط مع نفسه بسهولة ويمكن أن يكون حلقات وسلاسل من ذرات كربون كثيرة وهي سمة لا تشاركه فيها العناصر الأخرى. ولذا يمكن أن تطول سلسلة الكربون إلى آلاف الذرات كما في البوليمرات (ص 53-56).

تتكون كربونات الكالسيوم غير القابلة للذوبان ماء محولة لون ماء الجير إلى لون اللبن

كيمياء الكربون



الكيميائي العضوي

قام مارسلان برتيلو (1827-1907) بتحضير العديد من المركبات العضوية من مركبات غير عضوية أو عناصر. وقد أوضح أن النباتات والحيوانات ليست فريدة في كونها المصدر الوحيد للمركبات العضوية. وكان لعمله في هذا المجال الفضل في تفيد نظرية القوة الحيوية في النهاية.

جهاز اصطناع المواد

أنتج برتيلو العديد من المركبات العضوية. والأسيتلين مركب كربوني بسيط (C_2H_2) - وهو غاز قابل للاشتعال ولا لون له. وقد حضر برتيلو الأسيتلين من عنصره: الهيدروجين والكربون في عام 1866. ثم قام بتمريره خلال هذا الأنبوب الزجاجي الساخن حتى درجة الاحمرار وحضر البنزين وهو مركب (C_6H_6) عضوي آخر.

الأنبوب الزجاجي الذي تم تسخينه فيه الأسيتلين



غلاف مفتوح لإظهار الأنبوب

الكربون عنصر متميز. ويتواجد كعنصر على هيتين شديدي الاختلاف: وهما الجرافيت الأسود الناعم والماس البراق (ص 26-27). ويكون الكربون أيضًا عددًا ضخمًا من المركبات. وفي البداية كان يستخدم مصطلح الكيمياء العضوية للتعبير عن دراسة المركبات التي توجد فقط في الكائنات الحية، أما الآن فينظر لهذا المصطلح بشكل واسع باعتباره يشير إلى كيمياء مركبات الكربون باستثناء عدد قليل من المركبات البسيطة مثل ثاني أكسيد الكربون والكربونات التي تتضمن الرخام والحجر الجيري. وقد اعتقد لفترة طويلة أن لهذه المركبات «قوة حيوية» خفية وبالتالي لا يستطيع الكيميائي أن يصنعها بدون مساعدة نبات أو حيوان. وقد تلقت نظرية القوة الحيوية هذه ضربة قاصمة في عام 1828 عندما حصل فريدريش فولر على اليوريا - المركب العضوي المعروف - عن طريق تسخين الأمونيا مع السيانات - الذي يعتبر عادة مركبًا غير عضوي للكربون. ولكن بما أنه قام بتحضير السيانات من قرن حيواني أي مادة عضوية فقد ظلت هناك علامة استفهام حول نتائج أبحاثه.

ما الذي يصنع المركب العضوي؟

ثبتت هذه التجربة أن المركبات العضوية (في هذه الحالة الشمع العادي) تحتوي على الكربون والهيدروجين. تشعل الشمعة ويجمع غازا ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين الناتجان عن الشمع المحترق. ويحول الهيدروجين إلى بخار ماء يحتجز بواسطة مادة صلبة مجففة. ويكشف وجود الكربون باستخدام هيدروكسيد الكالسيوم في محلول (ماء الجير) وهو الاختبار المعياري لثاني أكسيد الكربون.




السكر النشط بصرياً

تؤدي قدرة ذرة الكربون على الارتباط بأربع ذرات أخرى (أو مجموعات من الذرات) إلى خاصية غير عادية. فإذا كانت الذرات أو المجموعات الأربع كلها مختلفة فإنه من الممكن أن تكون جزيئين متميزين كل منهما صورة مرآة للأخرى. وعلى الرغم من كونهما متطابقين كيميائياً، إلا أن مثل هذين المركبين يسلكان سلوكاً مختلفاً عندما يشع خلالهما ضوء مستقطب (حيث تقع موجات الضوء في مستوى واحد فقط). فهما يديران الضوء في اتجاهين متعاكسين ويقال إنهما نشطان بصرياً. وقد أدخل المصططاب (أداة لقياس مقدار استقطاب الضوء) في عام 1840 لقياس هذا النشاط البصري، وتظهر السكريات هذه الخاصية. وقد كانت مقياس الاستقطاب تستخدم بصفة روتينية لتحليل شوائب السكر. وبعد ستينيات القرن التاسع عشر أصبحت أدوات قيمة لخصلي الرسوم الضريبية لتحديد قوة محاليل السكر لأغراض الضرائب.


المقطاب

شكلان لحمض اللبنيك


في عام 1874 أدرك ج. هـ. فان هوف (1852-1911) أنه لا يمكن تفسير النشاط البصري (انظر إلى اليمين) إلا إذا كانت الذرات الأربع المرتبطة بذرة الكربون مرتبة عند الأركان الأربعة لهرم حول ذرة الكربون المركزية. وهذا النموذج هو أحد نموذجين يبينان النشاط البصري.



نموذج لحمض اللبنيك النشط بصرياً



احتراق مادة الشمعة



ظاهرة الصوبة الزجاجية


تحتفظ الحرارة الآتية من الشمس على بقاء درجة حرارة سطح الأرض معقولة بحيث يمكن للكائنات الحية أن تعيش. وينعكس الكثير من الحرارة التي تصل إلى الأرض مرة أخرى وهناك مركبات متعددة في الجو تمنع هذا الفقد للحرارة - على سبيل المثال بخار الماء على هيئة السحب - ويحتجز ثاني أكسيد الكربون أيضاً الحرارة. وبما أن كمية ثاني أكسيد الكربون في الجو ترتفع على ما يبدو فإنه يخشى أن تبدأ درجات الحرارة على الأرض في الارتفاع مما يؤدي إلى احتمال حدوث الفيضانات عندما تذوب قمم الجبال الجليدية عند القطبين.

نقل الأكسجين

ينقل القلب الدم خلال أجزاء الجسم عبر منظومة من الأوعية الدموية. ويحمل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة ويمزج منها ثاني أكسيد الكربون والفضلات. وتحتوي خلايا الدم الحمراء على الهيموجلوبين الذي يتفاعل مع الأكسجين في الرئتين ويحمله عبر الجسم ثم يطلقه في العضلات حيث الحاجة إليه.



يتزاوج حرف «تي» مع حرف «إيه»
يتكون التتابع من أربع وحدات
يتزاوج حرف «سي» مع حرف «جى»



الطبعة الزرقاء الوراثية

يحتوي الحمض النووي «دي. إن. إيه» - الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين - على كل المعلومات اللازمة لإعادة إنتاج الحياة ويوجد هذا الحمض في خلايا الحياة. وتتكون هذه المادة من أربع وحدات كيميائية مختلفة (إيه وسى وجى وتى) ترتبط معاً في شكل سلاسل طويلة. وفي نطاق السلسلة يعطي تتابع هذه الوحدات الأربع المعلومات المشفرة اللازمة لصنع البروتينات التي تتحكم في العمليات الحيوية. ويسهل تركيب الحمض النووي «دي. إن. إيه» عملية إنتاج النسخ. فهو مرتب على هيئة تركيب لولبي مزدوج أى شريطين يكملان بعضهما بعضاً يلتصق كل منهما حول الآخر. وعندما تنقسم خلية «ينفك» الشريطان ويمكن أن ينسخ كل شريط ليعطي شريطين متطابقين. وبهذه الطريقة يمكن أن تتكرر المعلومات الوراثية المحتواة في الحمض النووي «دي. إن. إيه» في كل مرة تنقسم خلية ما.

نموذج تعليمي للحمض النووي «دي. إن. إيه»



كيمياء الحياة

تعرف كيمياء المنظومات الحية بالكيمياء الحيوية. وتتكون الكائنات الحية والخلايا التي تصنع منها من الماء (حوالي 70 بالمائة) ومركبات الكربون بالإضافة إلى كميات ضئيلة من المعادن وعناصر أخرى (ص 18-19). وتحتاج النباتات والحيوانات إلى مركبات الكربون لكي تنمو؛ وعندما تموت أو تتحلل يعاد تدوير الكربون الموجود بها إلى الأرض مرة أخرى. وتتم برحلة حياة الخلايا عن طريق الحمض النووي «دي. إن. إيه» الذي يشبه سلوكه إلى حد ما برنامج كمبيوتر؛ فهو يخزن المعلومات لتحديد البروتينات التي نحتاج إليها. والبروتينات هي التي تبني مكونات الجسم (الشعر والجلد)، وتعمل مثل الأنزيمات التي تؤدي دور المواد الخفارة في البشر (ص 36-37) وتنحكم في النمو والأبيض كهرمونات. ويعبر الأيض عن العمليات الكيميائية في الكائنات الحية التي تكسر المواد المعقدة إلى مواد أبسط مع اكتساب الطاقة منها، ثم تستخدم هذه الطاقة لكي تحيا الكائنات وتنمو وتتكاثر.



دورة الكربون

الكربون هو العنصر الأساسي في المركبات التي تنتجها الكائنات الحية (ص 48-49). ويتحرك حول عالمنا في عملية دورية؛ إذ يتحد ثاني أكسيد الكربون من الجو مع ماء لتكوين الكربوهيدرات في النباتات عن طريق عملية تسمى التمثيل الضوئي. وتشمل هذه الكربوهيدرات السلولوز وهو المكون التركيبي الرئيسي لسيقان النبات وأوراقها. ويأكل العديد من الحيوانات النباتات مما يوفر لهم الكربون الذي يحتاجونه. والحيوانات آكلة النبات (العاشبة) تأكلها حيوانات أخرى، مما يمرر الكربون عبر سلسلة الطعام. وعندما تموت يعاد تدوير الكربون الذي تحتوي عليه من خلال التحلل. وتزود المادة النباتية والحيوانية المتحللة الفطريات والبكتيريا بالغذاء فتنتج ثاني أكسيد الكربون. ويمكن أيضًا أن تدفن النباتات ثم تتحول تحت الضغط إلى الفحم والزيوت - أي إلى وقود حفري. وعندما يحرق هذا الوقود الحفري فإنه يعيد الكربون إلى الجو على هيئة ثاني أكسيد الكربون. وتعيد الحيوانات أيضًا الكربون إلى الجو عندما تفرز ثاني أكسيد الكربون.

هانس كريبرز



توليد الطاقة

ولد عالم الكيمياء الحيوية السير هانس كريبرز (1900-1981) إلى إنجلترا من ألمانيا عام 1933. وقد اقترح سلسلة من التفاعلات لشرح كيف يتكسر الجلوكوز - وهو من أنواع السكر - لكي يعطي ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة. وتحدث التفاعلات في دورة، أي إنه بعد أن يتكسر جزيء واحد من السكر تكون المركبات اللازمة جاهزة لتكرار العملية.



المواد المنظفة غير الصابونية
يعتبر الصابون المصنوع من دهون حيوانية من المواد المنظفة. ويميل إلى تكوين زبد لا يذوب مع الماء العسر (ص 44، 45)، ولذلك تم اختراع المنظفات غير الصابونية لتغلب على هذه المشكلة. وتقوم صناعة الكثير من هذه المنظفات على البنزين الذي تضاف إليه سلسلة طويلة من الهيدروكربونات تماثل تلك التي في الصابون. وعلى خلاف أنواع الصابون العادية فإن أملاح الكالسيوم والمغنسيوم لتلك المواد قابلة للذوبان ولذلك لا يتكون لها زبد.



بنزين



الكريوسوت



منظف غير صابوني

المتفجرات

انتشر استخدام مادة «تي. إن. تي» المتفجرة إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918). وتُحضر المادة من التريولوين المستخرج من قطران الفحم، ثم يحول إلى نترات وذلك بصبه في حمض الكبريتيك والتريك المركزين لينتج ثلاثي نيترو تولوين أو «تي. إن. تي» وعندما تتعرض هذه المادة لصدمة ميكانيكية فإن ذرات تلك الجزيئات غير المستقرة تعيد ترتيب نفسها لتكون ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وغازات نيتروجينية تجعل الحجم يتضاعف آلاف المرات، وهذا التمدد المفاجئ هو ما يحدث الصدمة التدميرية.

أول مادة بلاستيكية مخلقة

استطاع ليبيكلاند (1863-1944) أن يصنع مادة بلاستيكية قيمة عام 1907 عندما أجرى تفاعلاً بين الفينول ومادة كيميائية أخرى هي الفورمالديهايد (ص 54، 55). وأطلق على هذا المنتج الفينولي اسم «الباكليت». وتلك المادة مقاومة للحرارة وإن كانت قاتنة اللون. وقد أفادت صناعة الراديو الحديثة في ذلك الوقت، ومن بعدها صناعة التليفزيون من سهولة صب الباكليت في قوالب مناسبة بالإضافة إلى ما يتمتع به من خصائص العزل.



الفينول خصائص العزل



الأنيلين



ديسالفيد الكربون



ألياف حرير اصطناعي

العقاقير العلاجية

ظلت العقاقير تشقى لعدة قرون من المواد الطبيعية مثل خاء الصفصاف. وقد كان «بيركن» يحاول تخليق عقار الكينين من «الأنيلين» وذلك لعلاج الملاريا عندما اكتشف مادة «الموفين» وأسس بذلك صناعة الأصباغ. ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت العقاقير المخلقة لعلاج الآلام والمضادة للحمى قد تم اشتقاقها من مركبات عضوية. ثم عبا بريقها عام 1899 عندما ابتكرت شركة الكيماريات الألمانية «باير» الأسبرين أو حمض الأسيتيل ساليسيليك الذي يستخرج من البنزين من خلال عملية معقدة.



عقاقير القضاء على الألم

الحرير الاصطناعي

يعتبر ديسالفيد الكربون سائلاً ساماً وينتج من تسخين فحم الكوك مع الكبريت داخل فرن. وهو يستخدم كمذيب صناعي. وقد تمكن عالمان كيميائيان بريطانيان هما ك. ف. كروس، وإي. جي. بيفان في عام 1892 من إذابة السلولوز في ديسالفيد الكربون وأحد الفلوريات للحصول على محلول لزج. ويمكن إعادة تكوين السلولوز على هيئة ألياف وذلك بفتح محلول «الفيسكوز» من خلال فوهة داخل حامض. وأصبحت تلك المنسوجات تعرف باسم «الرايون» وكانت تطرح في الأسواق على أنها حرير اصطناعي.




تليفزيون من الباكليت (من خمسينيات القرن العشرين)

التخليق العضوي



الاشتغال بالمطاط

يتفاعل المطاط المستخرج من مادة «اللاكس» التي تستخرج من شجرة المطاط بشكل سيء عند القيم القصوى لدرجات الحرارة. وقد قام تشارلز جودير (1800-1860) - وهو مخترع أمريكي بالترامن مع توماس هانكوك في إنجلترا بتسخين المطاط مع الكبريت، ووجد أن المطاط يظل مرناً في نطاق حراري معين. وأطلق على تلك العملية اسم «الفلكنة»؛ تقسية المطاط بمعالجته بالكبريت نسبة إلى إله النار الروماني «فلكان».



الأصباغ الاصطناعية

أحدث وليام هنري بيركن (1838-1907) ثورة في عالم صناعة الكيماويات عندما ابتكر الصبغة الاصطناعية. فقد كان يحاول تحضير ذوات الكينين من مادة الأنيلين - وهو مركب مشتق من قطران الفحم - ولكنه لم يحصل سوى على خليط لزج قائم من المواد. وعندما حاول تنقيفه بالكحول، اكتشف أنه يدوب مكوناً محلولاً أرجوانياً قائماً استطاع أن يحضر منه بلورات صبغة «الموفين». وقد كانت الأصباغ تصنع قبل ذلك من مواد نباتية مثل نبات النيلة (ص 11، 10). وما لبثت الصبغة الجديدة أن تخطقتهما الأسواق لتلبية احتياجات صناعة النسيج وصار اسمها «موف» (البنفسجي الزاهي). ثم استمر بيركن في تخليق روائع طبيعية من مواد كيميائية. وكان ذلك بمثابة بداية صناعة العطور المخلقة.



الأنتراسين



النفثالين



الأسفلت

ألوان قوس قزح

جد منتجو المنسوجات في السعي للحصول على أصباغ تخيلية زاهية بعد نجاح إنتاج «الموفين». ولذلك فقد تم تخليق مادة «الأليزارين» وهي المركب الذي يعطي صبغة القزوة الطبيعية لونها الأحمر بنجاح من الأنتراسين عام 1868.



صبغة حمراء مخلقة



الصبغة الخضراء التخليقية

تتميل الصبغات المخلقة إلى أن تكون أكثر سطوعاً من الصبغات النباتية التقليدية



رائد صناعة المطاط

استخدم توماس هانكوك (1786-1865) - وهو مصنع المطاط - وتشارلز ماكينتوش (1766-1843) - وهو كيميائي إسكتلندي - مادة النفط المستخرجة من التقطير التجزيئي لقطران الفحم كمذيب للمطاط. ثم استخدم محلول المطاط بعد ذلك في إنتاج أقمشة مضادة للبلل تصنع منها المعاطف التي صارت تسمى «ماكينتوش». ويستخدم أحد مكونات النفط - وهو النفثالين - في صناعة الكرات المضادة للعدسة. كما أنه يعتبر نقطة البداية المهمة لكثير من مواد الصباغة المخلقة والمواد الأخرى مثل التي تستخدم لطرد الحشرات.

الحماية من الأمطار

استخدام الأسفلت

أنج التقطير التجزيئي لقطران الفحم عدداً كبيراً من المواد الهامة التي استخدمت فيما بعد في تخليق منتجات مفيدة في القرن التاسع عشر. ويعتبر الأسفلت هو المادة المتبقية من تلك العملية ويستخدم في وصف أسطح الطرق.



الرصف التقليدي للطرق



ليوبيكلاندا (1863-1944)


هاجر بيكلاند البلجيكي المولد إلى الولايات المتحدة حيث درس التفاعل بين الفينول والفورمالديهايد. ولم تخط المادة القارية الناتجة قائمة اللون باهتمام الكيميائيين من قبل، والذين انصب اهتمامهم على المنتجات الشفافة فحسب. ونجح بيكلاند عام 1907 في السيطرة على تفاعل البلمرة وتمكن من إنتاج مادة بلاستيكية مخلقة وأطلق عليها اسم الـ «باكليت».

مذياع (راديو) من الباكليت

استخدمت مادة الباكليت أو الراتنج الفينولي في صناعة الأدوات المنزلية مثل ساعات الحائط والأدوات الكهربائية. وتمتاز هذه المادة بمقاومتها للحرارة وعزلها للكهرباء. والراتنجات الفينولية قائمة اللون في العادة ويسهل صبها في قوالب كما يسهل تقويتها باستخدام مواد مالئة كالمنسوجات.

علب السجائر

أدى البحث عن أنواع من البلاستيك ذي الألوان الفاتحة والخواص الشبيهة بخواص الباكليت - الذي كانت ألوانه تتراوح غالباً بين الأسود والبني المائل للاحمرار - إلى إنتاج بلاستيك البوريا فورمالديهايد. وعندما استخدم السلولوز كمادة مالئة بالإضافة إلى المواد الملونة، أمكن تصنيع منتجات بيضاء وملونة.



مفتاح الضبط

سماعات

مفتاح التحكم في الصوت

فيلم من البلاستيك

بدأ استعمال الأفلام البلاستيكية المصنوعة من نترات السلولوز في مجال الأفلام السينمائية عام 1887 وفي مجال الصور الثابتة في العام الذي تلاه. وعادة نترات السلولوز قابلة للاشتعال بصورة جعلتها سيئة السمعة ولذلك فإن الأفلام الحديثة تصنع من مادة بلاستيكية أكثر أماناً وهي ثلاثي خلاص (أستات) السلولوز.




عصر البلاستيك

ابتكرت الكثير من المواد البلاستيكية المختلفة بحلول خمسينيات القرن العشرين (ص 56، 57). واستعملت تلك المواد في الصناعة وفي أنحاء المنزل وخاصة داخل المطابخ. فمادة البولي فينيل كلورايد الصلبة (PVC) استخدمت كغرض للأرضيات. وظهرت في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين بلاستيكات الميلاين فورمالديهايد والتي تتمتع بمقاومة عالية للحرارة والرطوبة والتنظفات. كما أمكن عمل طبقات متتالية يجعلها تتأق مع الورق أو القماش ثم تعرض تلك الطبقات للضغط لصناعة مادة الفورميكا التي تصلح لتغطية أسطح العمل. وهناك أنواع أخرى من البلاستيك مثل البولي ستيرين والتي تصنع منها الدلاء (الجرادل) والأواني والقدرور. ول سوء الحظ فإن معظم المواد البلاستيكية لا تتحلل بيولوجياً أي أنها لا تتعفن، كما أنها قد تبعث أبخرة سامة عند حرقها.



عينات من أنسجة حريرية من الفسكوز



الألياف المخلقة (أنداد)

تعرض بعض المواد البلاستيكية لعمليات البثق لإنتاج الألياف. وقد ساد اشتقاق المنسوجات من الألياف الطبيعية. ثم بدأ إنتاج السلولوز المعدل من محلول الفسكوز عام 1892 (ص 52، 53). حيث تضخ هذه المادة البلاستيكية خلال ثقب ضيق داخل الحمض ليصنع خيط اصطناعي يدخل في صناعة المنسوجات. أما الإنتاج على نطاق واسع فقد صار ممكناً مع اختراع صندوق الغزل عام 1900. وكان ذلك الصندوق يقوم بتجميع الفتائل دون أن تشبك مع بعضها البعض.

أولى المواد البلاستيكية

صنعت أولى المواد البلاستيكية المخلقة في ستينيات القرن التاسع عشر؛ وإن كانت بعض المواد الطبيعية كالعاج والكهرمان استخدمت قبل ذلك على نطاق واسع. وتعتبر الكثير من تلك المواد من البولييمرات - التي تتألف من مقطعين: «بولي» وهي كلمة إغريقية تعني العديد، و«مير». وتعني جزءاً. وتتألف البولييمرات من جزيئات عملاقة مكونة من عدد كبير من الجزيئات الصغيرة المرتبطة ببعضها على هيئة سلاسل طويلة. ويطلق على كل من الجزيئات الصغيرة اسم «مونومر» (حيث يعني لفظ «مونو» الواحد). وقد بدأ السعي لإنتاج مواد مخلقة منذ ما يزيد على مائة سنة، لتحل محل مواد مثل العاج الذي أخذ يصبح نادراً، ولصنع مواد يمكن صبها في قوالب أو بثقها كالألياف. وقد كانت أولى المواد البلاستيكية من البولييمرات نصف المخلقة، وكان يتم تكوينها عن طريق تعديل السلولوز وهو البوليمر الطبيعي في القطن. ثم صنعت بعد ذلك مواد بلاستيكية مخلقة بالكامل مثل الباكليت (ص 52، 53).

حقيبة مزخرفة

انتسج النشار المواد المخلقة الشبيهة بالعاج مع حلول عام 1900، وكانت تستخدم لصنع جميع أنواع المنتجات بدءاً من مقابض السكاكين إلى الباقات والأساور وحتى حقيبة السهرة هذه. ويمكن صب هذه المواد البلاستيكية في قوالب وهي في درجة حرارة عالية لتأخذ الشكل الصلب عندما تبرد.



أول مادة بلاستيكية

ابتكر ألكسندر باركيز (1813-1890) مادة قابلة للصب في قوالب وتصنع من نترات السلولوز. وقد أذاب - لهذا الغرض - ألياف القطن في حمض النتريك ثم أضاف إليها مادة ملدنة كالكافور، ثم قام بعد ذلك بتسخير المذيب وقد استخدمت المادة التي سميت «باركسين» في صنع كل أنواع السلع المنزلية مثل مشبك الشعر هذا. وقد عرض باركيز أول مادة بلاستيكية ناجحة من ابتكاره في لندن عام 1862.



تفاصيل زخرفية مصبوبة

مرآة يدوية

صنعت هذه المرآة اليدوية من مادة مخلقة بديلة للعاج. وهذه المادة - شأنها شأن المواد البلاستيكية الأخرى - يمكن صبها في قوالب بسهولة لكي تحاكي بدقة العاج الخفوف. وقد تم تشكيل المواد البلاستيكية الأولى في نماذج ومجسمات كي تشبه البولييمرات الطبيعية.



شريط جلدي مجدول

مشبك

تقليد الأبنوس

صنعت علبة الثقاب هذه، والتي تعود إلى عام 1890، من مادة الأبرليت ذات اللون البني الداكن، وتصنع هذه المادة البلاستيكية عن طريق فلكنة المطاط.




قلم بلاستيكي

عندما تسخن المركبات المحتوية على الكبريت مع المطاط فإن المطاط يتصهر مكوناً روابط عرضية بين سلاسل الجزيئات. وإذا زاد محتوى الكبريت صارت المادة أصعب وأكثر مقاومة للكيمويات - مثل مادة الفلكاكية التي يصنع منها مثل هذا القلم.

حقيبة يد للسهرة من مادة السلولويد

بحلول عام 1870 كان جون ويزلي هيات (1837-1920) يقوم بتصنيع مادة السلولويد - وهي بديل العاج - وذلك باستخدام نترات السلولوز. وقد شاع استعمال هذه المادة في صنع كرات البليارد وجميع الأدوات الزخرفية مثل حقيبة السهرة هذه التي صنعت عام 1900.




كيفية صنع البولوي إيثيلين

يعتبر البولوي إيثيلين بوليمر مكوناً من مونومرات الإيثيلين. وقد اكتشف عام 1933 ولم يطرَح في الأسواق على نطاق تجاري إلا عام 1930 عندما تم حل مشكلتي الحصول على درجات الحرارة والضغط المرتفعين بصورة كبيرة. وقد استخدم وعاء الضغط هذا لتحضير العينات الأولى من البولوي إيثيلين. وقد شوهدت حبيبات بيضاء صلبة عند تعريض غاز الإيثيلين لضغوط كبيرة للغاية، ومن المصادفات الطيبة أن ثلجاً في المعدات سمح للأكسجين بالتدفق إلى داخل غرفة التحضير مما سمح ببداية التفاعل. وهذا البولوي إيثيلين منخفض الكثافة مرن وأملس وصافٍ. ثم أُضيفت مادة حفازة في خمسينيات القرن العشرين فتم الحصول على بولي إيثيلين مرتفع الكثافة ومتماسك القوام.

إعادة تدوير المواد البلاستيكية

يصنع هذا الأنبوب البلاستيكي من حبيبات البولوي إيثيلين. ويتم تلين نهايات البولوي إيثيلين بالماء الساخن ثم تسحق لتكوين حبيبات. ويتم تسخ الأنبوب البلاستيكي باستخدام الهواء الساخن الذي يشكل الأنبوب ويحفظه. ويستخدم البلاستيك الذي أعيد تدويره في صناعات التشييد والبناء حيث لا تشكل الشوائب أهمية كبيرة. ولا يمكن إعادة تدوير أية عادة إلا التي تصبح لدنة بالحرارة بهذه الطريقة.



المواد البلاستيكية المستخدمة في الجراحات

تواصل المواد البلاستيكية غزوها المطرد مجال الجراحات التعويضية نظراً لكونها لا تتفاعل مع الوسط المحيط بها. وعلى عكس المواد المستخدمة في زراعة الأعضاء، فإن هذه المواد لا تثير رفضاً فورياً من جانب الجسم على أساس أنها أجسام غريبة. وتستخدم هذه القطعة التعويضية لفصل الورثة نوعاً خاصاً من البولوي إيثيلين ذي الوزن الجزيئي المرتفع.

التركيب الجزيئي للمواد البلاستيكية

تتقسم المواد البلاستيكية كلها إلى قسمين تبعاً لسلوكهما عند التسخين. فالمواد التي تلين بالتسخين (كالبولي إيثيلين) تصبح كذلك في كل مرة تعرض فيها للتسخين، أما القسم الآخر فيتصلب عند التسخين ولا يعود ليناً عندما يبرد (كالبولي كليت). فعند التسخين أول مرة تكون الجزيئات روابط مستعرضة تؤدي إلى تكون هيكل دائم الصلابة. وتستخدم هذه الفئة لصنع الأدوات الكهربائية كالمقابس.



جزيئات تلين بالتسخين



جزيئات تتصلب بالتسخين

صناعة المواد المخلقة

هناك دائماً الجديد في عالم المواد البلاستيكية، ولقد كانت مادة «بي. في. سي» أو بولي فينيل كلورايد أولى المواد التي تصبح لدنة بالحرارة. ولم يفلح إنتاج هذه المادة في البداية عندما انتبعت الأذهان لها في العقد السابع من القرن التاسع عشر إلى أن تم ذلك بنجاح في ثلاثينيات القرن العشرين. ولما كانت هذه المادة مقاومة للماء والظروف الجوية لذا فقد تعددت أوجه استخدامها. فعندما تكون متماسكة وسميكة، فإنها تصلح لصنع أنابيب الصرف والدمى وسيارات الستائر؛ وعندما تكون رقيقة ولينة فإنها تستخدم في تغليف الكابلات الكهربائية وصناعة ملابس الأطفال الرضع وأقمشة تنجيد المقروشات. وتشمل المواد البلاستيكية من البولي أكريليك مادة البرسبكس ذات الشفافية العالية. ومقاومتها للتخطم جعلت لا غنى عنها في صناعة الحاجز الشفاف لقمرة الطيار. كما اكتشف البوليثين أو البولي إيثيلين في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، ومثل الكثير من المواد البلاستيكية، لم تحقق هذه المادة نجاحاً تجارياً إلا في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، عندما اقتضت خواصها مجال التطبيقات المتعلقة بمعدات الرادارات. ولم يتم الحصول على البولي إيثيلين الصلب إلا عندما استخدمت مادة حفازة في خمسينيات القرن العشرين. وتمكنت شركة ديوبونت من إنتاج مادة النايلون -66 بنجاح مما أشعل ثورة في صناعة المنسوجات. وكانت تلك المادة قوية وقابلة للشد ولا تفتت السوائل. ولا يمكننا اليوم تخيل العالم بدون مواد بلاستيكية، فكثير من العمليات الجديدة والمنتجات تعتمد عليها.

صناعة النايلون

هناك نوعان من المونومرات البادلية المستخدمة في صناعة النايلون -66 وهما: حمض -الأديبيك وهكسامثيلين الديامين. ولكل منهما مجموعته التفاعلية المكونة من ذرات عند طرفي جزيء مستقيم. وتكون مجموعات حمضية في الأول ومركب الأمين في الثاني. وتحدد كل مجموعة حمضية مع الأمين لتكوين سلاسل طويلة من المونومرات البادلية. ويلدوب الأديامين في الماء مكوناً الطبقة السفلى داخل الكأس بينما تتكون الطبقة العليا من محلول للحمض في الهكسين. ويتكون النايلون حينما تلتقي المادتان والفاعلان ويمكن عندئذ سحبه من الكأس ولفه حول قضيب.

يتكون النايلون في موضع التقاء الطبقات

الجوارب المطابقة لأحدث صيحة

تم طرح جوارب السيدات المصنوعة من النايلون الجديد في الأسواق عام 1940 وسرعان ما نالت هذه الجوارب إقبالاً كبيراً من السيدات.

العينات المبكرة


تم نسج هذه القطعة من أنبوب من النايلون عام 1935 في مصانع شركة ديوبونت باستخدام مادة البولي أميد ذات الاختلاف الطفيف عن النايلون -66 العادي. ويعود نجاح النايلون في صناعة الجوارب إلى متانتها وعرونتها مما يجعله يلتصق بالجسم ولا يتجعد.



صناعة ألياف النايلون

التحقق والاس. ه. كارودرس (1896-1973) بشركة ديوبونت عام 1928. وقد استخدم محلولي مادتين كيميائيتين (وهما حامض والديامين) لتحضير مادة نايلون -66. وحينما يلتقي المحلولان فإن السائل هنا يمكن بثقه من ثقب صغير لتكوين خيوط آتية من الألياف الطويلة. وقد أعطى هذا الاكتشاف دفعة قوية لصناعة النسيج وأدت إلى ثورة في عالم الأقمشة.

يتم سحب النايلون على هيئة خيط



حمض الأديبيك الذائب في الهكسين

مادة هكسامثيلين الديامين في ماء



بحلول عام 1876 عرف أن لون المركبات

مثل الصبغات يتأثر بتجمعات معينة من الذرات. وأحياناً ما تكون هناك ضرورة لوجود مجموعات إضافية من الذرات لإظهار اللون أو لتغير درجته. وتنتج المجموعات عطوفاً (شوائب) مميزة في طيف ما. وعندما صنعت صبغة النيلة تخليقياً (ص 52) تم اختبارها بالتحليل الطيفي لمقارنتها بطيف نبات شجرة النيلة لمعرفة ما إذا كانت العينتان متطابقتين.



طيف نبات النيلة



بنزن أثناء استعماله للمطيف

التحليل بواسطة المطياف

استخدم التحليل الطيفي لأول مرة للتعرف على الفلزات في عام 1859. وقد أسس هذا المطياف الذي يعود للقرن التاسع عشر على تصميم الكيميائي الألماني المبدع روبرت بنزن. وسرعان ما انتشر التحليل الطيفي كتقنية للتحليل الكيميائي وقد امتد ليشمل استخدام كل من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية. وإلى جانب استخدام التحليل الطيفي للتعرف على العناصر يمكن أن يستخدم أيضاً لدراسة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المركبات. وتُعطي الأطياف المميزة معلومات عن أنواع الروابط الكيميائية (ص 20، 21) وكيفية تحرك الذرات داخل الجزيء. وبين النقش الواقع إلى اليمين

روبرت بنزن (1811-1899) وهو ينظر إلى طيف

لهب من خلال مطيافه. وفي عام 1955

صمم الأسترالي آلان والش

أسلوب التحليل الطيفي القائم

على الامتصاص الذري الأكثر دقة


وحساسية الذي يمكنه أن يكشف بقايا ضئيلة من العناصر.

حامل متين



يانس ياكوب برزيليوس (1779-1848)

كان هذا الكيميائي السويدي الشهير أحد عمالقة مجال التحليل الكيميائي. لقد كان خبيراً في التحليل بواسطة أنبوب التفخ، وقد اكتشف عدة عناصر في أثناء إجراء التحليل. وقد عين الأوزان الذرية لعظم العناصر المعروفة في بدايات القرن التاسع عشر. وقد أدخل أيضاً الرموز الحديثة للعناصر مستخدماً أول حرف أو حرفين مثل H للهيدروجين (ص 22، 23). وكان يعتقد أن هذه الرموز لا تشوه الصفحة المطبوعة مثل الرموز المصورة. وقد حلل أيضاً العديد من المركبات العضوية (ص 48، 49) وحاول فهم خواصها المعقدة.



كلوريد البوتاسيوم

كلوريد الكالسيوم

كلوريد الباريوم

كلوريد الإسترونتيوم

اختبارات اللهب للفلزات

اختبار اللهب من أول الاختبارات التي تستخدم لتحليل مادة ما ومعرفة ماهيتها. وقد لاحظ يوهان جلاوبر أن ألوان اللهب تدل على نوع الفلزات الموجودة وذلك منذ أمد بعيد في عام 1659. فعندما يغمس سلك نظيف في محلول ملح فلزي ثم يمسك به ويوضع في لهب - مثل موقد بنزن أو لهب مصباح كحولي - فإنه يحترق بلون مميز. ويظهر اللون لأن ذرات الفلز تنص طاقة من اللهب ثم تعود وتبعث هذه الطاقة على هيئة ضوء عندما تعود الذرة لحالتها العادية. ويمكن تحليل اللهب الملون بواسطة مطياف. وتستخدم بعض الفلزات مثل الإسترونتيوم والبوتاسيوم لإضفاء اللون على الألعاب النارية.

مصباح برزيليوس الكحولي

كثيراً ما يحتاج التحليل الكيميائي إلى شكل من أشكال التسخين واللهب وقد استخدمت أفران الفحم للتسخين منذ القدم. أما في حالة العمل على نطاق صغير فقد استعان الكيميائي بالعدسات الحارقة (ص 28، 29) ومصباح الكحول. وقد استخدم برزيليوس هذا النوع من المصباح الكحولي.



قصة التحليل الكيميائي

حاول خبراء تحليل المعادن (ص 12، 13) منذ القدم أن يحللوا المواد الأساسية. وقد استخدم الكيميائيون حاستي الشم والتذوق كثيراً للكشف عن ماهية الأشياء - معرضين أنفسهم أحياناً لعواقب وخيمة. وكان السير همفري ديفي (ص 46، 47) يستنشق كل الغازات التي حضرها - وقد توفي وهو شاب. وقد كان يوهان جلاوبر (1604-1670) يعلم أن الفضة تكون رواسب مع القلويات (ص 46، 47) ومع الكربونات وقد أدرك أهمية اللون في التعرف على المواد. ومع حلول عام 1800



المختبر

كان كارل فريزينيوس أستاذاً للكيمياء والفيزياء وعلم الطبيعة في فايسبادن منذ عام 1845. وقد أسس مختبر فريزينيوس في عام 1848 لتدريس الكيمياء التحليلية وإجراء التحاليل الكيميائية.

مولد غازات «كيب»

يسمح الأنبوب الزجاجي بمرور الحمض من خلال الغرفة

تنتج المواد الفاعلة الغاز هنا

كبريتيد الحديد

عندما يتوقف الإمداد بالغاز يدفع ضغط الغاز الحمض إلى أعلى مرة أخرى فيصعد خلال الأنبوب إلى الغرفة العلوية

يتدفق الحمض الذي يسكب هنا إلى أسفل نحو الغرفة السفلى

يسحب الغاز من هنا

يصعد الحمض إلى الغرفة الوسطى عند فتح مشبك إمداد الغاز

مشبك لفتح وغلق مصدر إمداد الغاز

أصبح مفهوماً أن لغاز كبريتيد الهيدروجين القدرة على تكوين أملاح غير قابلة للذوبان مع فلزات معينة. وقد طور كارل فريزينيوس (1818-1897) هذا الكم من المعرفة إلى التحليل المنظم للفلزات. وقد كانت المميزات الأخرى للمواد هامة أيضاً. وعندما بدأت الزيوت المعدنية تحل محل الزيوت النباتية التقليدية ابتكرت معدات تحليلية لقياس قابليتها للتطاير.

جهاز نقطة الوميض

كانت للزيوت المعدنية الجديدة التي بدأ استخدامها خلال القرن التاسع عشر خواص غير معروفة. وقد ابتكر هذا الجهاز تعيين نقطة وميضها - أي درجة الحرارة التي يتصاعد عندها بخار سهل الاشتعال من الزيوت. يقوم حمام مائي بتسخين الزيت ثم يختبر البخار بشكل منظم بواسطة تحريك تفتال الإشعال داخل ثقب في الغطاء. وحين يحدث انفجار طفيف فإن ذلك يدل على الوصول إلى نقطة الوميض. والزيوت التي لها نقط وميض منخفضة يمكن أن تكون خطيرة نظراً لأنها قد تنفجر أو تشعل تاراً.

جهاز كيب


اخترع ب. ج. كيب جهاز توليد

الغاز في 1862 ليوفر مصدراً مناسباً لغاز كبريتيد الهيدروجين، حيث يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كبريتيد الحديد لإنتاج هذا الغاز البالغ السمية. وعندما تدخل فقاعات غاز كبريتيد الهيدروجين خلال محاليل أملاح الفلزات تتكون كبريتيدات الفلزات غير القابلة للذوبان لكي يتم التحليل.

اختبار الفلزات (أدناه)

لكي يتم تحليل مادة مجهولة فإنها تذاب أولاً في حمض الهيدروكلوريك المركز. وتتسبب إضافة كبريتيد الهيدروجين في تكوين بعض الفلزات كبريتيدات الفلزات غير القابلة للذوبان. ويعطى لون هذه الرواسب دلالة عن ماهية الفلزات الموجودة ويمكن بالتالي إجراء المزيد من الاختبارات. وإذا أصبح المحلول الباقى قلويًا يمكن ترسيب فلزات أخرى.

حاصل أنابيب الاختبار



كبريتيد الحديد

كبريتيد النحاس

كبريتيد الرصاص

كبريتيد المنجنيز

كبريتيد الكاديوم

الذراع
الجانبية

التحليل الحجمي

كانت هذه السحاحة تستخدم في القرن التاسع عشر لقياس كمية المحلول اللازمة لإكمال تفاعل كيميائي. ويتم التحكم في تدفق السائل عن طريق وضع الإبهام على الذراع الجانبية. فإذا رفع الإبهام قليلاً يمكن أن يسكب السائل ببطء في كأس يحتوي على المحلول الثاني. ويضاف السائل حتى يتم التفاعل، ويمكن أن يظهر ذلك في تجارب الحمض - القاعدة (ص 42، 43) باستخدام كاشف يتغير لونه.

عنق الجهاز

تظهر العينة
كلا العينتين
في الوقت ذاته

أوزان دائرية
مشقوفة
توضع على
عنق الجهاز

يعلق
الهيدرومتر في
السائل وتسجل
القراءة التي
تشاهد على
عنق الجهاز

قضيب زجاجي

محلول
معياري

قضيب زجاجي

محلول العينة

خلفية بيضاء

مقياس كليت للشدة اللونية

ابتكر مقياس الشدة اللونية خلال القرن التاسع عشر لإجراء قياس كمي للملاحظات مبنى على عمق اللون في المحلول. وقد استخدمت صناعات مثل التخمير والدباغة والصباغة والطباعة قياس شدة اللون لاختبار جودة المنتج في بداية القرن العشرين.




التحليل الطبي

إن وجود مركبات معينة في العينات الطبية أمر أساسي للتشخيص الطبي. ويمكن استخدام طرق متنوعة لتحليل العينات - والبعض منها كيميائي. وقد غير عصر الكمبيوتر مظهر معمل الكيمياء من غرفة مملوءة بالأجهزة الزجاجية والخشبية والمصنوعة من النحاس الأصفر إلى أخرى تحتوي على شاشات تومض ومعدات عالية التقنية.

تحليل السوائل

استخدم المسبك «الهيدرومتر» منذ القرن السابع عشر لقياس كمية الكحول في المشروبات. وهو أداة أساسية لصانع الجعة لقياس الثقل النوعي للسائل - أي وزنه مقارنة بنفس الحجم من الماء. وقد استخدم هذا النوع من الهيدرومترات الذي صممه بارثولوميو سايكس منذ 1816 لجمع الرسوم الضريبية على السوائل الكحولية. ولتقاس القوة المعيارية للكحوليات بالاستعانة بجداول تأخذ درجة حرارة السائل في الاعتبار.



تحليل جودة المشروبات



ترمومتر
بيكمان

تدخل العينة
من هنا

محرك

دثار تبريد




التغير في درجة الحرارة

يستلزم قياس الخواص الفيزيائية للمركبات استخدام أجهزة مثل الجهاز المين. وقد ابتكر أرنست بيكمان (1853-1923) هذا الترمومتر لقياس انخفاض نقطة الانصهار لوزن معلوم من مادة مذابة. ويمكن أن يقيس الترمومتر تغيرات صغيرة للغاية في درجة الحرارة. وهناك تدرجات قيمتها 100/1م على المقياس.

يحمل الجزء الملحق أوزاناً
صغيرة للضغط النهائي

تعلق الكفتان
على حد سكين

كفة



الميزان الذي صنعه في. سارتوريوس


مراقبة المواد



تحليل اللون

درس ميخائيل تسويت (1872-1919) الصبغات النباتية (الخصاب) وابتدع التحليل الكروماتوجرافي (ص15، 14) في أثناء محاولته استخلاص وفصل الصبغات.

يستخدم التحليل الكيميائي في العمليات الصناعية لفحص المواد الأولية والمنتجات النهائية؛ ويمكنه أن يراقب جودة الغذاء. هذا، وتصمم الأدوية وتختبر وتصنع بالاستفادة من التحليل الكيميائي. ويشكل الوزن جانباً أساسياً من التحليل؛ وقد اُبتكرت الموازين الدقيقة منذ عام 1800. وتعتمد بعض طرق التحليل على قياس الحجم - وقد استخدم المغواز «أنبوب تحليل الغازات» (ص29، 28) في الدراسات القديمة للغازات. أما بالنسبة للسوائل، فتستخدم أجهزة متخصصة مثل الماصة والسحاحة. وقد اتخذ تحليل الأغذية أهمية عظيمة خلال القرن التاسع عشر عندما اضطلعت الحكومات بالمزيد من المسؤولية عن الصحة العامة؛ ولذا فقد استدعى الكيميائيون لاختبار ما إذا كانت المواد الغذائية على النحو الذي يجب أن تكون عليه أو لا.



ذراع قصيرة من الألومنيوم

وزن المنتجات

كان الميزان هو الأداة الرئيسية للتحليل العملي. وكان جوزيف بلاك (ص29، 28) أول من استخدم الميزان لدراسة التفاعلات الكيميائية عن طريق وزن المواد المتفاعلة والناتج (ص35، 34). وكان ميزانه بدايةً إلى حد بعيد. وكان هذا الميزان الكيميائي الذي صنع عام 1876 من أوائل الموازين التي تحتوي على ذراع قصيرة مستخدمة الألومنيوم الخفيف لتقليل وزن ذراع الميزان.

مقبض يفتح باب جانبي المقبض



العينة

يفتح القلاووظ الألة
توضع العينة

دثار مائي للتحكم في درجة الحرارة

ترمومتر

غش الأغذية


صنع أول سمن صناعي (المرجرين) الذي ابتكر كبديل للزبد في عام 1869 من خليط من المنتجات البقرية (ص7، 6). وأحياناً كان هذا الخليط والزبد يعرض للغش عن طريق إضافة الدهون النباتية الأرخص سعراً. ويمكن الكشف عن ذلك باستخدام مقياس الانكسار الخاص بالزبد. وقد اُبتكرت مقاييس الانكسار على يد أرست أبي - وهو صانع لآلات البصرية - في عام 1869. وتقيس هذه الآلات معامل انكسار المواد - أي إلى أي قدر ينحني الضوء عند مروره من الهواء إلى المادة.

مرآة لعكس الضوء خلال الجهاز

تحليل المركبات العضوية

ابتكر جوزيف جاي لوساك (1778-1850) ولوى تيار (1777-1857) هذا الجهاز عام 1811 لقياس كميات الكربون والهيدروجين في المركبات العضوية مثل السكريات والنشا عن طريق حرقها لتكوين ثاني أكسيد الكربون والماء. وقد استخدموا عاملاً مؤكسداً للتأكد من أن المركب احترق تماماً. وكان ثاني أكسيد الكربون يمتص بينما يجمع بخار الماء ويقاس. وقد أكدوا أن السكريات والنشا تحتوي على الهيدروجين والأكسجين بنفس نسب وجودها في الماء مما يؤدي إلى إطلاق اسم «كربوهيدرات» عليهما.

يرفع المقبض الكفتين



قاعدة لتستند عليها كفة الميزان عندما لا تكون قيد الاستعمال


قلاووظ لصيغ المستوى




كيمياء الزراعة

أسس يوستاس فون ليبج
(1803-1873) معمله
التعليمي في ألمانيا عام
1839. وقد أكد ليبج
أهمية العناصر غير
العضوية مثل
الفوسفور والبوتاسيوم
في تنشيط نمو النباتات.
وقد ساعد حماسه لعلم
كيمياء التربة على إنشاء
صناعة الأسمدة التي أحدثت
ثورة في الزراعة.


يتفاعل ثالث أكسيد
الكبريت (SO_3) مع
الماء ليعطي حمض
الكبريتيك



يكون ثاني أكسيد الكبريت
(SO_2) الملامس لمادة حفازة
ثالث أكسيد الكبريت



يحرق الكبريت
(S) في الهواء



عملية التلامس

أنتج حمض الكبريتيك أولاً عن طريق الخيمائيين. أما الآن فهو يصنع مباشرة من
الكبريت؛ إذ يحرق الكبريت أولاً في الهواء للحصول على ثاني أكسيد الكبريت. وفي
المرحلة الثانية يؤكسد ثاني أكسيد الكبريت إلى ثالث الأكسيد. وهذا التفاعل يتسم بالبطء
ومن ثم تستخدم مادة حفازة (خامس أكسيد الفاناديوم) لإسراعها (ص 37، 38). ويسرع
التسخين أيضاً التفاعل (ص 38، 39). وأخيراً يتكون حمض الكبريتيك عن طريق
إجراء تفاعل بين ثالث الأكسيد والماء. وثالث أكسيد الكبريت شديد الفاعلية حتى
أن أنسب طريقة لإجراء هذا التفاعل هي أن يمتص في حمض الكبريتيك الذي يمكن
أن يخفف إلى التركيز المطلوب.


مواد كيميائية لنمو

تحتاج النباتات إلى النيتروجين
لبناء البروتينات. وزيادة محتوى
التربة من النيتروجين يحسن
إنتاجية المحصول. وتحتوي
الأسمدة العضوية التي ترش
أحياناً من الجو على مركبات
النيتروجين التي تنتج غالباً من
الأمونيا المصنعة بواسطة عملية
هابر (ص 38، 39).



مواد كيميائية من البترول

المنتج الرئيسي لصناعة البترول العملاقة هو الوقود، ويوفر حوالي 10٪ من البترول المعالج
المادة الخام للكثير من الصناعات الكيميائية العضوية المعاصرة؛ خاصة صناعة المواد
البلاستيكية والمطاط الاصطناعي مستبدلاً في الغالب مصدر القرن التاسع عشر وهو فحم
الفطران (ص 52، 53). وعلى الرغم من كون الصناعات
الكيميائية عنصراً أساسياً في الحياة العصرية فإن
لها ما يعيبها. فقد سمح لنفايات المصانع
الكيميائية الضخمة أن تلوث المحيطات
والجو (ص 6). ولكن يتم تطبيق
ضوابط مشددة بالتدريج
في محاولة للتحكم في
هذا التلوث.



الصناعات الكيميائية

حتى منتصف القرن الثامن عشر كانت الصناعات الكيميائية بالدرجة الأولى عبارة عن حرف تمتد جذورها إلى عصور سحيقة. وقد شملت هذه الحرف صناعة الزجاج والخزف والصابون والصبغات. وفي العصر الحديث نجد أن أهم مادة كيميائية صناعية هي حمض الكبريتيك، وأنه لضرورة أساسية لجميع أنواع الصناعات من الصبغات والأسمدة إلى التعدين والمواد البلاستيكية. وتعتمد صناعات أخرى مثل صناعة الصابون والزجاج على القلويات مثل البوتاسيوم وكربونات الصوديوم. ويتم الحصول على كربونات البوتاسيوم من مصادر طبيعية وهي الخضراوات، وقد صمم نيكولاس ليبلان (1742-1806) عملية لإنتاج كربونات الصوديوم من ملح الطعام. وقد استبدلت بهذه العملية عملية سولفاي التي نشأت في بلجيكا عام 1865. وكثيراً ما تحدث المشاكل من جراء إقامة المنشآت الصناعية ومعدات تصنيع الكميات الكبيرة؛ ولذا فلأسباب اقتصادية تستمر العمليات الصناعية في العادة - حيث تتم التغذية بإمداد من المواد المتفاعلة ثم تسحب النواتج بشكل مستمر بخلاف الطريقة المتبعة في المعامل وهي «الإنتاج على دفعات».




مواد كيميائية من أجل الغسيل

اقرنت العديد من الصناعات بالمنسوجات والملابس. وقد عرفت أنواع الصابون المصنوعة عن طريق غلي الدهون الحيوانية مع قلوي منذ القرن الثاني عشر. وقد درس ميشيل بوجين شيفر (1786-1889) تركيب الدهون الحيوانية. وقد أدت أبحاثه إلى تحسينات عملية في كل من صناعة الصابون وصناعة الشمع. وفي مناطق إنتاج المنسوجات الرئيسية كانت صناعة المبيضات هامة جداً. وفي حقول التبييض الكبيرة كان يتم تبيض المنسوجات تحت التأثير المشترك لضوء الشمس وحمض اللبنيك الموجود في مخيض اللبن. وقد استخدمت محاليل الكلور بعد أواخر القرن الثامن عشر ولكن إنتاجها غير مستحب.

كربونات الصوديوم من عملية سولفاي

تمت دراسة تفاعل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون ومحلول الملح المركز لإنتاج كربونات الصوديوم (رماد الصودا) عام 1811 ولكن لم ينجح أرست سولفاي (1838-1922) في تطوير عملية تجارية إلا في عام 1865. ويشيع محلول الملح المركز المحتوي على الأمونيا بغاز ثاني أكسيد الكربون في برج الكرينة. ثم يرشح بيكربونات الصوديوم الناتج ويسخن ليعطي كربونات الصوديوم وبعضاً من ثاني أكسيد الكربون الذي يعاد تدويره. ويتم الحصول على المزيد من ثاني أكسيد الكربون عن طريق تسخين الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم) في فرن. ويطلق الجير وهو المنتج الآخر الذي يحصل عليه من الفرن بالماء ويستخدم لإعادة توليد الأمونيا وهي أكثر المواد المتفاعلة تكلفة. واستعادة الأمونيا بكفاءة أمر بالغ الأهمية للنجاح التجاري للعملية.



ألفريد نوبل (1833-1896)

كان البارود الأسود الذي اخترع في الصين هو المادة المتفجرة العسكرية القياسية حتى القرن التاسع عشر. وقد كان نوبل مخترعاً سويدياً ابتكر عملية تجارية لتزويد الجليسين فانتج النيتروجليسرين في شكل الديناميت الآمن نسبياً عام 1866. وقد اخترع الهلام المتفجر عام 1875. وقد كانت كلتا المادتين المتفجرتين مربحة للغاية وعند وفاته أوصى نوبل بتخصيص ثروته وتملكاته كممنحة لجوائز نوبل السنوية.

يقوم المرشح بفصل بيكربونات الصوديوم

برج استعادة الأمونيا

تستعاد الأمونيا باستخدام الجير المطفأ من القرن

المطفأة حيث يطلق الجير بالماء

أسئلة وأجوبة



تلاميذ يكتشفون العلوم في صف دراسي لمادة الكيمياء

س: ما المواد الدراسية التي يجب أن أدرسها في المدرسة لمساعدتي على الاستعداد لمستقبل مهني في مجال الكيمياء؟

ج: يحتاج الكيميائي إلى مهارات ممتازة في حل المشكلات والتفكير النقدي وهذا هو الذي ينبغي أن تركز عليه. والجبر بالذات مفيد وكذلك الهندسة وحساب التفاضل والتكامل والكيمياء متصلة ببعضها البعض بشدة، ولذا فعليك أن تدرس كلاً من العلمين. والكيميائيون أيضاً يحتاجون لأن يكونوا قادرين على التواصل بوضوح وفاعلية ولذلك فإذا كانت مدرستك تقدم دورة للكتابة التقنية فعليك أن تتحقق بها.

محطمو الأرقام القياسية

أخف عنصر

الهيدروجين هو أخف عنصر في الكون، فهو أخف من الهواء 14 مرة.

أثقل عنصر (الأكثر كثافة)

اليورانيوم هو أثقل عنصر يوجد بشكل طبيعي على الأرض.

أكثر العناصر توافراً في القشرة الأرضية

يكون الأكسجين حوالي 45 بالمائة من القشرة الأرضية، ويليه السيليكون ويشكل نحو 25 بالمائة منها.

أكثر العناصر توافراً في أي مكان

يكون الهيدروجين النسبة المئوية 75 بالمائة من كل المادة الموجودة بالكون.

أندر العناصر

الفرانسيوم والاسطاشين هما أندر عنصرين يوجدان بصورة طبيعية على وجه الأرض. وربما كان هناك مقدار يقل عن 30 جراماً (أوقية واحدة) من كل من هذين العنصرين في القشرة الأرضية كلها.

أكثر العناصر شيوعاً في الجسم البشري

الأكسجين (في شكل الماء) هو أكثر العناصر شيوعاً في أجسامنا.

س: ما الكيمياء الخضراء؟

ج: الكيمياء الخضراء هي استخدام الكيمياء لمنع التلوث. وبالتحديد أكثر هي تصميم منتجات وعمليات كيميائية لتقليل أو منع استخدام وتكوين المواد الخطرة.

س: هل الكيمياء الخضراء وعلم البيئة شيء واحد؟

ج: لا. على الرغم من أن كلا مجالَي الدراسة يسعى لجعل

العالم مكاناً أكثر نظافة فإن علماء البيئة يتعرفون على المصادر ويحلون المشكلات في بيئة الأرض بينما يبحث علماء الكيمياء الخضراء عن حلول لهذه المشكلات بهدف منع التلوث من منبعه أثناء مرحلة تصميم منتج أو عملية كيميائية.

س: ما المبادئ التي تحكم الكيمياء الخضراء؟

ج: قام بول أنستاس وجون وارنر أصلاً بوضع المبادئ الاثني عشر الأساسية للكيمياء الخضراء عام 2000 وهي: منع تكوين النفايات؛ تصميم مواد كيميائية ومنتجات أكثر أمناً؛ تصميم عمليات كيميائية تخليقية أقل خطراً؛ استخدام مواد أولية متجددة؛ استخدام التفاعلات الحفازة لتقليل من النفايات؛ تجنب المشتقات الكيميائية؛ تحقيق أقصى قدر من الاقتصاد في الذرات؛ استخدام مذيبات أكثر أمناً وتوفير ظروف آمنة للتفاعلات؛ زيادة كفاءة الطاقة؛ تصميم مواد كيميائية ونواتج لتحلل بيولوجياً بعد الاستخدام؛ إجراء التحاليل في الحال لمنع التلوث وتقليل احتمالات الحوادث بقدر الإمكان.

س: اذكر بعض الوظائف التي يشغلها الكيميائيون؟

ج: الصناعة هي أكبر مستخدم للكيميائيين وتلبيها المدارس والجامعات والحكومات. ويعمل الكيميائيون المتخصصون في الصناعة في مجال أبحاث أو إنتاج البوليمرات، أو الإلكترونيات أو الأدوية أو التكنولوجيا الحيوية أو الأطعمة أو النكهات أو المنظفات أو مستحضرات التجميل. وقد يقوم الكيميائيون العاملون بالحكومة بالأبحاث في المعامل القومية أو قد يعملون في مجالات العلوم الجنائية أو الكيمياء البيئية أو الكيمياء الزراعية أو الأبحاث الطبية أو أبحاث قوانين براءات الاختراع أو الكتابة التكنولوجية.

س: ما المادة الكيميائية؟ وكيف يعرفها العلماء؟

ج: الكيمياء هي دراسة المادة وتفاعلاتها مع المواد الأخرى. ولذا فإن أي شيء مصنوع من مادة - أي سائل أو صلب أو غاز - هو مادة كيميائية. وأي مادة نقية أو خليط من المواد عبارة عن مادة كيميائية. ولكن العلماء يستخدمون هذا المصطلح للإشارة إلى مادة تبدو متجانسة (هي نفسها) خلال تكوينها الذري.

س: ما الفرق بين الكيمياء العضوية وغير العضوية؟

ج: الكيمياء العضوية هي علم تركيب وخواص وتكوين وتفاعلات المركبات العضوية (المركبات التي تحتوي على الكربون). والكربون هو العنصر رقم 4 فقط من حيث توافره ولكنه يكون أكبر عدد من المركبات. والكيمياء غير العضوية تدرس المواد التي لا تحتوي على الكربون، والمعادن التي توجد في القشرة الأرضية على سبيل المثال من المواد غير العضوية.

س: ما الكيمياء التحليلية؟ وما الذي يقوم به إخصائيو التحليل الكيميائي؟

ج: في مجال علم الكيمياء الذي يعرف بالكيمياء التحليلية يبحث العلماء دائماً عن طرق أفضل لقياس التركيب الكيميائي للمواد الطبيعية والصناعية. وتستخدم أساليب هذا العلم للتعرف على المواد الموجودة في مادة ما ولتعيين الكميات التي توجد بها. ويقدم إخصائيو التحليل الكيميائي مساهمات مهمة للعديد من المجالات. ففي مجال الطب يخرجون الاختبارات العملية الطبية التي تساعد الأطباء على تشخيص الأمراض. وفي الصناعة، يختبرون المواد الخام ويؤكدون على جودة المنتج النهائي من الطلاء إلى العقاقير. والقيم الغذائية للأطعمة التي تراها على عبوات الطعام يحددها أيضاً إخصائيو التحليل الكيميائي.

س: ما الكيمياء الحيوية؟ وما الذي يدرسه عالم الكيمياء الحيوية؟

ج: الكيمياء الحيوية هي دراسة المواد الكيميائية والتفاعلات والتأثيرات التي تحدث داخل الكائنات الحية. ومن بين الموضوعات التي يدرسها عالم الكيمياء الحيوية التنظيم الكيميائي للأغذية وخواص الكائنات الحية مثل خلايا الدم وكيمياء الفيتامينات والمعادن.



صورة مجهرية لخلايا الدم الحمراء

حقائق مذهلة



الإيروجل

يوجد العديد من الناس أن رائحة السيارة الجديدة مفضدة للوعى. ولكن هناك أدلة تشير إلى أن رائحة السيارة الجديدة قد تكون سامة بالفعل، وتأتي الرائحة نفسها من خليط من المركبات العضوية المتطايرة التي تستخدم كمواد لاصقة وممانعة للتسرب فتتمسك الأسطح الصلبة للسيارة الجديدة معاً. وتأتي كذلك من أنواع الفينيل والبلاستيك والمنسوجات داخل السيارة، وعلى الرغم من أن الأبحاث المتعلقة بالمخاطر الصحية التي تسببها رائحة السيارة الجديدة، مازالت في طور التجارب، فإن الباحثين قد وجدوا أنها يمكن أن تسبب الصداع والغثيان والتعب، وهي الأمور التي قد تساهم في وقوع حوادث السيارات.

تتحول الجرائد القديمة إلى اللون الأصفر مع الزمن بسبب الليجيتين وهو بوليمر داكن اللون يجعل الخشب صلباً. وفي مصنع الورق يعجن الخشب المستخدم في صناعة ورق الجرائد بكل مكوناته ومنها الليجيتين. وعندما تتعرض جريدة لأكسجين الهواء تبدأ جزيئات الليجيتين في التغير. فتمتص الضوء فيصبح لون الورق أغمق. وتستغرق بداية عملية الاصفرار هذه بضع ساعات من التعرض لضوء الشمس والأكسجين.

النيتروجليسرين سائل كثيف يشبه الزيت ينفجر عند درجات الحرارة المرتفعة للغاية أو إذا تعرض لصدمة مادية. ويستخدم لصنع الديناميت ولكنه يستخدم أيضاً كدواء للقلب. وتتغير هذه المادة (إذا بلعت على هيئة أقراص أو إذا حقنت على هيئة محلول) إلى أكسيد النتريك داخل الجسم مما يوسع الأوعية الدموية ما يقلل من ضغط الدم ويساعد على تخفيف الآلام الصدر.



ديناميت

إن أكثر المواد المعروفة مرارة في العالم هي بنزوات الديناثونيوم، وإن كان لها استخدام يتخذ حياة الكثيرين إذ يضاف مقدار ضئيل منها إلى بعض المواد مثل المنظفات المنزلية ومساحيق الزينة والمبيدات والبترين مما يضفي عليها طعماً بشعاً يساعد على منع الأطفال الفضوليين من شرب هذه المواد الضارة.

الإيروجل أخف مادة صلبة في العالم (أقلها كثافة). وتتكون من السيليكون وله تركيب مسامي شبيه بالإسفنج وأغلبه هواء - 99% من حجمه فضاء خالٍ. وطبقاً لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا تقل كثافة الإيروجل عن كثافة الزجاج 1000 مرة ولكن عزله يزيد 39 مرة عن أفضل عازل من الألياف الزجاجية. وقزن كتلة من الإيروجل بحجم إنسان أقل من رطل واحد غير أنه يمكنها أن تتحمل جسمًا يزن نصف طن. وقد استخدمت ناسا الإيروجل في مهام فضائية لالتقاط جسيمات من أحد المذنبات.

يحتوى نبات النعناع البري وهو أحد أعضاء عائلة النعناع على مركب يسمى نيبيتالاكتون. وعندما تستنشق القملط المنزلية (أو البرية) رائحته تستجيب له بأن تزين نفسها بالقباب وتندرج عليه بفمها وخديها وذقنها وتظهر غير ذلك من السلوك المازح. وبعد عدة دقائق تتناغم القطة مع النيبيتالاكتون وتتصرف. وتتطلب استعادة القطة لضبط مستقبلياتها الكيميائية والتفاعل مع النعناع البري حوالي ساعتين.



نبات النعناع البري



قطة مع لعبة مملوءة بالنعناع البري

لا توجد أية وسيلة لقياس مقدار الرائحة الكريهة، ولكن معظم الكيميائيين يعتبرون مركب أثيل مركابتان ضمن أكثر المركبات ذات الرائحة الكريهة. لذا يضاف مقدار ضئيل من هذا المركب إلى أبرويان وإلى إمدادات الغاز الطبيعي (التي لا رائحة لها) حتى يتسنى للناس شم واكتشاف تسرب الغاز. وإذا استنشقت بخاره بكميات كبيرة يمكنه أن يقتل البشر.

عنصر الفرانسيوم نادر جداً حتى القشرة الأرضية كلها تحتوى على أقل من 30 جراماً منه. ولم يتم فصل هذا العنصر النشط إشعاعياً أبداً بكميات مرفية ولم تنتج أبداً كمية من الفرانسيوم كافية لوزنها.

يتكون رذاذ الظربان من مركبات من الكبريت تعرف باسم ثيولات. (والكبريت هو أيضاً الذي يعطى البيض الفاسد والبصل رائحتهما غير المستساغة). ويستطيع الأنف البشري أن يكتشف الرائحة الكريهة لثيولات رذاذ الظربان حتى في أصغر تركيز لها وهو حوالي عشرة أجزاء في المليار.



الظربان

أى نوع من الجليد لا يذوب أبداً؟ الجليد الجاف هو ثنائي أكسيد الكربون المجمد وهو نفس الغاز الذي نرفره عندما نتنفس وهو أكثر كثافة وبرودة عن الجليد المصنوع من الماء ودرجة حرارته -109.3 فهرنهايت أى -78.5م. وعندما يتعرض الجليد الجاف للهواء فإنه يتسامى بأن يتجاوز الشكل السائل ويتغير مباشرة من حالة المادة الصلبة إلى الحالة الغازية. وكثيراً ما يستخدم الضباب المخيف الذي يصنعه الجليد الجاف في أفلام الرعب والإنتاج المسرحي.



الجليد الجاف

السيانواكربيلات المعروفة عادة بالصمغ الفائق هو مركب كيميائي مفيد جداً في لصق الأشياء ببعضها ولكنه يساعد أيضاً في الربط بين المجرمين ومسرح الجريمة. ويستخدم الكيميائيون المختصون بعلم الجريمة أبخرة السيانواكربيلات للكشف عن بصمات الأصابع على الزجاج والأسطح الأخرى غير المسامية. وعندما توضع الأدلة الآتية من مسرح الجريمة فوق الصمغ الفائق المسخن والماء يتفاعل الغاز الذي يتكون بواسطة الصمغ والحرارة والرطوبة مع المواد الكيميائية الموجودة في بصمة الأصابع تاركة راسماً أبيض وراءها.

معظم الذرة عبارة عن فضاء خالٍ. وأكثر من 99.9 بالمائة من كتلتها تتركز في نواتها ذات الكثافة العالية.

عندما تشعر بحرارة جسم ما فإن الجزيئات بداخله تتحرك بسرعة في اتجاهات عشوائية، وعندما تشعر بأن جسمًا ما بارد فهذا يعني أن جسيماته تتحرك ببطء. وهناك علاقة مباشرة بين مقياس كلفين لدرجات الحرارة والسرعة التي تنتقل بها الذرات. وعند درجة الصفر كلفين أو الصفر المطلق (-459ف أو -273م) تتوقف الجزيئات عن الحركة وتظل درجة حرارتها إلى أقل ما يمكن. وفي أبعد مكان في الفضاء - أعماق الفضاء الخارجي- ترتفع درجة الحرارة درجات قليلة جداً فوق الصفر المطلق.

1796م

يخترع الطبيب ورائد الطب إدوارد جينر لقاحاً لمرض الجدري، فيعطى للأشخاص تطعيمًا (حقنة) من فيروس جدري البقر المرتبط به حتى يتسنى لهم بناء مناعة ضد الجدري، ويطلق جينر على هذه العملية Vaccination المشتقة من الكلمة اللاتينية Vacca التي تعني بقرة.



إدوارد جينر يطعم طفلاً

1805م

يثبت الكيميائي الفرنسي جوزيف جاي لوساك أن الماء مكون من جزئين من الهيدروجين إلى جزء واحد من الأكسجين حجماً.

1808م

يقترح الكيميائي البريطاني جون دالتون النظرية الذرية العصرية معلناً أن كل المادة مصنوعة من ذرات وأن الذرات غير قابلة للانقسام وغير قابلة للتفتت.

1809م

تظهر مصابيح إضاءة الشوارع التي تعمل بالغاز لأول مرة في لندن بإنجلترا.

1827م

يخترع الإنجليزي جون ووكر أعواد الثقاب الفوسفورية، وتشتعل هذه الأعواد عند حكها بأي سطح كاشط.

1833م

يساعد العالم الإنجليزي مايكل فاراداي في إثراء المعرفة المتعلقة بالكيمياء الكهربائية، فيدخل قوانين التحليل الكهربائي ويصوغ مصطلحات مثل قطب ومصعد ومهبط وأيون والكتروليت.

1839م

يبتكر الكيميائي والمخترع ويليام روبرت جروف أول خلية وقود تجمع بين الهيدروجين والأكسجين لإنتاج الطاقة الكهربائية.

1848م

يبتدع العالم والمخترع اللورد كلفين مقياسه لدرجة الحرارة الذي يعرف درجة صفر كلفين على أنها الصفر المطلق وهي درجة الحرارة التي تقف عندها كل الحركة الجزيئية.

1850م

يخترع الكيميائي روبرت بنزن موقد بنزن واليوم لا يكتمل أي معمل علمي مدرسي إن لم يوجد فيه أحد هذه المواقد.

1856م

يبتكر المخترع الإنجليزي هنري بيسمر محول بيسمر لإنتاج الصلب وهي أول عملية لإنتاج الصلب على نطاق واسع بدون تكلفة باهظة.

1863م

يبتكر الكيميائي الفرنسي لويس باستور عملية البسترة.

1859م

ينشر العالم الروسي دميتري مندلييف أول جدول دوري للعناصر.

1860م

يكشف عالم الأحياء السويدي فريدريش ميشلر التكوين، المادة التي تُعرف الآن باسم «دي. إن. إيه» (الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين).

1897م

يكشف الفيزيائي الإنجليزي ج. ج. تومسون أن الإلكترونات جسيمات سالبة الشحنة ذات كتلة صغيرة جداً، مما يضع علامة بارزة على اكتشاف الجسيمات دون الذرية أي الوحدات البنائية الأساسية للمادة.

1898م

تكتشف العائلة البولندية المولد ماري كوري وزوجها الفرنسي بيير الراديوم واليوتونيوم وهما عنصران نشطان إشعاعياً. وقد قضت ماري وبيير حياتهما المهنية في دراسة ما أسمته ماري النشاط الإشعاعي.

1909م

يصمم الكيميائي الدنماركي سورين سورينسون مقياس الرقم الهيدروجيني pH لقياس درجة الحمضية.

1910م

يكمل المخترع الأمريكي توماس أديسون المركب «الحاشدة» المختزنة، القلوي على النحو الأمثل وقد كلف ذلك أديسون ثمانين سنوات ومليون دولار.

1911م

تصبح ماري كوري أول من يحصل على جائزة نوبل بفوزها بجائزة الكيمياء إلى جانب جائزة الفيزياء التي سبق أن حصلت عليها.

1951م

يستطيع العلماء أن يشاهدوا الذرات المنفردة لأول مرة باستخدام مجهر المجال الأيوني.

1951م

تكتشف العائلة البريطانية روزالند فرانكلين شكل الحمض النووي «دي. إن. إيه»، ويعمل عدد من الفرق العلمية على دراسة الـ «دي. إن. إيه» في نفس الوقت ولكن صور فرانكلين الفوتوغرافية غير العادية المعتمدة على الأشعة السينية لـ «دي. إن. إيه» تساعد العلماء على فهم شكل اللولب المزدوج الخاص به.

1961م

تكتشف البوليمرات الفائقة المقاومة للحرارة، وتختبر شرائح السيليكون في نفس الوقت.

1962م

تنشر الكاتبة الأمريكية ريتشيل كارسون «الربيع الصامت» فتكتشف مخاطر مبيد الـ «د. د. ت» وقزع إيمان الناس بالتكنولوجيا وتنبه إلى تأثيرها على البيئة.

1970م

يصمم العالم روالد هوفمان البولندي المولد القواعد التي تحدد المواضع المحتملة للإلكترونات حول النواة.

1985م

انطلاق مشروع الجينوم البشري على يد وزارة الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية وهدفه المعلن هو التعرف على كل الجينات الموجودة في الحمض النووي البشري «دي. إن. إيه».

1986م

أول تجربة طبية لجلد تخليقي يسمى انتيجرا يستخدم لتوفير جلد لزراعة لضحايا الحروق.

1987م

تبتكر شركة يابانية مادة بلاستيكية ذات «ذاكرة» يمكن في درجات الحرارة المنخفضة ثيها وتشكيلها ولكن عندما يتم تسخينها تعود إلى شكلها الأصلي.

2001م


يكشف الباحثون عن تتابع الجينوم البشري وسوف يتطلب فهم وظائف كل الجينات الموجودة في التتابع المزيد من الأبحاث لسنوات طويلة.

2003م

تهدف اتفاقية للأمم المتحدة تعرف باسم بروتوكول كارتاجينا للمزيد من الشفافية والتحكم في التجارة العالمية للمحاصيل المعدلة جينياً.

2004م

تصبح «الكيمياء الخضراء» صناعة تامة كرد فعل للخسائر البيئية الناتجة عن الثورة الكيميائية، والفكرة الأساسية من وراءها تكمن في اعتبار مصمم المادة الكيميائية مسئولاً عن أخذ ما سوف يحدث للعالم عند إطلاق المادة الكيميائية بعين الاعتبار.



يستطيع العلماء أن يشاهدوا الذرات المنفردة لأول مرة باستخدام مجهر المجال الأيوني.

1951م

تكتشف العائلة البريطانية روزالند فرانكلين شكل الحمض النووي «دي. إن. إيه»، ويعمل عدد من الفرق العلمية على دراسة الـ «دي. إن. إيه» في نفس الوقت ولكن صور فرانكلين الفوتوغرافية غير العادية المعتمدة على الأشعة السينية لـ «دي. إن. إيه» تساعد العلماء على فهم شكل اللولب المزدوج الخاص به.

مصباح غازي

يستطيع العلماء أن يشاهدوا الذرات المنفردة لأول مرة باستخدام مجهر المجال الأيوني.

1951م

تكتشف العائلة البريطانية روزالند فرانكلين شكل الحمض النووي «دي. إن. إيه»، ويعمل عدد من الفرق العلمية على دراسة الـ «دي. إن. إيه» في نفس الوقت ولكن صور فرانكلين الفوتوغرافية غير العادية المعتمدة على الأشعة السينية لـ «دي. إن. إيه» تساعد العلماء على فهم شكل اللولب المزدوج الخاص به.

الخط الزمني

تعرف الكيمياء بأنها علم التغير - وقد جلبت كمًا هائلًا من التغير في حياتنا اليومية عبر التاريخ. ومنذ أن تعلم القدماء كيف يستعملون النار ويتحكمون فيها إلى جيلك الذي يسخن وجبة الطعام في فرن الميكروويف تحيط بنا الكيمياء دائمًا. وفيما يلي خط زمني لبعض الأشخاص المهمين والتطورات الرئيسية والابتكارات الجوهرية في عالم الكيمياء.



المجهر (الميكروسكوب) المركب

1590م
يخترع صانع العدسات الهولندي زكارياس يانسن الميكروسكوب (المجهر) المركب (مجهر يحتوي على أكثر من عدسة).

1610م
ينشر العالم الفرنسي جان بييجان أول كتاب يتناول الكيمياء فقط.

1620م
يضع العالم البلجيكي يوهانس فان هلمونت المصطلح «غاز». وتشتق هذه الكلمة من الكلمة الفلمنكية التي تعني هوضي.

1660م
يؤسس روبرت بويل الجمعية الملكية بلندن حيث تعقد جماعات من العلماء لقاءات منتظمة تدور حول موضوع معرفي مشترك عن طريق الدراسة التجريبية.

1748م
يستخدم السياسي والمخترع الأمريكي بنيامين فرانكلين مصطلح «بطارية» لأول مرة للإشارة إلى لوحين زجاجيين مشحونين.

1755م
يصبح الكيميائي الإسكتلندي جوزيف بلاك أول شخص يفصل ثاني أكسيد الكربون في حالة نقية تمامًا.

1774م
يكتشف العالم الإنجليزي جوزيف بريستلي ما أسماه «هواء منقوص اللامحوب» - الفلوجيستون. وسوف يسميه العالم الفرنسي أنطوان لافوازييه فيما بعد الأكسجين.

1775م
يكتشف جوزيف بريستلي حمض الهيدروكلوريك والكبريتيك.

1777م
يعرض أنطوان لافوازييه التي تقول بأن المركبات الكيميائية تتكون من أكثر من عنصر.

1792م
تؤسس أول جمعية مخصصة للكيمياء في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

حوالي 105م
يخترع الورق في الصين عن طريق خلط القنب ولحاء شجر التنوت وخرق القماش بالماء. ولا تنشأ صناعة الورق الأوروبية إلا في حوالي عام 1150.

673م
«النيران الإغريقية» خليط من الكبريت والنفثا والجير من السلاح السري للجنود الرومان. ويطلق السائل خلال سيفونات على السفن المعادية التي تنفجر مشتعلة على الفور.

850م
في إسبانيا يبتكر مسلمو الأندلس شكلًا من الطلاء الكهربائي للنحاس محضرين النحاس النقي عن طريق إجراء تفاعلات بين أملاحه وبين الحديد.



«النيران الإغريقية» سلاح مميت في معركة بحرية

1000م
يخترع الصينيون البارود. ويستخدم البارود - وهو خليط من نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت. لصنع الألعاب النارية والإشارات الضيقة وفيما بعد الأسلحة المسماة «بالأسهم النارية».

حوالي 1000-1650م
عصر الكيمياء. يضع الكيميائيون أسس الدراسة العلمية كما نعرفها الآن وخصوصًا الكيمياء.

1250م
يكتشف الكيميائي الألماني ألبرتوس ماجنوس الزرنيخ وهو شبه فلز بلوري هش لونه رمادي مثل الصلب.

1477م
يكتب الكيميائي الإنجليزي توماس نورتون حول أهمية التدقيق والشم في التحليل الكيميائي.

1540م
يصنف العالم الألماني هاليريوم كوردياس الأثير على أنه مخدر ويصنع الأثير من الكحول وحمض الكبريتيك.

حوالي 8700 قبل الميلاد (ق. م)
استخدم النحاس في الحضارات القديمة، وذلك لصنع الأسلحة في المقام الأول. واستفاد قدماء المصريين لأقصى درجة من مقاومة النحاس للتآكل فصنعوا مسامير وأربطة لبناء السفن ومواسير نحاسية لحمل الماء.

حوالي 4000 ق. م
أول استخدام للحديد في الحضارات القديمة في العراق ومصر لصنع أسنة الرماح وأسلحة أخرى. وقد أدخلت أشغال الحديد إلى أوروبا حوالي عام 1000 ق. م.

حوالي 3000 ق. م
يصنع الزجاج في مصر عن طريق خلط الرمل والصودا والجير. وتعطى إضافة أكاسيد الفلزات للخليط لونا للزجاج ويستخدم المصريون أيضًا البرونز وهو أشابة من القصدير والنحاس في ذلك الوقت.

600 ق. م
يقترح الفيلسوف الصيني لاو - تزو أن المادة تتكون من خمسة عناصر: الماء والفلز والأرض والخشب والنار. وقوى «ين» و«يانج».

500 ق. م
يستخدم النحاس الأصفر وهو أشابة من الزنك والنحاس على نطاق واسع في روما القديمة.

حوالي 460 ق. م
موتد الفيلسوف الإغريقي ديموقريطس الذي رأى (مستخدماً أفكار أستاذه ليوسيبس) أن المادة توجد على هيئة جسيمات وهو أساس النظرية الذرية.

حوالي 450 ق. م

يعلم الفيلسوف الإغريقي أمبيدوكليس أن المادة كلها تتكون من العناصر الأربعة: التراب والهواء والنار والماء. وفيما بعد تؤيد هذه النظرية وتطور من قبل أرسطو. وهذا المفهوم يؤثر أيضًا على تطور الكيمياء.



أمبيدوكليس



الكيمياء في الغرفة المظلمة


انضم لإحدى ورش العمل الخاص بالتصوير الفوتوغرافي أو اسأل مدرس الرسم في مدرستك إذا كانت هناك صفوف دراسية متخصصة في التصوير الفوتوغرافي. إن التعرف على كيمياء التصوير الفوتوغرافي وطباعة الصور الخاصة بك من الممكن أن يكون أمراً ساحراً ورائعاً أيضاً.



موقد بنزن




الهيليوم والميثان



إعادة تدوير البلاستيك

القيام بجولة في معمل للكيمياء


تتيح الكثير من الكليات والجامعات (وبعض الصناعات القائمة على الكيمياء) جولات لمعاملها الكيميائية للمجموعات المدرسية يصحبها خلالها مرشد من طرفها. وذلك كجزء من برامجها الموجهة للمجتمع. وقد يكون في استطاعتك رؤية معمل فعلي على أرض الواقع. علاوة على هذا، تتيح بعض الجولات الفرصة لأجراء التجارب العلمية باستخدام الأدوات المعملية الرائعة. اطلب من معلمك أن يساعدك في إيجاد برنامج من هذا النوع بالقرب منك أو بكلية على مقربة منك مباشرة واسأل عن الأهم «المفوحة» القادمة التي توفرها للزيارة.



ينتظر المراقب النتائج


تجعل المواد الكيميائية الصورة تظهر

إن توثيق ما تقوم به من عمل هو جزء أساسي في ممارسة الكيمياء



الالتحاق بصف الكيمياء

إذا كنت مهتماً بالكيمياء، فيمكنك القيام بالتجارب العملية واكتشاف عجائب الكيمياء من خلال صف الكيمياء في مدرستك. كما يمكنك الانضمام إلى ورشة عمل أو معسكر للكيمياء. هذا، وتتيح الكثير من المراكز العلمية والجامعات مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية الكيميائية المسجلة مسبقاً، والتي تعد من جلسات تعقد في يوم واحد إلى ورش عمل ذات ساعات عمل أطول. ابحث عبر الإنترنت لتعثر على ناد أو ورشة عمل للكيمياء بالقرب منك.




الكيمياء في الكهف

إن التكوينات الرائعة التي سترها إذا قمت بجولة في أحد الكهوف الواقعة تحت الأرض (مثل هذا الكهف الموجود في اليونان) هي نتيجة عمل الكيمياء. تتكون الكهوف تتكون عند مرور الماء عبر التربة الواقعة فوق الكهوف ثاقبة كميات ضئيلة من الحجر الجيري في أثناء ترشحها إلى الأسفل. ومع تقطر هذه المياه ببطء خلال سقف الكهف، تتسخر قطرات المياه الصغيرة تاركة خلفها كميات صغيرة من الحجر الجيري على سقف الكهف والأرضية وعلى مدار ملايين السنين. تتكون تكوينات الكهوف جسيماً لمر الآخر.

اكتشف المزيد

يمكن القول أن الكيمياء تشكل - أكثر من أي علم آخر - جزءاً مهماً من حياتنا اليومية. فمن وعاء الخبوب المخلاة (صناعة الغذاء) الذي يتناوله الأطفال في الصباح إلى الوسادة التي ننام عليها في المساء (أنسجة القماش المخلقة)، نجد أن الكيمياء تحيط بمختلف جوانب حياتنا بصفة دائمة. وفيما يلي ذكر لبعض السوائل التي يمكنك من خلالها اكتشاف المزيد عن الكيمياء. إن زيارة إلى معمل الكيمياء في إحدى الجامعات، أو لمتحف العلوم أو لمركز للعلوم ستسمح لك بتعلم المزيد عن الكيمياء بصورة عملية. ولعل أفضل الأساليب لتعلم الكيمياء يكمن في محاولة تنفيذ مشروع علمي أو في الالتحاق بأحد صفوف تعليم الكيمياء أو ورشة عمل في أحد المراكز العلمية. كذلك، فإن بعض المراكز العلمية توفر للأطفال أندية علمية يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام وتعليم أيضاً لهم.



القيام بتجربة علمية

يجب علينا ألا ننتظر حتى يتعدّد معرض للعلوم كي نقوم بتجربة كيميائية رائعة، مثل هذا «البركان» الثائر. بل يمكنك البحث على الإنترنت أو في المكتبة عن دليل خاص بالمشايخ الكيميائية. ولن يتطلب الأمر منك استخدام أدوات أو مواد كيميائية خاصة - فمعظم المشايخ تستخدم مواد متوفرة بالقرب من منازلنا. وكما هو الحال مع أي تجربة علمية، فإن الأمر سيطلب إشراف شخص بالغ على المشروع الذي تقوم به كي يتأكد من سلامتك.

يتوهج الزجاج
المصهور بالحرارة

تشكل الأداة
قاعدة الزهرية



زيارة إلى أحد معامل تفخ الزجاج

مع تعلم القدماء كيفية التحكم في النار، فقد شرعوا في إجراء التجارب الكيميائية، مما أدى لاكتشافهم كيفية صهر الرمل والصودا لتكوين الزجاج، وكيفية إضافة الأكاسيد لتلوينه. هذا، ويعمل نافخو الزجاج العصريون في الغالب بالأسلوب ذاته الذي اتبعه الحرفيون القدماء.

يوم في المتحف

هل يمكنك أن تحدد الفرق بين مرقد بزن وفرن بسم؟ إن زيارة واحدة تقوم بها إلى متحف العلوم أو مركز للعلوم ستساعدك في الإجابة على هذا السؤال. ويمكن القول أنك ستزى في المتحف أمثلة للكثير من الأدوات والأجهزة العلمية الموجودة في هذا الكتاب، كما ستعرف المزيد من المعلومات حول الرجال والنساء الذين كانت لهم ابتكاراتهم في مجال الكيمياء. هذا، وقد تم تصميم الكثير من مراكز العلوم بحيث يتمكن الزوار من إجراء التجارب الكيميائية بأسلوب مرح ومشوق.



كيمياء المطبخ

إن مطبخك هو معمل كيميائي متكرر. فالطهي - بداية من خبز الكعك إلى صنع عجينة البيتزا باستخدام الخميرة - هو ممارسة فعلية للكيمياء. وعليك عندما تقوم بالطهي محاولة اكتشاف مبادئ الكيمياء التي يتم تطبيقها بصورة عملية.

مواقع إلكترونية مفيدة بالإنترنت:

يضم هذا الموقع ألعاباً ومواد مسلية ذات علاقة بالكيمياء مخصصة للأطفال، وهو خاص بالجمعية الكيميائية الأمريكية.

www.chemistry.org

يتناول هذا الموقع أسس الكيمياء بأسلوب ملائم للأطفال.

www.chem4kids.com

يعرض هذا الموقع الموضوعات الكيميائية بأسلوب رائع، كما يضم مشايخ وألعاباً جذابة.

www.chemmybear.com

قم بطهي بعض الوصفات الكيميائية في مطبخ حقيقي أو افتراضي.

www.pbskids.org/zoom/games/kitchenchemistry/



الطر الحمضي: تساقط (أمطار أو ثلج أو ضباب) يحتوي على كميات ضارة من حمض النتريك والكبريتيك اللذين تكونا في الأصل من أكاسيد النتروجين والكبريت التي تنطلق إلى الجو عندما يحرق الوقود الحفري.

المطياف: جهاز علمي يقسم الضوء إلى الأطوال الموجية التي يتكون منها لإجراء القياسات.



ملح مشتق من النحاس

مقياس الرقم الهيدروجيني: مقياس يستخدم لقياس الحموضة. ويتراوح هذا المقياس بين 1 و14 بحيث يميز الرقم 7 المحاليل المتعادلة.

الموصل: أي مادة تنقل الكهرباء أو الحرارة بسهولة.

موقد بترن: موقد غازي يستخدم في المعامل وهو مزود بصمام هوائي لكي ينظم خليط الغاز والهواء.

النابلون: أول نسيج مخلق صناعيًا بالكامل. ويشتهر النابلون بقوته الشديدة ومرونته الممتازة.

النواة: مركز الذرة عالي الكثافة ذو الشحنة الموجبة.

النيوترون: أحد الجسيمات الأساسية التي تتكون منها الذرة. وكتلة النيوترون تساوي تقريبًا كتلة البروتون ولكن ليس للنيوترون شحنة كهربائية.

التيون: عنصر غازي خامل لا لون له. وتصنع لمبات إضاءة النيون من أنابيب زجاجية مفرغة تملأ بغاز النيون بضغط منخفض.

الهليوم: ثاني العناصر من حيث خفة الوزن ومن حيث توافره وهو عبارة عن غاز تتكون نواة ذرته من بروتونين ونيوترونين.

طبقات من الكرتون بين أقراص من النحاس والزنك

العمود الفلظائي

الكيمياء الحيوية: العلم الذي يدرس كيمياء الكائنات الحية وتشمل البشر.

المادة الحفازة: مادة تسرع معدل التفاعل الكيميائي بدون أن تستهلك في التفاعل.

المادة الكيميائية: عنصر (على سبيل المثال الكلور) أو مركب (على سبيل المثال بيكرينات الصوديوم) ناتج عن تفاعل كيميائي.

المتفاعل: القابل للتفاعل بسرعة أو بنشاط شديد أو غير المستقر عند تعرضه للصدمة أو للحرارة.

محلل المعادن: شخص يقوم باختبار أو تقدير المحتوى الفلزّي في المعادن.

المحلول: خليط متجانس من مادتين أو أكثر، غالبًا (ولكن ليس دائمًا) ما يكون سائلًا.



جزء

العنصر: أحد المواد المعروفة التي تزيد عن مائة مادة (منها 92 توجد بصورة طبيعية) لا يمكن فصلها إلى مواد أبسط منها وهي التي تتكون أو تصنع منها كل المادة.

الغاز الخامل (التبييل):

واحد من مجموعة من الغازات

النادرة (الهيليوم والزينون والأرجون

وغيرها) التي تتسم باستقرار شديد ومعدلات تفاعل بالغة الانخفاض. ويطلق على الغازات الخاملة أيضًا اسم الغازات النبيلة.

غير قابل للذوبان: تعبير عن مادة ما لا يمكنها أن تذوب في سائل.

غير المتفاعل: لا يظهر أي بوادر للتفاعل الكيميائي.

الفلز: واحد من عدة عناصر كيميائية عادة ما تكون مواد صلبة لامعة يمكنها أن توصل الحرارة والكهرباء ويمكن تشكيلها بسهولة على هيئة ألواح.

قابل للذوبان: يمكنه أن يذوب في مادة أخرى.

قابل للطرق: يمكن تشكيله بواسطة الطرق أو الكبس أو التشكيل أو الثني.

القاعدة: أي من المركبات المتعددة التي تذوب في الماء وتحول لون ورقة عباد الشمس إلى الأزرق وتتفاعل مع حمض لتكون ملحًا وماء ورقمها الهيدروجيني يتراوح ما بين 7 إلى 14.

القلوي: وصف للماء أو التربة التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد القلوية (أملاح مختلفة قابلة للذوبان). وعلى وجه العموم فإن هذه الكلمة تشير إلى أي مادة رقمها الهيدروجيني يزيد على 7. والقواعد قلوية دائمًا على حسب تعريفها.

الكثافة: النسبة بين كتلة مادة ما والحجم الذي تشغله فإذا كان لجسمين نفس الحجم فسوف يكون وزن الجسم المصنوع من المادة الأكثر كثافة أكبر.

الكيمياء: علم المادة؛ وهو فرع العلوم الطبيعية الذي يتناول تركيب المواد وخواصها وتفاعلاتها.



وهج النيون يضيء الليل

المركب: مادة متكوّنة من اتحاد عنصرين أو أكثر أو من مكونات بنسب محددة بالوزن.

المزيج المعلق: خليط جسيمات دقيقة في سائل.

المستحلب: معلق من قطرات من أحد السوائل في سائل آخر (مثل الزيت في الماء). ولا يتحد السائلان بل يعلق كل منهما في الآخر.

المصطلحات

الاختزال: أى عملية تضاف فيها الإلكترونات إلى ذرة أو أيون.

الأملاح: مركبات يمكن أن تتكون عن طريق استبدال أيون هيدروجين أو أكثر من حمض بأيون موجب آخر.

الإنبيق: وعاء يستخدم للتقطير.

الأزيم: بروتين يعمل كمادة حفازة، فيسرع معدل التفاعل الكيميائي.

البخار: معلق من جسيمات مادة ما في الهواء.

البروتون: أحد الجسيمات الأساسية التي تكون الذرة. ويوجد البروتون في النواة وله شحنة موجبة مساوية للشحنة السالبة للإلكترون. وللبروتون أيضًا كتلة مشابهة لكتلة النيوترون.



الإنبيق

البروتين: جزيء كبير يتكون من سلسلة أو أكثر من الأحماض الأمينية في ترتيب محدد. والبروتينات ضرورية لتركيب الخلايا والأنسجة والأعضاء وقيامها بوظائفها وتنظيمها.

البلاستيك: اسم عام للمواد المخلقة أو نصف المخلقة التي يمكن أن تتشكل عن طريق القوالب أو البثق فتنتج أشياء مثل الأفلام أو الخيوط أو تستخدم لصنع الطلاء.

البولي إيثيلين: إحدى المواد البلاستيكية وهو مصنوع من الإيثيلين ويستخدم في صنع أكياس القمامة وزجاجات اللبن وزجاجات الشامبو وأغلفة الكابلات إضافة إلى أشياء أخرى.

التأكسد: العملية الكيميائية التي يتم فيها اتحاد الأكسجين بعنصر أو مركب وعلى سبيل المثال تأكسد الحديد ليكون الصدأ.

التحليل الكهربائي: عملية تكسير مركب كيميائي إلى عناصره عن طريق إمرار تيار كهربائي مستمر خلاله، فعلى سبيل المثال ينتج التحليل الكهربائي للماء الهيدروجين والأكسجين.

التخليق: عملية تجميع أجزاء معا ليتكون كل جديد، وتعد هذه العملية في الكيمياء تكوين المركبات من عناصر أبسط منها.

التركيب الجزيئي: الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات في الجزيء.

التفاعل الكيميائي: أى تغيير يؤدي إلى إحداث اختلاف في خواص مادة، أو إلى تكوين مادة جديدة.

التقطير: عملية تسخين سائل حتى درجة غليانه ثم تكثيف البخار بالتبريد وتجميع السائل المكثف في وعاء منفصل.

الجدول الدوري: لوحة تبين كل العناصر مرتبة في أعمدة، حيث يضم كل عمود عناصر تتشابه خواصها الكيميائية.

الجزيء: مجموعة من ذرتين أو أكثر تتماسك بواسطة الروابط الكيميائية، وهي أصغر وحدة للمركب تظهر فيها خواص هذا المركب.

الجسيم: كيان مجهري ذو كتلة وشحنة محددين.

الحمض: مادة كيميائية غنية بالهيدروجين تتفاعل مع الفلزات لتكوين الأملاح ومع أكاسيد الفلزات والقواعد لتكوين ملح وماء. وللأحماض طعم حمضي مميز وهي تحول لون ورق عباد الشمس إلى الأحمر ويقل رقمها الهيدروجيني عن 7.

الحمض النووي: «دي. إن. إيه» (الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين) الجزيء المسئول عن حمل المعلومات الوراثية اللازمة لتنظيم وتشغيل معظم الخلايا الحية واستئصال عن التحكم في وراثتها الصفات والمميزات.

الخلاصة: منقوع أو محلول يتكون من طريق نقع أو غمر مادة ما، عادة في الماء.

الخيمياء: من ممارسات العصور الوسطى وعصر النهضة السابقة للكيمياء العصرية. والخيمياء هي محاولة اكتشاف مفتاح تحويل المواد الكيميائية. وأساس الخيمياء هو النظرية القائلة بأن كل المادة تتكون من تجمعات مختلفة من أربعة عناصر أساسية: الهواء والماء والتراب والنار.

دورة الكربون: التبادل المستمر الذي يتحرك الكربون بمقتضاه في الغلاف الحيوي، وعملية تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى كربوهيدرات عن طريق التمثيل الضوئي ثم عودته إلى الغلاف الجوي عن طريق أيض الحيوانات وتحللها.

الذرة: أصغر مكونات العنصر التي يمكن أن توجد وحدها أو متحدة مع غيرها وتتكون الذرة من سحابة إلكترونية ونواة مركزية.

الرابطة: القوة التي تمسك بالذرات معا في الجزيء. وعندما تتشارك ذرتان في الإلكترونات أو عندما تعبر ذرة إلكترون أو أكثر لذرة أخرى فإن الذرتين تتصلان برابطة كيميائية.

الرابطة الأيونية: رابطة كيميائية بين أيونين تنتج من قوة التجاذب بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة.

الرابطة التساهمية: رابطة بين ذرتين تتكون باشتراكهما في زوج من الإلكترونات.

الزيوت العطرية: زيوت فعالة ذات رائحة قوية تستخلص من النباتات عن طريق التقطير أو التبخير أو العصر.

السبيكة: خليط يحتوي على فلزين أو أكثر، عادة ما يصهران معا أو يذاب كل منهما في الآخر وهما سائلان.



بالونات الهليوم

الصدأ: غطاء أحمر أو بني من الأكسيد الهش يتكون على الحديد أو أشابته. ويتكون الصدأ نتيجة للتعرض للهواء والرطوبة أو لمواد كيميائية.

صبغة عباد الشمس: مادة أرجوانية اللون يتم الحصول عليها من الأشنة (من الفطريات). ويستخدم صبغة عباد الشمس مع الورق لصنع ورق عباد الشمس. ويتحول لون هذا الورق إلى الأزرق في المحاليل القلوية وإلى الأحمر في المحاليل الحمضية، مما يجعل منه كاشفاً حمضياً-قاعدياً تقريبياً.

العضوي: المتصل أو المنتمي إلى فئة من المركبات الكيميائية التي تحتوي على الكربون.



شرائخ من ورق عباد الشمس

(أ)

الاحتراق 30، 31
الأحماض العنصرية 16، 17
الأحماض والقواعد 42، 43، 44، 45
اختبار اللهب 59
أشباه الموصلات 27
أفوجادرو، أماديو 17
الأكسجين 18، 23، 24، 26
الاحتراق 30، 35
الأكسدة 40، 41
العمليات الحية 31، 34، 51
الكربوهيدرات 49، 60
الماء 18، 20، 29، 46
الهواء 28، 29
الألومنيوم 18، 24، 47، 60
الأملاح 44، 45، 49
الأحماض والقواعد 42
الإلكتروليت 46
التحليل 31
غير القابل للذوبان 58
الفلز 10، 19، 20، 24، 25، 34
الأملاح المتبلرة 20، 21، 55
الأمونيا 32، 42، 43، 48، 62، 63
الأنزيمات 34، 35، 37، 50
الأوزون 33، 34
أول أكسيد الكربون 36، 37
إيدوميترى 29، 60
الأيونات 20، 39، 42، 43، 44
التحليل الكهربائي 46، 47

(ب)

باركسين 54
البارود 10، 38، 62
البالكليت 53، 54، 55، 57
البتروكيمويات 6
البترول 36، 52، 58، 63
البخار 7، 35، 53
المادام 33، 36، 37
براج، لورانس 21
براج، ويليام 21
برنغلو، مارسيلان 48
برنغليوس، يانس ياكوب 59
بركين، ويليام هنري 52
البروتونات 14، 22
البروتونات 8، 11، 34، 50، 51، 63
بريستلي، جوزيف 28، 29، 30
البلاطين 23، 26، 27، 36، 37
بلاك، جوزيف 60
البورات 13، 16، 17، 44
بنزن، روبرت 19، 31، 59
البنزين 48، 49، 52، 53
البوتاسيوم 22، 23، 25، 34، 40، 63
البوكسيت 18، 25، 47
بولي إيثيلين 56، 57
بولي فينيل كلورايد (بي. في. سي) 55، 57، 58
البوليمرات 49، 54، 55، 57
بيكرمونات الصوديوم 7، 63
بيكلاند، ليو 53، 55

(ت)

التآكل 38، 46، 47
التبخير 7، 14، 15
التحليل الطيفي 45، 59
الامتصاص الذري 59
التحليل الكهربائي 25، 26، 27
التحليل الحجمي 61
التحليل الكروماتوجرافي 15، 60
تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 12، 35
التخمير 7
الترشيح 14، 35
التعدين 12، 18، 24
تفاعل الإزاحة 34
التفاعل الكيميائي الكهربائي 41
تفاعلات الأكسدة 40، 41
التفاعلات العكسية 34، 36، 39
التفاعلات النووية 18، 35

التفاعلية 25، 33، 34، 36
التقطير 7، 12، 13
التجزئي 15، 52، 53
التقطير التجزيئي 15، 32، 52، 53
التلوث 29، 32، 36، 44، 63
الأوزون 34
التمثيل الضوئي 34، 36، 50

(ث)

الثاليوم 19، 23، 44
ثاني أكسيد الكبريت 6، 38، 63
ثاني أكسيد التيتروجن 6

(ج)

الجدول الدوري 21، 22، 23، 25، 26، 33، 32
الجرافيت 27، 48
الجزئيات 8، 14، 16، 17، 38
البوليمرات 54، 56، 57
تغير الحالات 7
السكر 50
الركبات 20
النشا 37
جهاز كشافة البخار 17
جهاز كيب لتوليد الغاز 58
جوخير، تشارلز 52

(ح)

حامض الستريك 9، 42
الحجر الجيري 9، 28، 40، 45، 48، 49
عملية سلوفاي 62، 63
الحديد 11، 18، 20، 22، 45
الإنتاج 40، 41
لكبريت 20، 21، 34
كبريتيد النحاس 47
الحبر 8
الصناعي (الاصطناعي) 53
حمض الخليك 17، 42
حمض الكبريتيك 27، 36، 42، 44
الصناعة 62، 63
مطفئة الحريق 7
حمض اللينيك 41، 48، 49
حمض التريك 6، 12، 39، 42، 54
تي. إن. تي 53
الملح 44
الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (دي. إن. إيه) 51
حمض الهيدروكلوريك 12، 26، 36، 39، 42، 44، 58

(خ)

الخامات المعدنية 10، 12، 18، 25، 34
الاسترنتيوم 25
الألومنيوم 47
الحديد 40
النحاس 47
الخصاب (الصبغات) 10، 44، 60
الخلايا 50، 51
غلايا فولطانية 25، 46

(د)

دالتون، جون 16
درجة الحرارة 24
الاحتراق 30
الأرض 51
التفاعلات 20، 30
الدم 6، 7، 9، 31، 51
الدهون 7، 40، 41، 49
ديسلفيد الكربون 53
ديفي، سير همفري 25، 46، 58
الديناميت 36، 62

(ذ)

الذهب 15، 18، 46، 47
الذبلون 12، 42

(ر)

الراديوم 19، 22، 33، 35
رامزي، وليام 32
الرايون 53

ريذرفورد، أرنست 35
الرصا 12، 23
الروابط 20، 25، 48، 49، 50
الروابط الأيونية 21، 20، 44
الروابط التساهمية 20، 49
الرواسب 35، 44، 58

(ز)

الزئبق 23، 24، 28، 30، 31
الزجاج 47
الزجاج 10
الصناعة 11، 13، 45، 46
الزنك 17، 18، 23، 30، 46
السبيكة 15
الزيتون 50، 58
الغمام 6، 15
الغمر 10
الغطري 9، 12، 13

(س)

السبيكة 11، 15، 24
السكر 35، 37، 48، 49، 50، 60
السولون 53، 54، 55
السليكون 18، 23، 26، 27، 41
السليكا 24، 40، 45

(ش)

شمال، جورج أرنست 30

(ص)

الصايون 42، 43، 53
التصنيع 62
الصفحات (الخصاب) 6، 10، 15، 42
61، 59
المخلقة 52، 53، 62
الصدأ 40، 41، 47
الصلب 8، 40، 41، 46، 47
الصوديوم 10، 18، 19، 32
استخلاص الألومنيوم 47
الأيونات 20، 21
الفصل 25، 36، 46
الصيغ 17

(ط)

الطب الشرعي 6، 43
حلا، بالكهرباء 46
الطيف 19، 44، 59

(ع)

المعشلات 8، 31، 41، 51
العقاقير 6، 10، 52، 53
علم دراسة البلورات بالأشعة السينية 20
عملية سوتفاي 62، 63
العناصر 16، 18، 19، 50
التحليل الكهربائي 46، 47
الجدول الدوري 21، 22، 23
الرموز 59
الفلزات 24، 25
الركبات 20، 34
العناصر المتعة 19، 53

(غ)

الغازات العاملة 20، 26، 29، 32، 33
الجدول الدوري 23

(ف)

فاراداي، مايكل 49
الفحم 49، 50، 52، 53، 63
الفسفور 23، 36، 37، 40، 63
فصل المخاليط 7، 13، 14، 15، 20
الفضة 12، 15، 23، 58
الفصل 42، 47
الفلزات 10، 18، 25
الاحتراق 30، 38
الأكاسيد 12، 30
الأملاح 19، 20، 44، 58
البطارية 46
التحليل 58، 59
التفاعلية 36

الخصائص 22، 24، 25
الخصائص 12
الذرات 38
الرموز 13
السبيكة 24
الصهر 10، 11
الطين 19
الفضة 34
القاعدة 12

الفلكلة 52، 54
الفلورين 26، 27، 33، 34، 40
فولدا، أليساندرو 66
فون ليبيج، يوستاس 63
الفيتامينات 9، 20، 21، 29

(ق)

القطب السالب (المهبط) 27، 46، 47
القلويات 8، 25، 42، 44، 53، 62
القواعد 7، 12، 24، 39، 42، 43، 44، 46

(ك)

الكاشف 42، 61
الكاشف الشامل 42، 43
كافنديش، هنري 29
الكالسيوم 5، 18، 22، 44، 53
الكبريت 14، 20، 23، 27
الحديد 20، 21، 34، 40
الفلكلة 52، 54
كبريتيد النحاس 47
النظام الغذائي 18
كبريتات النحاس 14، 17، 38، 47
البلورات 15، 44، 45، 49
كبريتيد النحاس 47، 58
إلكترونيك 46، 47
التكامل الذرية 16، 17، 32، 59
الجدول الدوري 22، 23
الكحول 7، 59، 61
الكربون 11، 27، 30، 40، 41
إنتاج الصلب 41
ثاني أكسيد الكربون 39، 41، 48، 49

العمليات الحية 34، 35، 50، 51
الغاز 28، 32، 36، 37
الركبات 48، 49، 50، 60
مطفئة الحريق 7
النحاس 38، 44
كربونات الصوديوم 45، 62
كربونات كالسيوم 9، 38، 44، 45، 49
الكربوهيدرات (الكربوهيدراتية) 34، 50، 49
كروكس، سير وليام 19، 32، 33
كسترن، هاميلتون 47
الكلور 20، 23، 26، 40
كلوريد الصوديوم 20، 21، 44
التحليل الكهربائي 46
الكهرباء 20، 21، 46، 47
كيمياء الغازات 28، 31
الكيمياء القديمة (الكيمياء) 12، 13، 27، 35، 63

(ل)

لافوازييه، أنطوان 16، 18، 30، 31
اللاهوب (فلوجيستون) 29، 30
لوشاتيليه، هنري لويس 39
لونسديل، كاثلين 27
ليبايوس، أندرياس 12

(م)

الماء 7، 14، 17، 20، 28
المخار 48، 51
التبخير 15
التحليل الكهربائي 46
التفاعلات 6، 25، 34، 35، 44
التنقية 44
الرقم الهيدروجيني 42، 43
العصر 53
تصنيفات الحية 35، 50، 51
الركبات 18، 60

المكربن 28، 29
الناس 27، 48
الماغنسيوم 18، 22، 25، 40
الأملاح 44، 53
التآكل 47
المجهر النفقي الماسح 17
المحولات الحفازة 36، 37
المخاليط 7، 14، 15، 24، 28
المذيب 14، 38
البوليمرات 54
الصناعي 52، 53
الفصل (التحليل) الكروماتوجرافي 15

الركبات العضوية 8، 9، 43، 48، 49، 59
الاصطناع (التخليق) 52، 53
التحليل 60
الكيمياء 63
الركبات العطرية 49، 52
السييل (مقياس التقل النوعي) 61
المطاط 52، 54
الاصطناعي (الخليق) 63
المطاط 18، 19، 32
المعادن 12، 18، 31، 32، 42
الرواسب 24
الزيت 58
معدلات التفاعل 38، 39
التقطيب 48
مقياس الرقم الهيدروجيني 42، 43
المكسر (مقياس انكسار الأشعة) 60
الثلج 20، 21، 45
البطارية 46
معدلييف، دميتري 22، 23، 25، 33
منظار أشعة ألفا 19
المواد الحفازة 7، 36، 39، 44، 63
الأزومات 34، 35، 50
المواد البلاستيكية 56، 57
المواد البلاستيكية 6، 53، 54، 57، 63
موسان، هنري 26
الموصلات 21، 24، 26
الموصلية 27، 46

(ن)

النشوجلسرين 62
النحاس 6، 7، 32، 34، 38
الأملاح 44، 45
البطارية 46
السبيكة 11، 15، 24
السلوك 24، 47
للصنل 24، 25، 47
نظرية القوة الحيوية 48
النظرية الذرية 16، 17، 20
التقطيع العام 5، 15
النواة 6، 22، 35
نوبل، ألفريد 62
النيوترون 18، 23، 24، 37
الأسمنت 63
الأمونيا 39
الهواء 28، 29، 32
النيلون 56

(هـ)

هابر، فريتز 39، 63
الهيدروجين 7، 46
هودجكين، ديفيد 20
الهيدروجين 18، 40، 46
الغاز 25، 27، 33، 36، 39
الوزن الذري 16
الوقود 35
الهيدروكربون 36، 37، 49، 53
الهيدروكربون 7، 30، 48، 49، 60
الأيونات 42، 43، 44
الماء 20، 29، 46
هيدروكسيد الصوديوم 39، 46، 47
الهيموجلوبين 31، 51

(و)

الوقود الحفري 50، 51



الكيمياء

بين يديك كتاب يستحثك على قراءته لما فيه من معلومات غزيرة عن عالم الكيمياء الرائع. عرض بالصور الملونة للأدوات الأصلية كما استخدمها مبتكروها. نماذج ثلاثية الأبعاد، وتجارب تفسر الكثير من الأشياء الغامضة. ستقرأ عن الاكتشافات التي غيرت أسلوب حياتنا، من الكيمياء القديمة وحتى التكنولوجيا الحديثة.

شاهد

كيف حنط قدماء المصريين الجثث. كيف يزيل المحول الحفاز الملوثات. كيف تتكون الصورة الفوتوغرافية. كيف يعمل المصباح الكهربائي ولافتات النيون. كيف يبتكر الكيميائيون الأطعمة الجديدة وكيف يختبرونها. كيف يؤثر سم الثعبان في ضحيته.

تعلم

ما سبب ثقب طبقة الأوزون. لماذا خيوط العنكبوت أقوى من الصلب. لماذا الليمون حامض. لماذا تشتعل بعض المعادن في الماء. كيف يصنع البلاستيك.

اكتشف

كيف يستطيع العلماء كشف غموض الجرائم المعقدة. سبب «تأثير الصوبة الزجاجية». كيف تشتعل الألعاب النارية، وكيف تنفجر مادة «تي. إن. تي». ما هو الحمض النووي. لماذا ترهقك التمرينات الرياضية. كيف تستخدم الكيماويات كأسلحة قاتلة. لماذا تتغير ألوان الزهور أحياناً. كيف نهضم الطعام.

وغير ذلك الكثير والكثير

